Platycheirus macroontennae He 大角寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Platycheirus macroontennae He, 1992:59.

捕 食 性。

分 佈：上海。

Platycheirus manicatus (Meigen) 凸顏寬跗食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:128)

Syrphus manicatus Meigen, 1822:336.

=*Eristalis geniculatus* Zetterstedt, 1838:

=*Syrphus alpicolus* Schummel, 1844:

=*Platycheirus ciliger* Loew, 1856:

捕 食 性。

分 佈：甘肅(河西走廊南部)；蒙古、蘇聯、歐洲。

Platycheirus omgustatus (Zetterstedt) 狹腹寬跗食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92)

捕 食 性。

分 佈：甘肅(河西走廊南部)。

Platycheirus ovalis Becker 卵圓寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Platychirus ovalis Becker, 1921:27.

捕 食 性。

分 佈：甘肅；日本、蒙古、蘇聯。

Platycheirus peltatus (Meigen) 菱斑寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Syrphus peltatus Meigen, 1822:334.

=*Syrphus cristatus* Schummel, 1837:

=*Scaeva rostratus* Zetterstedt, 1838:

=*Syrphus octomaculatus* von Roser, 1840:

=*Paltychirus islanddicus* Ringdhl, 1930:

捕 食 性。

分 佈：甘肅；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、新北區。

Platycheirus pennipes Ohara 羽寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Platycheirus pennipes Ohara, 1980:130.

捕 食 性。

分 佈：上海；日本、蘇聯。

Platycheirus scutatus (Meigen) 斜斑寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Syrphus scutatus Meigen, 1822:333.

=*Syrphus quadratus* Macquart, 1829:

=*Syrphus sexnotatus* Meigen, 1838:

=*Platychirus pygaeus* Frey, 1907:

捕 食 性。

分 佈：甘肅；日本、蒙古、蘇聯。

Platycheirus sticticus (Meigen) 棒脛寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Syrphus sticticus Meigen, 1822:332.
=*Platycheirus spathulatus* Rondani, 1857:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；蘇聯、歐洲。

Pyrophaena platygastra Loew 平腹派蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:129)
Pyrophaena platygastra Loew, 1871:229.
捕 食 性。
分 佈：甘肅；蒙古、蘇聯。

Scaeva albomaculata (Macquart) 大斑鼓額食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:631; Sun et Huang, 1996:181; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:154)
Syrphus albomaculata Macquart, 1842:146.
=*Lasiophticus gemellarii* Rondani, 1846:
=*Lasiopticus sulphurea* Sack, 1935:
=*Olbiosyrphus scufina* Dzhafarov, 1974:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏、甘肅(河西走廊南部)、新疆；蒙古、阿富汗、小亞細亞、伊朗、北非、南歐。

Scaeva hwangi He 黃氏鼓額食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:154)
Scaeva hwangi He, 1987, 2:194.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Scaeva komabensis (Matsumura) 六星食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:154)
Catabomba komabensis Matsumur,1917:146.
別 名：*彎斑鼓顱食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：江西、江蘇、甘肅(河西走廊南部)；日本、蘇聯。

Scaeva latimaculata (Brunetti) 條顏鼓顱食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:154)
Lasiopticus latimaculata Brenetti, 1923:68.
=*Scaeva Montana* Violovitsh, 1975:
捕 食 性。
分 佈：西藏；蘇聯、阿富汗、伊朗，東洋區。

Scaeva nanjingensis He et Chu 南京鼓顱食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:154)
Scaeva nanjingensis He et Chu, 1992:89-92.
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Scaeva pyrastri (Linnaeus) 梯斑鼓額食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:631; Gao, 1991:95; He et al., 1991:118; Ma et al., 1985:155; Sun et Huang, 1996:181; Wang et al., 1996, 12(2):92; Wu, 1987:183; Xiong et Dong, 1991:49-52; Xue et al., 1996, 1:154; Yunn., 1987:1181)

Musca pyrastri Linnaeus, 1758:594.
=*Musca rosae* De Geer, 1776:
=*Musca mellina* Harris, 1780:
=*Syrphus transfuga* Fabricius, 1794:
=*Scaeva unicolor* Curtis, 1834:
=*Syrphus flavoscutellata* Girschiner, 1884:
別 名：*斜斑鼓額食蚜蠅*。
捕 食：稻田蚜蟲
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(大豆)
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜(大豆)
Megoura japonica (M.) 豌豆修尾蚜
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高粱蚜(大豆)
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米縊管蚜(大豆)
Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜(大豆)
各種蚜蟲。
分 佈：江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林；蒙古、日本、蘇聯、阿富汗、亞洲西部、北部、北非、歐洲、美洲。

Scaeva selenitica (Meigen) 月斑鼓額食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:631; He et al., 1991:118; Hun., 1992:1138; Ma et al., 1985:155; Sun, 1992:1105; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:154; Yunn., 1987:1182)
Syrphus selenitica Meigen, 1822:304.
捕 食：稻田蚜蟲、蚜蟲。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江；亞洲北部和東部、蒙古、蘇聯、阿富汗、東洋區、越南、寮國、柬埔寨、印度、北非、歐洲。

Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt 離帶細腹食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:156)
Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt, 1859:6007.
捕 食 性。
分 佈：甘肅；蘇聯、歐洲、新北區。

Sphaerophoria assamensis Joseph 阿薩姆細腹食蚜蠅 (Sun, 1988:483; Xue et al., 1996, 1:156)
Sphaerophoria assamensis Joseph, 1970:168.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、旁辛、加熱薩)；印度。

Sphaerophoria cylindrica (Say) 長姬食蚜蠅 (He et al., 1991:118; Song, 1984:83; Sun et Zhang, 1982:197; Tao et al., 1968:32; Xue et al., 1996, 1:156)
Syrphus cylindrical Say, 1824:18.
別 名：*筒形細腹食蚜蠅*，*筒形食蚜虻*。
捕 食：稻田蚜蟲
分 佈：臺灣、湖南、西藏(聶拉木)；日本、美洲北部。

Sphaerophoria evida He et Li 婷婷細腹食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:156)

Sphaerophoria evida He et Li, 1992:18.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Sphaerophoria indiana Bigot 印度細腹食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:526; 1997:1482; He et al., 1991:118; Hun., 1992:1138; Li et al., 1990:108; Sun, 1988:482; 1992:1105; Sun et Huang, 1992:597; Sun et Zhang, 1982:196; Xue et al., 1996, 1:156; Yunn., 1987:1180)

Sphaerophoria indiana Bigot, 1884:
=*Sphaerophoria nigritarsis* Brunetti, 1915:
別 名：*印度食蚜蠅*。
捕 食：稻田蚜蟲
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜 (Wang et al., 1963:38)
蔗蚜。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、波密)、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、河北、北京、甘肅、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯(東部)、日本、印度、斯里蘭卡、尼泊爾、阿富汗，東洋區。

Sphaerophoria javana Wiedmann 爪哇食蚜蠅 (Tao et al., 1968:32)

捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣；朝鮮、日本、印度、印尼、澳洲。

Sphaerophoria macrogaster (Thomson) 寬帶細腹食蚜蠅 (Hun., 1992:1138; Sun, 1992:1105; Sun et Huang, 1992:597; Xue et al., 1996, 1:156)

Syrphus macrogaster Thomson, 1869:501.
別 名：*長毛細腹食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、江蘇、內蒙古、東北地區；朝鮮、蒙古、蘇聯(東部)、日本、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、東洋區，巴布亞新幾內亞、澳洲。

Sphaerophoria menthastri (Linnaeus) 黃赤細腹食蚜蠅 (He et al., 1991:118; Lu et al., 1986:63; Sun, 1992:1105; Xue et al., 1996, 1:156)

Musca menthastri Linnaeus, 1758:594.
=*Syrphus melissae* Meigen, 1822:
=*Syrphus picta* Meigen, 1822:
=*Syrphus hieroglyphica* Meigen, 1822:
別 名：*長翅細腹食蚜蠅*。
捕 食：*Brevicoryne brassicae* 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae 桃蚜
稻田蚜蟲

分 佈：湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、甘肅、東北南部及其他省份也有分佈；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、美洲。

Sphaerophoria philanthus (Meiger) 寬葉細腹食蚜蠅 (Sun, 1992:1106; Xue et al., 1996, 1:156)

Syrphus philanthus Meiger, 1822:327.
=*Sogaeriogirua origami* Macquart, 1829:
=*Melithreptus incisa* Loew, 1840:
=*Sphaerophoria dubia* Zetterstedt, 1849:
=*Sphaerophoria insignita* Zetterstedt, 1859:
=*Sphaerophoria multipunctata* Zetterstedt, 1859:
=*Sphaerophoria sarmatica* Bankowska, 1964:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、甘肅；蒙古、蘇聯、歐洲中部及北部、美洲北部。

Sphaerophoria ruppelli (Wiedemann) 半黃球尾食蚜蠅 (Shi et al., 1989-90:81; Sun, 1992:1106; Sun et Huang, 1996:181; Xue et al., 1996, 1:157)

Syrphus ruppelii Wiedemann, 1830:141.
=*Syrphus incerta* Wiedemann, 1830:
=*Spnaeropnoria calceolate* Macquart, 1842:
=*Spnaeropnoria flavicauda* Zetterstedt, 1843:
=*Spnaeropnoria nitidicollis* Zetterstedt, 1849:
=*Spnaeropnoria oleandri* Rondani, 1857:
=*Spnaeropnoria serpilli* Rondani, 1857:

別 名：*寬尾細腹食蚜蠅*。

捕 食：*Sinomegoura citricola* (van der Goot) 樟修尾蚜

分 佈：四川、浙江、江蘇、上海、河北、甘肅、新疆、遼寧；朝鮮、蒙古、庫頁島、蘇聯、阿富汗、亞洲中部、敘利亞、東非、北非、歐洲南部及中部。

寄生蜂：*Pachyneuron umbratum* Delucchi 食蚜蠅寬緣金小蜂
Syrphophagus sp. 食蚜蠅跳小蜂。

Sphaerophoria scripta (Linnaeus) 短翅細腹食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:633; ASZI et al., 1978:226; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Gao, 1991:95; He et al., 1991:118; Hun., 1992:1138; Ma et al., 1985:155; Sun, 1992:1106; Sun et Huang, 1992:597; 1996:181; Wang et al., 1991:79-81; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:157; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

Musca scripta Linnaeus, 1758:594.
=*Conops gemmata* Scopoli, 1763:
=*Musca libatrix* Scopoli, 1763:
=*Musca fasciata* Muller, 1764:
=*Musca invisito* Harris, 1780:
=*Musca molita* Harris, 1780:
=*Sphaerophoria lavandulae* Macquart, 1829:
=*Sphaerophoria limbata* Macquart, 1829:
=*Sphaerophoria analis* Macquart, 1834:
=*Sphaerophoria sinuate* Macquart, 1834:
=*Melithreptus dispar* Loew, 1840:
=*Sphaerophoria nigricoxa* Zettertedt, 1843:
=*Sphaerophoria strigata* Staeger, 1845:
=*Sphaerophoria scutellata* Portevin, 1909:
=*Sphaerophoria violacea* Santos Abreu, 1924:

捕 食：稻田蚜蟲、麥田
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(大豆)
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenback) 蘿蔔蚜(大豆)
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高粱蚜(大豆)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米縊管蚜(大豆)
Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜(大豆)
豆蚜
棉長管蚜
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、江蘇、陝西、山東、河北、甘肅、新疆、吉林；日本、蒙古、東洋區、印度、尼泊爾、阿富汗、亞洲(北部、東部)、蘇聯、小亞細亞、歐洲、北非，古北區、新北區。

Sphaerophoria taeniata (Meigen) 叉葉細腹食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:157)
Syrphus taeniata Meigen, 1822:325.
=*Melithreptus suzukii* Matsumura, 1916:
=*Melithreptus kuwayamae* Matsumura, 1918:
=*Melithreptus harimensis* Matsumura, 1918:
捕 食 性。
分 佈：甘肅、內蒙古；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Sphaerophoria tibetensis He 西藏細腹食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:157)
Sphaerophoria tibetensis He, 1992:16.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Sphaerophoria viridaenea Brunetti 綠色細腹食蚜蠅 (Sun, 1992:1106; Sun et Zhang, 1982:197; Xue et al., 1996, 1:157)
Sphaerophoria viridaenea Brunetti, 1915:216.
別 名：*斑顏細腹食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、西藏(察隅)、四川、甘肅、內蒙古、黑龍江；蘇聯、阿富汗、印度、東洋區、歐洲。

Sphaerophoria tsaii He et Li 蔡氏細腹食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:157)
Sphaerophoria tsaii He et Li, 1992:17.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Sphaerophoria sp. 長扁食蚜蠅 (Wang et al., 1991:79-81; Wu, 1987:183; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)
Sphaerophoria sp. Wang et al., 1991:79-81.
捕 食：(麥田、油菜田)。

分 佈：湖北、河北。

Sphegina tricoloripes Brunetti 三色棒腹食蚜蠅 (Hun., 1992:1143: Sun et Huang, 1992:598)

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川；印度。

Syritta orientalis Macquart 東方粗股蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1489; Sun et Huang, 1992:600)

Syritta orientalis Macquart, 1842:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、四川、湖北；印度、斯里蘭卡。

Syritta pipiens (Linnaeus) 黃環粗股食蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:183)

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758:)

捕 食 性。

分 佈：新疆；蒙古、東洋區、阿富汗、土耳其、伊朗、北非、歐洲、加那利群島、新北區。

Syrphus aegrotus Fabricius 斑翅食蚜蠅 (Tao et al., 1968:33)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：臺灣。

Syrphus balteatus De Geer 黑帶食蚜蠅 (Kung, 1963:236; Li et al., 1996, 18(1):26-28; Lin et Liu, 1993:18-21)

捕 食：*Aphis citricola* 橘捲葉蚜
Aphis gossypii 棉蚜
Brevicoryne brassicae 甘藍蚜
Chaitophorus populialbae 白毛蚜
Hyaloptera amgydali 甘粉大尾蚜
Liphis erysimi 蘿蔔蚜
Macrosiphoniella kuwayamai 水蒿小長管蚜
Macrosiphoniella hokkaidensis 北海道小管蚜
Macrosiphoniella sanborni 菊小長管蚜
Macrosiphoniella huaidensis 懷德小長管蚜
Marosiphum avenal 麥長管蚜
Myzus persicae 桃蚜
Pentalonia nigronervosa Coq. 香蕉蚜
Rhopalosiphum padi 禾谷縊管蚜
Rhopalosiphum maidi 玉米蚜
Schizaphis pricola 梨二叉蚜
Schizaphis graminum 麥二叉蚜
Aphis craccivora 豆蚜

分 佈：臺灣、河南、山東。

Syrphus braueri Egger 大斑食蚜蠅 (Sun et Zhang, 1982:198)

捕 食 性。

分 佈：西藏(察隅)；歐洲中部。

Syrphus corollae Fabricius 大灰食蚜蠅 (ASZI et al., 1978:228; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1990:108; Wu, 1987:183; Yang et al., 1990, 16(4):14-15; Yunn., 1987:1183; Zhao et al., 1990:2)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

豆蚜

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜

棉長管蚜

蚜蟲。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、河南、河北、北京、甘肅；日本、亞洲北部、馬來西亞、印度東部、小亞細亞、歐洲、北非。

Syrphus flavus He et Li 黃食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:158)

Syrphus flavus He et Li, 1992:89-92.

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Syrphus fulvifascies Brunetti 褐突食蚜蠅 (Sun, 1988:482)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：福建、雲南、西藏(墨脫、波密)；菲律賓、寮國、印度、尼泊爾、印尼。

Syrphus horishanus Matsumura 高山食蚜蠅 (Tao et al., 1968:34)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：臺灣。

Syrphus japonicus Loew 日本食蚜蠅 (Sun, 1988:482; Sun et Zhang, 1982:200)

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)；日本。

Syrphus nitens (Zetterstedt) 凹帶食蚜蠅 (ASZI et al., 1978:228; Yunn.:, 19871183; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

捕 食：蚜蟲、鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、雲南、浙江、河北、北京、甘肅、吉林；日本、歐洲。

Syrphus ribesii (Linnaeus) 黃顏食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:634; Sun, 1992:1103; Sun et Hunag, 1996:182; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:158; Yunn., 1987:1183)

Musca ribesii Linnaeus, 1758:593.

=*Musca vacuus* Scopoli, 1763:

=*Musca blandus* Harris, 1780:

=*Musca tetrgonus* Geeoffroy, 1785:

=*Syrphus japonicus* Matsumura, 1917:

=*Syrphus jezoensis* Matsumura, 1917:

=*Syrphus kotoriensis* Matsumura, 1917:

=*Syrphus moiwanus* Matsumura, 1917:
=*Syrphus tsukisappensis* Matsumura, 1917:
=*Syrphus yamahnsis* Matsumura, 1917:
=*Syrphus maculifer* Matsumura, 1917:
=*Syrphus okadensis* Matsumura, 1917:
=*Syrphus tenuis* Matsumura, 1918:
=*Syrphus velox* Matsumura, 1918:
=*Syrphus interruptus* Ringdahl, 1930:
=*Syrphus brevicinctus* Kaneervo, 1938:
=*Syrphus nigrigena* Enderlein, 1938:
=*Syrphus beringi* Violovitsh, 1975:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、四川、甘肅、新疆；古北區、蒙古、日本、阿富汗、亞洲、歐洲、非洲北部、美洲北部。

Syrphus serarius Weidemann 狹帶食蚜蠅 (ASZI et al., 1978:228; He et al., 1991:118; Sun et Zhang, 1982:199; Tao et al., 1968:35; Yunn., 1987:1182)
別 名：*黑色食蚜虻*。
捕 食：稻田蚜蟲
Aphis cardui 蚜
茶蚜。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、貴州、雲南、西藏(察隅)、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、北京、甘肅、內蒙古、吉林；韓國、日本、印尼、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Syrphus torvus Osten Sacken 野食蚜蠅 (Hun., 1992:1139; Sun, 1992:1104; Sun et Zhang, 1982:199; Xue et al., 1996, 1:158; Yunn., 1987:1182; Zhang, 1998, 14(2):47)
Syrphus torvus Osten Sacken, 1875:139.
=*Syrphus conspicuus* Matsumura, 1918:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、西藏(察隅)、四川、河北；蒙古、日本、蘇聯、東洋區、泰國、印度、尼泊爾、歐洲、美洲北部。

Syrphus torvus osten Sack. 黑足食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:597)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Syrphus venustus Meigen 暗突食蚜蠅 (Sun, 1988:482)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏(波密)；歐洲。

Syrphus vitripennis Meigen 黑足食蚜蠅 (Hun., 1992:1139; Sun, 1992:1104; Sun et Huang, 1992:597; Xue et al., 1996, 1:158; Yunn., 1987:1183)
Syrphus vitripennis Meigen, 1822:308.
=*Syrphus topiarius* Meigen, 1822:
=*Scaeva confinis* Zetterstedt, 1838:

=*Syrphus akakurensis* Matsumura, 1917:
=*Syrphus chujenjianus* Matsumura, 1917:
=*Syrphus campestris* Matsumura, 1918:
=*Metasyrphus candidus* Matsumura, 1918:
=*Syrphus dubius* Matsumura, 1918:
=*Syrphus kitakawae* Matsumura, 1918:
=*Syrphus kushireensis* Matsumura, 1918:
=*Syrphus palliventralis* Matsumura, 1918:
=*Syrphus shibechensis* Matsumura, 1918;
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、甘肅、新疆；蒙古、日本、蘇聯、阿富汗、伊朗、東洋區、歐洲、新北區。

Volucella plumatoides Herve-Bazin 柔毛蜂蚜蠅 (Sun et Hunag, 1996:183)
Volucella plumatoides Herve-Bazin, 1923:
捕 食 性。
分 佈：四川、新疆；蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦。

Volucella zonoria (Poda) 黑帶蜂蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:182)
Volucella zonoria (Poda, 1761:)
捕 食 性。
分 佈：甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、伊朗、突尼斯、歐洲。

Xanthandrus comtus (Harris) 圓斑黃食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:635; Liu, 19958:309)
Musca comtus Harris, 1780:108.
=*Scaeva hyalinatus* Fallén, 1817:
=*Syrphus quadriguttulus* Matsumura, 1911:
=*Epistrophe reductus* Č epelák, 1940:
=*Epistropha undulatus* Č epelák, 1940:
捕 食：*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick 柑橘擬小黃捲葉蛾(幼蟲)
分 佈：臺灣、廣東、浙江、內蒙古；東洋區、朝鮮、蒙古、蘇聯、歐洲。

Xanthandrus talamaui (de Meijere) 短角寬扁食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:526; Sun, 1988:482: Xue et al., 1996, 1:129)
Melanostoma talamaui de Meijere, 1924:21
=*Xanthandrus brevicornis* Curran, 1928:
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、波密)、浙江；馬來西亞、印尼，東洋區。

Xanthogramma citrifasciatum De Geer 黑紋食蚜蠅 (Tao et al., 1968:36)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣。

Xanthogramma citrinum Brunetti 柑橘黃斑食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:159; Yunn., 1987:1180)
Xanthogramma citrinum Brunetti, 1923:95.

捕 食 性。
分 佈：福建、雲南；東洋區。

Xanthogramma coreanum Shiraki 連黃斑食蚜蠅 (Hun., 1992:1139; Sun, 1992:1106; Sun et Huang, 1992:597)
Xanthogramma coreanum Shiraki, 1930:403.
別 名：*褐線黃斑食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川；朝鮮、日本、蘇聯。

Xanthogramma sapporense Matsumura 札幌黃斑食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:159)
Xanthogramma sapporense Matsumura, 1916:29.
=*Xanthogramma bambusae* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma fuscoclavatum* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma jozanum* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma kuccharense* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma minus* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma moiwanum* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma okunii* Matsumura, 1918:
=*Xanthogramma shibechanum* Matsumura, 1918:
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯。

Xylota fo Hull 雲南木蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1489)
Xylota fo Hull, 1944:
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、河北。

Xylota vulgaris Yang et Cheng 普通木蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1489)
Xylota vulgaris Yang et Cheng, 1993:
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖北、吉林。

Pyrgotidae 蜣蠅科
(Shi, 1996, 1:574-595)

Adapsilia antenna Shi 角適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:586)
Adapsilia antenna Shi, 1996, 1:586.
寄 主：
分 佈：雲南。

Adapsilia biseta Shi 二鬃適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia biseta Shi, 1996. 1:587.
寄 主：
分 佈：北京。

Adapsilia brevispina Malloch 短刺適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia brevispina Malloch, 1930:466.
寄 主：
分 佈：四川。

Adapsilia coarctata Wage 北方適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia coarctata Wage, 1942:280.
寄 主：
分 佈：吉林；亞洲、歐洲。

Adapsilia coomani Chen 孔氏適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia coomani Chen, 1947:72.
寄 主：
分 佈：吉林。

Adapsilia facialis Hendel 顏適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia facialis Hendel, 1934:148.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；越南。

Adapsilia hirtoscutellaris Hendel 毛盾適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia hirtoscutellaris Hendel, 1933:9.
寄 主：
分 佈：四川。

Adapsilia megophthalma Malloch 大適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia megophthalma Malloch, 1930:441.
寄 主：
分 佈：四川。

Adapsilia myopoides Chen 雜色適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:587)
Adapsilia myopoides Chen, 1947:68.
寄 主：
分 佈：吉林。

Adapsilia orientalis Shi 東方適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:590)
Adapsilia orientalis Shi, 1996, 1:590.
寄 主：
分 佈：福建(邵武)。

Adapsilia scutellaris Chen 盾適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:590)
Adapsilia scutellaris Chen, 1947:70.
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

Adapsilia striatis Shi 條紋適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:590)

Adapsilia striatis Shi, 1993:695.

寄 主：

分 佈：福建。

Adapsilia trypetoides Chen 艷適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:591)

Adapsilia trypetoides Chen, 1947:71.

寄 主：

分 佈：四川。

Adapsilia verrucifer Hendel 疣適蜣蠅 (Shi, 1996, 1:591)

Adapsilia verrucifer Hendel, 1933:10.

寄 主：

分 佈：四川。

Apyrgota breviventris Shi 短腹蜣蠅 (Shi, 1996, 1:580)

Apyrgota breviventris Shi, 1996, 1:580.

寄 主：

分 佈：雲南。

Apyrgota formosana Hennig 臺灣蜣蠅 (Shi, 1994:108; 1996, 1:580)

Apyrgota formosana Hennig, 1938:253.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Apyrgota fura Shi 淺黑蜣蠅 (Shi, 1996, 1:580)

Apyrgota fura Shi, 1996, 1:580.

寄 主：

分 佈：雲南。

Apyrgota jiangleensis Shi 將樂蜣蠅 (Shi, 1994:108; 1996, 1:581)

Apyrgota jiangleensis Shi, 1994:108-109.

寄 主：

分 佈：福建(將樂)。

Apyrgota longa Shi 長蜣蠅 (Shi, 1996, 1:581)

Apyrgota longa Shi, 1996, 1:581.

寄 主：

分 佈：雲南。

Campilocera hirsuta Aldrich 毛脈叉蜣蠅 (Shi, 1996, 1:582)

Campilocera hirsuta Aldrich, 1928:1.

寄 主：*Adoretus* sp. 麗金龜。

分 佈：臺灣。

Epicerella microcera (Portschinsky) 小角蜣蠅 (Shi, 1996, 1:575)

Epicerella microcera (Portschinsky, 1892:212.)

寄 主：

分 佈：吉林；日本。

Eupyrgota flavopilosa Hendel 黃毛真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:582)

Eupyrgota flavopilosa Hendel, 1913:85.

寄 主：

分 佈：吉林。

Eupyrgota furvimaculis Shi 黑斑真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:582)

Eupyrgota furvimaculis Shi, 1996, 1:285.

寄 主：

分 佈：雲南。

Eupyrgota fusca Hendel 棕色真蜣蠅 (Hun., 1992:1113; Shi, 1996, 1:583)

寄 主：金龜(內寄生)。

分 佈：江西、湖南；日本。

Eupyrgota luteola Coquillett 淺黃真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:583)

Eypyrgota luteola Coquillett, 1898:337.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Eupyrgota maculiala Shi 斑翅真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:583)

Eupyrgota maculiala Shi, 1996, 1:583.

寄 主：

分 佈：雲南。

Eupyrgota pekinensis Chen 北京真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:584)

Eupyrgota pekinensis Chen, 1947:58.

寄 主：

分 佈：北京。

Eupyrgota pieli Chen 皮氏真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:584)

Eupyrgota pieli Chen, 1947:60.

寄 主：

分 佈：江蘇。

Eupyrgota rufosetosa Chen 紅鬃真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:584)

Eypyrgota rufosetosa Chen, 1947:59.

寄 主：

分 佈：雲南、四川、江蘇。

Eupyrgota similis Chen 似真蜣蠅 (Shi, 1996, 1:584)

Eupyrgota similis Chen, 1947:63.
寄 主：
分 佈：四川。

Geloemyia stylata Hendel 芒硬蜣蠅 (Shi, 1996, 1:576)

Geloemyia stylata Hendel, 1908:151.
寄 主：
分 佈：吉林；日本。

Paradapsilia trinotata Chen 三斑似蜣蠅 (Hun., 1992:1113, Shi, 1996, 1:575)

Paradapsilia trinotata Chen, 1947:53.
別 名：*三點三節芒蜣蠅*。
寄 主：金龜。
分 佈：湖南；日本。

Parageloemyia globa Shi 球近硬蜣蠅 (Shi, 1996, 1:576)

Parageloemyia globa Shi, 1996, 1:576.
寄 主：
分 佈：雲南。

Parageloemyia nigrofasciata Hendel 黑顏近硬蜣蠅 (Shi, 1996, 1:577)

Parageloemyia nigrofasciata Hendel, 1933:13.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、吉林。

Parageloemyia quadriseta Hendel 四帶近硬蜣蠅 (Shi, 1996, 1:577)

Parageloemyia quadriseta Hendel, 1933:13.
寄 主：
分 佈：四川。

Tephritopyrgota miliaria Hendel 粟斑灰蜣蠅 (Shi, 1996, 1:591)

Tephritopyrgota miliaria Hendel, 1933:12.
寄 主：
分 佈：四川。

Tephritopyrgota yunnanensis Shi 雲南灰蜣蠅 (Shi, 1996, 1:591)

Tephritopyrgota yunnanensis Shi, 1996, 1:591.
寄 主：
分 佈：雲南。

Drosophilidae 果蠅科

Acletoxenus sp. 粉蝨蠅 (Chien et Chiu, 1986:227; Lo et Chiu, 1986:20)
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaint.) 黑刺粉蝨。
分 佈：臺灣。

Megamerinidae 刺股蠅科

(Yang, 1996, 1:415-423)

Protexara sinica Yang 中華前刺股蠅 (Yang, 1996, 1:420)
Protexara sinica Yang, 1996, 1:420.
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、湖北。

Texara dioctrioides Walker 食蟲旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:417)
Texara dioctrioides Walker, 1860:166.
=*Texara fomorata* de Meijere, 1914:
=*Texara rufifemur* Enderlein, 1920.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣西、雲南；寮國、緬甸、錫金、斯里蘭卡、印尼。

Texara hada Yang 哈達旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:417)
Texara hada Yang, 1996, 1:417.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Texara melanopoda Yang 黑足旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:419)
Texara melanopoda Yang, 1996, 1:417.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Texara pallitarsula Yang 淡跗旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:419)
Texara pallitarsula Yang, 1996, 1:419.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Texara shenwuana Yang 神武旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:419)
Texara shenwuana Yang, 1996, 1:419.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Texara tricesima Yang 三十旋刺股蠅 (Yang, 1996, 1:419)
Texara tricesima Yang, 1996, 1:419.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Chloropidae 黃潛蠅科

Anatrichus erinaceous Loew (He et al., 1991:62)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。

分 佈：臺灣。

Chamaemyiidae 斑腹蠅科(蚜小蠅科)

(Xie, 1996, 1:262-279)

Acrometopia reeichereti (Enderlein) 環尖斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:266)

Acrometopida reicheerti Enderlein, 1929:59.

=*Acrometopia anulitibia* Smith, 1966:

捕 食 性。

分 佈：廣西；日本、蘇聯、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Chamaemyia aestiva Tanasijtshuk 夏斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:268)

Chamaemyia aestiva Tanasijtshuk, 1970:233.

捕 食 性。

分 佈：中國；蒙古、蘇聯、捷克斯洛伐克、匈牙利、波蘭。

Chamaemyia juncorum (Fallén) 棱斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:268)

Ochtiphila juncorum Fallén, 1823:9.

=*Ochtiphla aridella* Fallén, 1823:

=*Estelia herbarum* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Estelia impunctata* Robineau-Desvoidy, 1830:

捕 食：禾本科植物上的蚧蟲。

分 佈：寧夏；蒙古、蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、法國、英國、丹麥、瑞典、挪威、阿爾利亞、突尼斯。

Leucopis (s. str.) **annulepis** Zetterstedt 環足灰斑腹蠅 (Liang et al., 1997, 24(3):193-198; Zhang et Zhang, 1994:251)

Leucopis annulepis Zetterstedt, 1848:2712.

=*Leucopis caucasica* Tanasijtshuk, 1961:

別 名：*狹抱小斑腹蠅*。

捕 食：*Diuraphis noxia* (Mordvilko) 麥雙尾蚜。

分 佈：河南、陝西、青海、寧夏、新疆；蘇聯、伊朗、保加利亞、匈牙利、法國、波蘭、瑞典。

Leucopis (s. str.) **apicalis** Malloch 臺南齒小玟腹蠅 (Cogan, 1977:224; Xie, 1996, 1:271)

Leucopis apicalis Malloch, 1914:332.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南)。

Leucopis (s. str.) **argentata** Heeger 銀白齒小斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:271)

Leucopis argentata Heeger, 1848:998.

=*Leucopis impunctata* Czerny, 1936: nec Roser.
=*Leucopis intgerruptovittata* Aczel, 1937:
=*Leucopis conciliata* McAlpine et Tanasijtshuk, 1972:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：河北、內蒙古；蘇聯、奧地利。

Leucopis (s. str.) **formosana** Hennig 臺灣小斑腹蠅 (Cogan, 1977:224)
Leucopis formosana Hennig, 1938:209.
捕 食：柑橘蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東；印度、蘇聯。

Leucopis (s. str.) **glyphinivora** Tanasijtshuk 喙抱小斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:274)
Leucopis (s. str.) *glyphinivora* Tanasijtshuk, 1958:92.
Leucopis taurica Tanasijtshuk, 1959:
捕 食：蚜蟲
分 佈：貴州、陝西、河北、北京、寧夏、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、阿富汗、保加利亞、匈牙利、波蘭、法國。

Leucopis (s. str.) **griseola** (Fallén) 巨側突小斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:274)
Anthomyza griseola Fallén, 1823:4.
=*Leucopis puncticornis* Meigen, 1826:
=*Leucopis sensu* Hening, 1938:
=*Leucopis magnicerca* Tanasijtshuk, 1976:
捕 食：草地蚜蟲。
分 佈：河北；蒙古、蘇聯、法國、英國南部、德國、奧地利、瑞典。

Leucopis ninae Tanasijtshuk 海神斑腹蠅 (Zhang et Zhang, 1994:251)
Leucopis ninae Tanasijtshuk
捕 食：*Diuraphis noxia* (Mordvilko) 麥雙尾蚜。
分 佈：新疆。

Leucopis puncticornis Meigen 白背斑腹蠅 (Tao et al., 1968:37)
別 名：*白背食蚜蠅*。
捕 食：*Aphis citricidus* van der Goot 柑橘捲葉蚜。
分 佈：臺灣；日本、歐洲。
天 敵：一種金小蜂寄生於蛹。

Leucopis (s. str.) **sordida** Becker 西藏小斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:274)
Leucopis sordida Becker, 1908:309.
捕 食 性。
分 佈：西藏；蒙古、蘇聯。

Leucopis sp. 斑腹蠅 (Wang et al., 1960:371)
捕 食：*Aphis sacchari* Zehntner 高粱蚜。

分 佈：山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Loxoneura sp. 斑腹蠅 (Zhang, 1987[ed.] 2:70)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：江西。

Parochthiphila (s. str.) **transcaspica** Frey 鈍脊准斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:268)

Parochthiphila (s. str.) *transcaspica* Frey, 1958:28.

=*Parochthiphila phrgmitis* Tanasijtshuk, 1963:

=*Parochthiphila kozlovi* Tanasijtshuk, 1968:

捕 食：禾本科葉鞘內的蚧蟲。

分 佈：寧夏(賀蘭山)、甘肅；蒙古、蘇聯。

Parachthiphila (E.) trjafitzini Tanasijtshuk 特里准斑腹蠅 (Xie, 1996, 1:268)

Parachthiphila trjafitzini Tanasijtshuk, 1968:693. (non Becker, 1903)

=*Ochthiphila spectabilis* Pecker, 1908: (non Loew, 1858)

捕 食 性。

分 佈：青海、寧夏；蒙古、蘇聯。

Parochthiphila (Euestelia) yangi Xie 楊氏准斑腹蠅 (Xie, 1995:103)

Parochthiphila (*Euestelia*) *yangi* Xie, 1995:103.

捕 食 性。

分 佈：青海。

Trypetidae 實蠅科(Tephritidae)

Procecidochares utilis Stone 澤蘭實蠅 (He et al., 1987:1-3; Wei et al., 1989:41-42; Xu, 1987:179; Zhang et al., 1988:10-13)

寄 主：*Eupatorium adenophorum* Spreng 紫莖澤蘭(菊科雜草)。

分 佈：雲南(1984 從西藏引至昆明防治紫莖澤蘭)。

Terellia sp. 實蠅 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arvense* (L.) Scop. 薊(種子)。

分 佈：新疆。

Urophora sp. 實蠅 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arvense* (L.) Scop. 薊(種子)。

分 佈：新疆。

Scathophagidae 糞蠅科 (Cordyluridae)

Cordilura femoralis Sun 腫腿理糞蠅 (Sun, 1996, 1:623)

Cordilura femoralis Sun, 1993:

捕 食 性。

分 佈：黑龍江

Cordilura nigrifrons Sun 黑額理糞蠅 (Sun, 1996, 1:623)

Cordilura nigrifrons Sun, 1993:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Cordilura pubera (Linnaeus) 毛理糞蠅 (Sun, 1996, 1:624)

Musca pubera Linnaeus, 1758:598.
Cordylura rufipes Meigen, 1826:
捕 食 性。
分 佈：北京、新疆；蒙古、蘇聯、匈牙利、英國、芬蘭、瑞典。

Cordilura pudica (Meigen) 遜理糞蠅 (Sun, 1996, 1:624)

Cordylura pudica Meigen, 1826:231.
=*Cordylura geniculata* Zetterstedt, 1846:
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；蘇聯、斯洛伐克、捷克、瑞士、英國、芬蘭、瑞典、美國、加拿大。

Norellia armipes (Meigen) 刺足鬃糞蠅 (Sun, 1996, 1:625)

Cordylura armipes Meigen, 1826:234.
=*Cordylura flavicauda* Meigen, 1926:
=*Cordylura flava* Von Roser, 1840:
=*Norellia roserii* Rondani, 1967:
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川；歐洲。

Norellia longiabdomina Sun 長腹鬃糞蠅 (Sun, 1996, 1:625)

Norellia longiabdomina Sun, 1992:324.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Norellia spinimana (Fallén) 刺跗鬃糞蠅 (Sun, 1996, 1:625)

Cordylura spinimana Fallén, 1819:7.
=*Norellisoma septentrionale* Hendel, 1930:
捕 食 性。
分 佈：吉林；蘇聯、歐洲、北美洲。

Norellia striolata (Meigen) 小紋鬃糞蠅 (Sun, 1996, 1:625)

Cordylura striolata Meigen, 1826:235.
=*Norellia triata* Macquart, 1835: (error.)
捕 食 性。
分 佈：四川；歐洲。

Norellia triangula Sun 角板鬃糞蠅 (Sun, 1996, 1:625)

Norellia triangula Sun, 1992:324.

捕 食 性。
分 佈：西藏。

Parallelomma albamentum (Séguy) 白頦齊糞蠅 (Sun, 1996, 1:626)
Chylizossoma albamentum Séguy, 1963:453.
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Phrosia albilabris (Fabricius) 白毛長角糞蠅 (Sun, 1996, 1:626)
Ochyptera albilabris Fabricius, 1805:315.
=*Phrosia scirpi* Robineau-Desvoidy, 1830:
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯、歐洲。

Scathophaga amplipennis (Portschinsky) 大翅糞蠅 (Fan, 1992:38; Sun, 1996:173; 1996:628)
Scatophaga amplipennis Portschinsky, 1887:199.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、青海、新疆；帕米爾、塔吉克斯坦。

Scathophaga analis (Meigen) 紅尾糞蠅 (Sun, 1996, 1:628)
Cordylura analis Meigen, 1826:244.
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南、四川、北京、新疆、內蒙古、黑龍江；歐洲中部。

Scathophaga flavihirta Sun 黃毛糞蠅 (Sun, 1996, 1:628)
Scathophaga flavihirta Sun, 1996:628.
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Scathophaga gigantea (Aldrich) 巨糞蠅 (Fan, 1992:38; Sun, 1996, 1:628)
Scatophaga gigantea Aldrich, 1932:11.
=*Scatophaga obscura* Aldrich, 1932:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川(康定打箭爐)。

Scathophaga infumatum (Becker) 底下糞蠅 (Sun, 1996, 1:628)
Coniosternum infumatum Becker, 1907:256.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Scathophaga kaszabi (Sifner) 卡氏糞蠅 (Sun, 1996:173; 1996, 1:628)
Coniosternum kaszabi Sifner, 1973:224.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古。

Scathophaga magnipennis (Portschinsky) 巨翅糞蠅 (Sun, 1996, 1:628)

Scatophaga magnipennis Portschinsky, 1887:198.

捕 食 性。

分 佈：新疆；蒙古、俄羅斯。

Scathophaga mellipes (Coquillett) 蜜足糞蠅 (Fan, 1992:38; Sun, 1996, 1:630)

Scatophaga mellipes Coquillett, 1899:335.

=*Scatophaga chinese* Malloch, 1935:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、四川、浙江；印度、尼泊爾、日本、蘇聯(遠東南部)。

Scathophaga mollis (Becker) 柔毛糞蠅 (Sun, 1996, 1:630)

Scatophaga mollis Becker, 1894:171.

捕 食 性。

分 佈：青海、新疆；蒙古、俄羅斯(遠東地區)、北美洲。

Scathophaga scybalaria (Linnaeus) 曲脈糞蠅 (Fan, 1992:37; Sun, 1996, 1:630)

Musca scybalaria Linnaeus, 1753:599.

=*Scatophaga anomala* Collin, 1958: (as var. of *scybalaria*)

別 名：*絲翅糞蠅*。

捕 食 性。

分 佈：福建、貴州、雲南、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯、歐洲。

Scathophaga sinensis Sun 中華糞蠅 (Sun, 1996, 1:630)

Scathophaga sinensis Sun, 1996, 1:630-631.

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Scathophaga stercoraria (Linnaeus) 黃糞蠅 (Fan, 1992:37; Qian et al., 1996, 18(2):49-53; Sun, 1996:173; 1996, 1:631; Zhang, 1987[ed.] 2:69)

Musca stercoraria Linnaeus, 1758:599.

=*Musca merdaria* Fabricius, 1794:

=*Scatophaga asticha* Szilády, 1926:

=*Scatophaga disicha* Szilády, 1926:

=*Scatophaga nigricans* Szilády, 1926:

=*Scatophaga polysticha* Szilády, 1926:

=*Scopeuma alpestre* Sack., 1937:

捕 食：花上捕食潛葉蠅等小型蠅類

Drosophila spp. 多種果蠅

Musca canducens 逐畜家蠅

Musca canvexifrons 突額家蠅

Musca domestica 舍蠅

Musca sorbens 市蠅

Muscina stabulans 廄腐蠅

Chrysomya megacephala 大頭金蠅
Lucilia sericata 絲光綠蠅
Bellieria melanura 尾黑麻蠅
Bocttcherisca peregrina 棘尾別麻蠅
Parasarcophaga misera 醬亞麻蠅。

分 佈：廣布于各省區、市、自治區、湖北、青海、新疆；亞洲、蘇聯、歐洲、非洲、北美洲、墨西哥。

Scathophaga suilla (Fabricius) 豬糞蠅 (Fan, 1992:38)
Musca suilla Fabricius, 1794:343.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古、蘇聯、歐洲、全北區。

Scathophaga taeniopa (Rondani) 齊突糞蠅 (Fan, 1992:37; Sun, 1996, 1:631)
Scatophaga taeniopa Rondani, 1867:111.
=*Scatophaga ordinata* Becker, 1894:
捕 食 性。
分 佈：青海、內蒙古；蒙古、蘇聯、歐洲。

Scathophaga xinjiangensis Sun 新疆糞蠅 (Sun, 1996, 1:631)
Scathophaga xinjiangensis Sun, 1996, 1:631.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Anthomylidae 花蠅科

Acridomyia sacharovi Stackelberg 古北蝗蠅 (Wei et al., 1996, 1:646)
Acridomyia sacharovi Stachelberg, 1929:123.
寄 主：直翅目昆蟲。
分 佈：遼寧；亞洲中部(哈薩克斯坦)、歐洲。

Botanophila qinghaisenecio (Fan) 青澤菊植種蠅 (Wei et al., 1996, 1:693)
Pegohylemyia qinghaisenecio Fan, 1984:247.
寄 主：取食澤菊種子。
分 佈：青海(門源)。
附 註：澤菊 (*Senecio jacobaea*) 因其種子有毒而對畜牧業構成威脅。國外已有自歐洲將澤菊種蠅引入新西蘭、澳洲和北美，以控制澤菊蔓延，并已證實為野生害草菊澤的有效天敵。

Paraprosalpia silvestris (Fallén) 林亮葉花蠅 (Fan, 1992:172)
Musca silvestris Fallén, 1824:70.
捕 食：成蟲捕食蚜蟲。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、堪察加、瑞典、北美。

Calliphoridae 麗蠅科

Achoetandrus rufifacies (Macquart) 緋顏裸金蠅 (Xue et al., 1996, 2:1463)

Lucilia rufifacies Macquart, 1842:303.
=*Lucilia orientalis* Macquart, 1843:
=*Lucilia pavonina* Schiner, 1868:
=*Somomyia barbata* Bigot, 1877:
=*Chrysomyia cordieri* Séguy, 1925:
=*Chrysomyia pingi* Hsieh, 1958:
捕 食：幼蟲于腐敗動物質，具殘食性，捕食其它蠅類幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、山東；日本、越南、澳洲、太平洋南岸諸島、古北區南緣。

Achoetandrus villeneuvii (Patton) 粗足裸金蠅 (Xue et al., 1996, 2:1464)

Chrysomyia villeneuvii Patton, 1922:567.
捕 食：幼蟲于腐敗動物質，具殘食性，捕食其它蠅類幼蟲。
分 佈：廣東、海南、雲南；馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼。

Bellardia bayeri liaoningensis Hsue 遼寧陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1385)

Bellardia bayeri liaoningensis Hsue, 11979:193-194.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：河北、遼寧。

Bellardia benshiensis Hsue 本溪陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1385)

Bellardia benshiensis Hsue, 1979:183.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：遼寧。

Bellardia curviloba Liang et Gan 彎葉陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1385)

Bellardia curviloba Liang et Gan, 1986:369-370.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：雲南。

Bellardia dolichodicra Chen, Fan et Cui 長裂陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1387)

Bellardia dolichodicra Chen, Fan et Cui, 1983:23.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：黑龍江(大興安嶺)。

Bellardia fengchenensis Chen 鳳城陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1387)

Bellardia fengchenensis Chen, 1979:387-388.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：遼寧。

Bellardia menechma (Séguy) 新月陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1387)

Polleniopsis menechma Séguy, 1934:12.

捕 食：胎生幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本。

Bellardia menechmoides Chen 擬新月陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1387)

Bellardia menechmoides Chen, 1979:389-390.

=*Pollenippsis* (*Melindopsis*) *menechma*; Kurahashi, 1964. (*nec* Séguy, 1934)

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、河北、甘肅、遼寧；日本。

Bellardia micromenechma Liang et Chen 小新月陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1387)

Bellarida micromenechma Liang et Chen, 1986:370-371.

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：雲南。

Bellardia narishukae (Grunin) 直鈎陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1388)

Melinda narishukae Grunin, 1970:476.

=*Melinda pruinosa*; Kurahashi, 1964: (*nec* Enderlein, 1933)

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、俄羅斯(貝加爾)。

Bellardia notomenechma Liang et Gan 南新月陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1388)

Bellardia notomenechma Liang et Gan, 1986:367-369.

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：雲南(昆明)。

Bellardia oligochaeta Chen et Fan 少鬃陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1388)

Bellardia oligochaeta Chen et Fan, 1988:509-510.

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：西藏。

Bellardia pusilla (Meigen) 小陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1388)

Musca pusilla Meigen, 1826:71.

=*Calliphora aculeta* Pandellé, 1896:

=*Onesia krameri* Muller, 1922:

=*Xerophilophaga zetterstedti* Enderlein, 1933:

=*Onesia longelobata* Jacerkovsky, 1941:

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。

分 佈：吉林；日本、蘇聯、歐洲大部分(德國)。

Bellardia qinghaiensis Chen 青海陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1389)

Bellardia qinghaiensis Chen, 1979:385-387.

捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：青海。

Bellardia sastylata Qian et Fan 壯葉陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1389)
Bellardia sastylata Qian et Fan, 1981:444-445.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：新疆。

Bellardia xianensis Wu, Chen et Fan 西安陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1389)
Bellardia xianensis Wu, Chen et Fan, 1991:307-309.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：陝西。

Bellardia xinganensis Chen, Fan et Cui 興安陪麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1389)
Bellardia xinganensis Chen, Fan et Cui, 1983:231-232.
捕 食：幼蟲捕食性或寄生性，可自蚯蚓體內育出。
分 佈：黑龍江。

Bengalia chekiangensis Fan 浙江孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1378)
Bengalia chekiangensis Fan, 1965:194.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：江西、浙江、安徽。

Bengalia emarginata Malloch 凹圓孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1378)
Bengalia emarginata Malloch, 1927:412.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南；馬來西亞、新加坡、泰國。

Bengalia escheri Bezzi 環斑孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1378)
Bengalia escheri Bezzi, 1913:76.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、福建、海南、雲南、四川、浙江、安徽；印度。

Bengalia (Eubengalia) fani Feng et Wei 范氏孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1378)
Bengalia (*Eubengalia*) *fani* Feng et Wei, 1996, 2:1378-1380.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：貴州。

Bengalia labiata Robineau-Desvoidy 突唇孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1380)
Bengalia labiata Robineau-Desvoidy, 1830:426.
=*Bengalia melanocer* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Bengalia pallens* Robineau-Desvoidy, 1830:
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。

分 佈：臺灣、海南、雲南、浙江；蒙古、日本、馬來西亞、印度、孟加拉、斯里蘭卡、印尼。

Bengalia latro de Meijere 盜孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1380)

Bengalia latro de Meijere, 1910:336.
Bengalia bezzii Senior-White, 1932:
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江；菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡、印尼(爪哇)。

Bengalia taiwanensis Fan 臺灣孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1380)

Bengalia taiwanensis Fan, 1965:420.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、廣東。

Bengalia torosa (Wiedemann) 側線孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1380)

Musca torosa Wiedemann, 1819:21.
=*Bengalia testacea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Bengalia lateralis* Macquart, 1843:
=*Bengalia quadrinotata* Bigot, 1887:
=*Bengalia jejuna* Senior-White, 1940:
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、海南、雲南；日本、菲律賓、寮國、泰國、印度、孟加拉、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Bengalia varicolor (Fabricius) 變色孟蠅 (Xue et al., 1996, 2:1381)

Musca varicolor Fabricius, 1805:296.
捕 食：成蟲可捕食搬運中的蟻幼蟲以及白蟻。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江；菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼。

Caiusa coomani Segye 越北絳蠅 (Lin et al., 2000, (4):281-292)

寄 主：*Polypedates megacephalus* Hallowell 白頷樹蛙(卵泡)
Rhacophorus arvalis Lue et al. 諸羅樹蛙(卵泡)
Rhacophorus aurantiventris Lue et al. 橙腹樹蛙(卵泡)
Rhacophorus moltrechti Boulenger 莫氏樹蛙(卵泡)
Rhacophorus prasinatus Mou et al., 翡翠樹蛙(卵泡)
Rhacophorus taipeianus Laing et Wang 臺北樹蛙(卵泡)。
分 佈：臺灣。

Melinda cognata (Meigen) 寬葉蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1406)

Musca cognata Meigen, 1830:374.
=*Musca caerulea* Meigen, 1826:
=*Onesia viridicyanea* Robineau-Desvoidy, 1930:

=*Musca anthracina* Meigen, 1838:
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：新疆；俄羅斯(亞洲中部、歐洲部分)、歐洲全境、摩洛哥。

Melinda dasysternita Chen, Deng et Fan 毛腹蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Melinda dasysternita Chen, Deng et Fan, 1992:521-522.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Melinda gibbosa Chen, Deng et Fan 駝葉蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Melinda gibbosa Chen, Deng et Fan, 1992:520-522.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Melinda gonggashanensis Chen et Fan 貢嘎山蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Melindd gonggashanensis Chen et Fan, 1992:1189.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：四川(貢嘎山)。

Melinda io (Kurahashi) 鈍葉蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Paradichosia io Kurahashi, 1965:49.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、俄羅斯(遠東海濱地區)。

Melinda maai Kurahashi 閩北蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Melinda maai Kurahashi, 1970:536.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：福建(邵武)。

Melinda nigrella Chen, Li et Chang 小黑蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1408)
Melinda nigrella Chen, Li et Chang, 1988:317-318.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：雲南。

Melinda septentrionalis Xue 北方蝸蠅 (Xue et al., 1996, 2:1409)
Melinda septentrionalis Xue, 1983:109-112.
寄 主：幼蟲寄生于陸生蝸牛體內。
分 佈：遼寧。

Onesia abaensis Chen et Fan 阿壩蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1411)
Onesia abaensis Chen et Fan, 1992:1189.
寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。
分 佈：四川。

Onesia batangensis Chen et Fan 巴塘蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1411)

Onesia batangensis Chen et Fan, 1992:1190.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：雲南、四川。

Onesia chuanxiensis Chen et Fan 川西蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1411)

Onesia chuanxiensis Chen et Fan, 1992:1191.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川。

Onesia garzeensis Chen et Fan 甘孜蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1411)

Onesia garzeensis Chen et Fan, 1992:1192.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川。

Onesia hokkaidensis (Baranov) 北海道蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1411)

Melinda hokkaidensis Baranov, 1939:112.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本(札幌)。

Onesia hongyuanensis Chen et Fan 紅原蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Onesia hongyuanensis Chen et Fan, 1992:1194.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川。

Onesia jiuzhaigouensis Chen et Fan 九寨溝蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Onesia jiuzhaigouensis Chen et Fan, 1992:1194.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川。

Onesia (Pellonesia) pterygoides Lu et Fan 翼尾蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Onesia (*Pellonesia*) *pterygoides* Lu et Fan, 1981:255-256.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：山西。

Onesia sinensis Villeneuve 中華蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Onesia sinensis Villeneuve, 1936:10.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川、甘肅。

Onesia songpanensis Chen et Fan 松潘蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Onesia songpanensis Chen et Fan, 1992, 2:1196.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：四川。

Onesia variola (Chen) 變斑蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1413)

Bellaridia variola Chen, 1979:385-386.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：黑龍江(伊春)。

Onesia wolongensis Chen et Fan 臥龍蚓蠅 (Xue et al., 1996, 2:1414)

Onesia wolongensis Chen et Fan, 1992, 2:1197.

寄 主：幼蟲亦有胎生，寄生于蚯蚓體內。

分 佈：雲南、四川(臥龍)。

Pollenia aurata Séguy 金斑粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1459)

Pollenia aurata Séguy, 1934:22.

寄 主：蚯蚓等。

分 佈：西藏。

Pollenia bazini Séguy 巴氏粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1459)

Pollenia bazini Séguy, 1934:23.

寄 主：蚯蚓等。

分 佈：江西(牯嶺)。

Pollenia luteola Velleneuve 脊顏粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1459)

Pollenia luteola Velleneuve, 1927:393.

寄 主：蚯蚓等。

分 佈：臺灣。

Pollenia petinata Grunin 櫛跗粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1459)

Pollenia petinata Grunin, 1966:899.

寄 主：蚯蚓等。

分 佈：河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、西伯利亞、歐洲。

Pollenia pseudorudis Rognes 僞粗野粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1459)

Pollenia pseudorudis Rognes, 1985:493.

=*Pollenia rudis*; Fan, 1965: (*nec* Fabricius, 1794)

寄 主：蚯蚓 (*Allolobophora chloratica, A. calignosa*)(歐洲、新疆)。
Helodrilus roseus (北美洲)。

分 佈：西藏、河北、寧夏、新疆、內蒙古、吉林；印度、尼泊爾、巴基斯坦、蘇聯、歐洲、北非、新西蘭、北美洲。

Pollenia sytshevskajae Grunin 細側粉蠅 (Xue et al,. 1996, 2:1460)

Pollenia sytshevskajae Grunin, 1970:480.

寄 主：蚯蚓等。

分 佈：新疆；吉爾吉斯斯坦。

Pollenomyia falciloba (Hsue) 鐮葉粉腹麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1430)

Paradichosia falciloba Hsue, 1979:193-194.

寄 主：幼蟲自陸生蝸牛體內育出。

分 佈：遼寧。

Pollenomyia okazakii (Kano) 斑股粉腹麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1431)

Melinda okazakii Kano, 1962:2.

寄 主：幼蟲自陸生蝸牛體內育出。

分 佈：雲南、遼寧；日本、俄羅斯(遠東濱海地區)。

Pollenomyia sinensis Séguy 中華粉腹麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1431)

Pollenomyia sinensis Séguy, 1935:149.

寄 主：幼蟲自陸生蝸牛體內育出。

分 佈：四川、浙江、江蘇、陝西、河北、北京、寧夏、遼寧；日本、俄羅斯(遠東濱海地區)。

Protocalliphora azurea (Fallén) 青原麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1474)

Musca azurea Fallén, 1816:245.

=*Phormia caerulea* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Musca sordida* Zetterstedt, 1838:

=*Lucilia dispar* Dufour, 1845:

寄 主：麻雀(*Passer montanus saturatue*)的雛鳥，一巢內幼蟲最多時 180 隻。紫翅椋鳥)巢穴。

分 佈：貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、土耳其、北非、歐洲(瑞典)。

Protocalliphora chrysorrhoea (Meigen) 藍原麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1474)

Musca chrysorrhoea Meigen, 1826:60.

=*Protocalliphoea surcoufi* Séguy, 1928:

寄 主：

分 佈：西藏、河北、青海、甘肅、遼寧、吉林；蘇聯、奧地利、德國、法國、荷蘭、英國、芬蘭、挪威。

Protocalliphora lii Fan 李氏原麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1474)

Protocalliphora lii Fan, 1965:210.

寄 主：

分 佈：內蒙古(大興安嶺哈倫阿爾山)、吉林；蒙古、西伯利亞。

Protocalliphora maruyamensis Kano et Shinonaga 鈍葉原麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1475)

Protocalliphora maruyamensis Kano et Shinonaga, 1966:166.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本(北海道)、俄羅斯(遠東地區)。

Protocalliphora proxima Grunin 細葉原麗蠅 (Xue et al., 1996, 2:1475)

Protocalliphora proxima Grunin, 1966:899.

寄 主：

分 佈：新疆；俄羅斯(烏蘇里斯克)、芬蘭。

Rhinia apicalis (Wiedemann) 黃褐鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1505)

Idia apicalis Wiedemann, 1830:354.
=*Rhinia testacea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Idia flavipennis* Macquart, 1843:
=*Idia pleuralis* Thomson, 1869:
=*Rhinia fulvipes* Bigot, 1874:

寄 主：幼蟲能寄生蜂類。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、雲南；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲北部及約克角半島、斐濟、太平洋諸島、伊朗、以色列、巴勒斯坦、非洲(加那利群島)。

Rhinia sauteri Peris 臺灣鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1505)

Rhinia sauteri Peris, 1951:238.

寄 主：幼蟲能寄生蜂類。

分 佈：臺灣。

Rhyncomya flavibasis (Senior-White) 黃基鼻彩蠅 (Xue et al., 1996, 2:1498)

Metallea flavibasis Senior-White, 1922:168.
=*Rhyncomya nigrofemorata* Senior-White, 1923:

寄 主：可能捕食白蟻或寄生蜂類。

分 佈：海南、雲南；印度、斯里蘭卡。

Rhyncomya pollinosa (Townsend) 粉被鼻彩蠅 (Xue et al., 1996, 2:1499)

Trichometallea pollinosa Townsend, 1917:194.

寄 主：可能捕食白蟻或寄生蜂類。

分 佈：福建；印度、斯里蘭卡。

Rhyncomya setipyga Villeneuve 鬃尾鼻彩蠅 (Xue et al., 1996, 2:1499)

Rhyncomya setipyga Villeneuve, 1929:185.
=*Musca collecta* (?) Walker, 1860:

寄 主：可能捕食白蟻或寄生蜂類。

分 佈：臺灣(高雄)、福建、廣東、浙江；日本、菲律賓、尼泊爾。

Silbomyia cyanea (Matsumura) 寬頰閃迷蠅 (Xue et al., 1996, 2:1374)

Biomyioides cyanea Matsumura, 1916:387.
=*Silbomyia latigena* Enderlein, 1936:

寄 主：

分 佈：臺灣、四川。

Silbomyia hoeneana Enderlein 華南閃迷蠅 (Xue et al., 1996, 2:1374)

Silbomyia hoeneana Enderlein, 1936:439.
寄 主：幼蟲寄生于蝸牛體內。
分 佈：江西、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇。

Stomorhina discolor (Fabricius) 異色口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1508)
Musca discolor Fabricius, 1794:3022.
=*Idia metallia* Macquart, 1835:
=*Idia quadrimaculata* Macquart, 1851:
=*Idia aequalis* Walker, 1859:
=*Idia cincta* Bigot, 1874:
=*Stomorhyna muscina* Rondani, 1875:
=*Stomorhina scalaris* Bigot, 1887:
寄 主：捕食家蠅幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、海南、雲南、西藏、浙江；菲律賓、越南、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、羅門群島、斐濟群島、馬克薩斯群島.

Stomorhina lunata (Fabricius) 月紋口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1508)
Musca lunata Fabricius, 1805:292.
=*Idia fasciata* Meigen, 1826:
=*Stomorhyna maculata* Rondani, 1965:
寄 主：蝗科卵塊和死白蟻在一起。
分 佈：臺灣、雲南、西藏、四川；馬來西亞、寮國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、伊朗、土耳其、聯合大公國、敘利亞、蘇聯、西班牙、歐洲南部和中部、馬達加斯加、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞、肯尼亞、剛果、南非、墨西哥、巴西。

Stomorhina melastoma (Wiedemann) 黑嘴口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1508)
Idia melastoma Wiedemann, 1830:253.
=*Euidiella purpurea* Townsend, 1917:
寄 主： 、
分 佈：雲南；印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Stomorhina obsoleta (Wiedemann) 不顯口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1509)
Idia obsolete Wiedemann, 1830:355.
=*Rhinia discolor* (Fabricius); Fan, 1965: (in part)
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、寧夏、黑龍江；日本、俄羅斯(遠東地區)、密克羅尼西亞。

Stomorhina unicolor (Macquart) 單色口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1509)
Idia unicolor Macquart, 1851:213.
寄 主：
分 佈：臺灣；馬來西亞、爪哇。

Stomorhina veterana Villeneuve 褐色口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1509)

Stomorhina veterana Villeneuve, 1927:395.
寄 主：
分 佈：臺灣；馬來西亞、印尼。

Stomorhina xanthogaster (Wiedemann) 黃腹口鼻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1509)
Idia xanthogaster Wiedemann, 1820:21.
=*Idia australis* Walker, 1849:
=*Iddiellopsis similes* Townsend, 1917:
=*Rhinia majuscula* Villeneuve,1932:
寄 主：
分 佈：臺灣、西藏；馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲、所羅門群島。

Muscidae 家蠅科

Achanthiptera rohrelliformis (Robineau-Desvoid) 毛脈蠅 (Fan, 1992:230; Xue et al., 1996, 1:846)
Phyllis rohrelliformis Robineau-Desvoidy, 1830:604.
=*Musca inanis* Fallén, 1825:
=*Anthomyza insignita* Zetterstedt, 1846:
=*Sphecolyma flava* Perris, 1876:
捕 食：幼蟲生活在胡蜂 *Vespa* spp. 巢內。
分 佈：山西；中亞、法國。

Brontaea ascendens (Stein) 升斑裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)
Limnophora ascendens Stein, 1915:32.
=*Gymnodia spilogaster* Séguy, 1932:
=*Gymnodia expansa* Snyder, 1965:
捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西；日本、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Brontaea distincta (Stein) 分斑裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)
Limnophora distincta Stein, 1909:252.
捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。
分 佈：臺灣、湖南、雲南；緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼(爪哇)。

Brontaea genurufoides Xue et Wang 擬黃膝裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)
Brontaea genurufoides Xue et Wang, 1992:393.
捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。
分 佈：山西。

Brontaea humilis (Zetterstedt) 小裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)
Aricia humilis Zetterstedt, 1860:622.
捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。
分 佈：內蒙古；日本、蘇聯、歐洲中部及北部。

Brontaea lasiopa (Emden) 毛頰裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)

Gymnodia lasiops Emden,1965:636.

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：廣東、雲南、四川；日本、緬甸、印度。

Braontaea ezensis latifronta Xue et Wang 寬額裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)

Braontaea ezensis latifronta Xue et Wang, 1992:395.

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：山西。

Brontaea nigrogrisea (Karl) 黑灰裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)

Limnophora (*Gymnodi*) *nigrogrisea* Karl, 1939:279.

=*Gymnodia interposita* Emden, 1965:

=*Gymnodia marguerita* Snyder, 1965:

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：山西、遼寧、黑龍江；日本、泰國、印度、澳洲。

Brontaea polystigma (Meigen) 多點裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1100)

Anthomyia polystigma Meigen, 1826:150.

=*Limnophora rivularis* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Anthomyia singularis* Macquart, 1835:

=*Gymnodia pratensis* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Limnophora scripta* Nowicki, 1868:

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：內蒙古；俄羅斯(高加索、歐洲部分)、歐洲南部及中部。

Brontaea sichuanensis Xue et Feng 四川裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1102)

Brontaea sichuanensis Xue et Feng, 1992:394.

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：四川。

Brontaea tonitrui (Wiedemann) 花裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1102)

Anthomyia tonitrui Wiedemann, 1824:52.

=*Limnophora macei* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Anthomyia canache* Walker, 1849:

=*Anthomyia aliena* Walker, 1852:

=*Mijobia nigripes* Doleschall, 1856:

=*Gymnodia lobalis* Thomson, 1869:

=*Limnophora variegata* Stein, 1903:

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、貴州、雲南、浙江、上海；東洋區、非洲區、古北區南部。

Brontaea yunnanensis Xue et Chen 雲南裸池蠅 (Xue et al., 1996, 1:1102)

Brontaea yunnanensis Xue et Chen, 1992:393.

捕 食：幼蟲糞生，三齡幼蟲食肉性，捕食其它雙翅目幼蟲。
分 佈：雲南。

Graphomyia maculata (Scopoli) 斑紋蠅 (ASZI, 1987, 2:656)
捕 食：3 齡幼蟲捕食食蚜蠅科的 *Eristalis* 及細腰蚊科的 *Ptychoptera* (幼蟲)
分 佈：陝西、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

Limnophora albitarsis Stein 白跗池蠅 (Xue et al., 1996, 1:957)
Limnophora albitarsis Stein, 1965:34.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：臺灣、香港；緬甸、印度、印尼。

Limnophora albonigra Enden 白黑池蠅 (Xue et al., 1996, 1:957)
Limnophora albonigra Enden, 1965:562.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類 Ceratopogonids、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：雲南；斯里蘭卡。

Limnophora apicicerca Xiang et Xue 尖葉池蠅 (Xue et al., 1996, 1:958)
Limnophora apicicerca Xiang et Xue, 1996, 1:959.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：新疆。

Limnophora apiciseta Emden 端鬃池蠅 (Xue et al., 1996, 1:958)
Limnophora apiciseta Emder, 1965:598.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：廣東、海南、廣西、貴州、雲南；緬甸、印度、尼泊爾。

Limnophora argentata Emden 銀池蠅 (Xue et al., 1996, 1:958)
Limnophora argentata Emden, 1965:583.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：貴州、四川、陝西、山西；緬甸。

Limnophora argentitriangula Xue et Wang 銀三角池蠅 (Xue et al., 1996, 1:958)
Limnophora argentitriangula Xue et Wang, 1985:289-291.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲
分 佈：山西。

Limnophora asiatica Xue et Zhang 亞洲池蠅 (Xue et al., 1996, 1:958)

Limnophora asiatica Xue et Zhang, 1996, 1:958-961.

=*Limnophora scrupulossa*; Zhang et al., 1990:15. (*nec* Zetterstedt, 1845)

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：河北。

Limnophora bannaensis Zhang, Xue et Wang 版納池蠅 (Xue et al., 1996, 1:961)

Limnophora bannaensis Zhang, Xue et Wang, 1996, 1:961.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：雲南。

Limnophora breviventris Stein 短腹池蠅 (Xue et al., 1996, 1:961)

Limnophora breviventris Stein, 1915:33.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣(集集)。

Limnophora brunneisquama Mu et Zhang 棕瓣池蠅 (Xue et al., 1996, 1:961)

Limnophora brunneisquama Mu et Zhang, 1990:14.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：山西、遼寧。

Limnophora conica Stein 錐紋池蠅 (Xue et al., 1996, 1:962)

Limnophora conica Stein, 1915:30.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣、海南；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼。

Limnophora cyclocerca Zhou et Xue 圓葉池蠅 (Xue et al., 1996, 1:962)

Limnophora cyclocerca Zhou et Xue, 1987:111-113.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：海南、廣西、貴州、四川。

Limnophora exigua (Wiedemann) 斑板池蠅 (Xue et al., 1996, 1:962)

Anthomyia exigua Wiedemann, 1830:658.

=*Limnophora* (*Pseudolimnophora*) *plumiseta* Stein, 1903:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣、廣東、貴州、雲南；以色列、埃及，東洋區、澳洲區、非洲熱帶區。

Limnophora fallax Stein 隱斑池蠅 (Xue et al., 1996, 1:962)

Limnophora fallax Stein, 1919:72. (as var. of *maculosa* Meigen)

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北；日本、東洋區、蘇門答臘。

Limnophora furcicerca Xue et Liu 裂葉池蠅 (Xue et al., 1996, 1:962)

Limnophora furcicerca Xue et Liu, 1990:14.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

Limnophora flavifrons Stein 黃額池蠅 (Xue et al., 1996, 1:965)

Limnophora flavifrons Stein, 1915:35.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣(安平)。

Limnophora guizhouensis Zhou et Xue 貴州池蠅 (Xue et al., 1996, 1:965)

Limnophora guizhouensis Zhou et Xue, 1987:113-115.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：貴州、四川。

Limnophora himalayensis Brunetti 喜馬池蠅 (Xue et al., 1996, 1:965)

Limnophora himalayensis Brunetti, 1907:382.

=*Limnophora fasciata* Wu, 1988:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、陝西、甘肅；緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Limnophora interfrons Hsue 狹額池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)

Limnophora interfrons Hsue, 1982:416.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：遼寧。

Limnophora latiorbitalis Hsue 寬眶池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)

Limnophora latiorbitalis Hsue, 1982:417.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：河北、遼寧。

Limnophora minutifallax Lin et Xue 小隱斑池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)
Limnophora minutifallax Lin et Xue, 1986:419-421.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：湖南、廣東、貴州、雲南、浙江、陝西。

Limnophora mongolica Xue et Zhang 蒙古池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)
Limnophora mongolica Xue et Zhang, 1996, 1:966.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：內蒙古(巴盟潮格)。

Limnophora nigra Xue 黑池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)
Limnophora nigra Xue, 1984:378-380.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：河北、北京、遼寧、吉林。

Limnophora nigrilineata Xue 黑紋池蠅 (Xue et al., 1996, 1:966)
Limnophora nigrilineata Xue, 1984:380-381.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：遼寧。

Limnophora nigripes (Robineau-Desvoidy) 黑足池蠅 (Xue et al., 1996, 1:968)
Limosia nigripes Robineau-Desvoidy, 1830:541.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：新疆、遼寧、黑龍江；俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、歐洲(法國)、新北區。

Limnophora nigrisrupulosa Xiang et Xue 黑銳池蠅 (Xue et al., 1996, 1:968)
Limnophora nigrisrupulosa Xiang et Xue, 1996, 1:968.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：新疆。

Limnophora orbitalis Stein 銀眶池蠅 (Xue et al., 1996, 1:968)
Limnophora orbitalis Stein, 1907:339.
寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。
分 佈：雲南、陝西、山西、河北、青海、遼寧、吉林；日本、塔吉克斯坦。

Limnophora parastylata Xue 側突池蠅 (Xue et al., 1996, 1:968)

Limnophora parastylata Xue, 1984:381.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：北京、遼寧。

Limnophora papulicerca Xue et Zhang 丘葉池蠅 (Xue et al., 1996, 1:968)

Limnophora papulicerca Xue et Zhang, 1996, 1:968-971.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：吉林(長白山)。

Limnophora pollinifrons Stein 粉額池蠅 (Xue et al., 1996, 1:971)

Limnophora pollinifrons Stein, 1916:107.

=*Limnophora corsicana* Schnabl, 1911:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：陝西、山西、遼寧、黑龍江；俄羅斯、塔吉克斯坦、土耳其、摩洛哥、歐洲。

Limnophora prominens Stein 突出池蠅 (Xue et al., 1996, 1:971)

Limnophora prominens Stein, 1904:106.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：福建、貴州；日本、東洋區、爪哇。

Limnophora papulicerca pubertiseta Xue et Zhang 壯鬃池蠅 (Xue et al., 1996, 1:971)

Limnophora papulicerca pubertiseta Xue et Zhang, 1996, 1:971-972.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Limnophora purgata Xue 淨池蠅 (Xue et al., 1996, 1:972)

Limnophora purgata Xue, 1992:362-363.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：遼寧。

Limnophora rufimana (Strobl) 緋蹠池蠅 (Xue et al., 1996, 1:972)

=*Limnophora* (s. str) *meadei* Schnabl, 1889:

Coenosia (*Pseudolimnophora*) *rufimana* Strobl, 1893:272.

=*Stroblia brueri* Pokorny, 1893:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：北京、新疆、遼寧、黑龍江；烏克蘭、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、塔吉斯坦、阿富汗、土耳其、以色列、歐洲(奧地利)、北非。

Limnophora scrupulosa (Zetterstedt) 銳池蠅 (Xue et al., 1996, 1:972)

Aricia scrupulosa Zetterstedt, 1845:1483.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：新疆；西伯利亞西部、波蘭、愛沙尼亞、丹麥、歐洲西部和北部。

Limnophora septentrionalis Xue 北方池蠅 (Xue et al., 1996, 1:972)

Limnophora septentrionalis Xue, 1984:382-384.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：陝西、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

Limnophora setinerva Schnabl 鬃脈池蠅 (Xue et al., 1996, 1:972)

Limnophora setinerva Schnabl, 1911:279.

=*Limnophora atroscutellata* Strobl, 1910:

=*Limnophora glaucescens* Enden, 1965:

=*Limnophora setinervoides* Ma, 1981:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、河南、陝西、山西、河北、遼寧、吉林；日本、土耳其、以色列、希臘、西班牙、葡萄牙、法國、南斯拉夫、埃及。

Limnophora spoliata Stein 掠池蠅 (Xue et al., 1996, 1:975)

Limnophora spoliata Stein, 1915:31.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣(集集)；爪哇。

Limnophora subscrupulosa Zhang et Xue 肖銳池蠅 (Xue et al., 1996, 1:975)

Limnophora subscrupulosa Zhang et Xue, 1990:15.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：吉林(長白山)。

Limnophora surrecticerca Xue et Zhang 直葉池蠅 (Xue et al., 1996, 1:975)

Limnophora surrecticerca Xue et Zhang, 1996, 1:975-977.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：貴州。

Limnophora suturalis Stein 縫池蠅 (Xue et al., 1996, 1:977)

Limnophora suturalis Stein, 1915:36.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣(集集、安平、高雄)。

Limnophora tigrina (Am Stein) 濕斑池蠅 (Xue et al., 1996, 1:977)

Anthomyia tigrina Am Stein, 1860:96.
=*Musca notata* Fallén, 1825:
=*Anthomyia tigrina* Am Stein, 1857:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：山西、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；伊朗、塔吉克斯坦、亞美尼亞、阿拜疆、格魯吉亞、拉脫維亞、俄羅斯、瑞士、北非。

Limnophora tibetana Xue et Zhang 西藏池蠅 (Xue et al., 1996, 1:977)

Limnophora tibetana Xue et Zhang, 1996, 1:977-980.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：西藏(日喀則)。

Limnophora triangula (Fallén) 三角池蠅 (Xue et al., 1996, 1:980)

Musca triangula Fallén, 1825:74.
=*Anthomyia omisss* Meigen, 1826:
=*Limnophora coenosa* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Limnophora brunicosa* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Cuculla cinerea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Cuculla grisea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Cuculla palustris* Robineau-Desvoidy, 1830:

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：陝西、山西、河北、北京、遼寧；日本、俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、塔吉克斯坦、瑞典。

Limnophora veniseta Stein 脈鬃池蠅 (Xue et al., 1996, 1:980)

Limnophora veniseta Stein, 1915:39.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：臺灣、海南；爪哇。

Limnophora virago Emden 坤池蠅 (Xue et al., 1996, 1:980)

Limnophora virago Emden, 1965:600.

寄 主：成蟲捕食小搖蚊(Chironomidae)等昆蟲，幼蟲多水生，捕食寡毛類環蟲(Oligochaetes)和蠓類(Ceratopogonids)、毛蠓類(Psychodids)等小幼蟲。

分 佈：廣東、海南、雲南；馬來西亞、印度。

Lispe alpinicola Zhong, Wu et Fan 高原螯溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:994)

Lispe alpinicola Zhong, Wu et Fan, 1981:245-246.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：西藏。

Lispe argenteiceps Ma et Mou 銀頭溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:994)

Lispe argenteiceps Ma et Mou, 1992:370.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：遼寧。

Lispe assimilis Wiedemann 肖溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:994)

Lispe assimilis Wiedemann, 1824:51.
=*Lispe quadrilineata* Macouart, 1835:
=*Lispe inexpectata* Canzoneri et Meneghlni, 1966:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、廣東；日本、菲律賓、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、西薩摩亞、東薩摩亞(美國)、斐齊、法屬波利尼西亞、保加利亞、意大利、法國。

Lispe bivittata Stein 雙條溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:995)

Lispe bivittata Stein, 1909:262-263.
=*Lispa nigrofaciec* Becker, 1914:
=*Lispa canis* Malloch, 1922:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、湖南、海南；日本(小笠原群島)、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼(爪哇)、埃及。

Lispe bivittata subbivittata Mou 擬雙條溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1009)

Lispe bivittata subbivittata Mou, 1992:375-376.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：遼寧。

Lispe brunnicosa (Becker) 棕蛛溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:995)

Lispa brunnicos Becker, 1904:40.
=*Lispa diminuata* Becker, 1913:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：青海；蒙古、塔吉克斯坦。

Lispe caesia Meigen 青灰溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:995)

Lispe caesia Meigen, 1826:228.
=*Lispe crassiuscula* Loew, 1847:
=*Lispa convexiuscula* Kowarz, 1892:
=*Lispa odessae* Becker, 1904:

捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山西、遼寧；烏克蘭、敘利亞、以色列、土耳其、歐洲、非洲北部。

Lispe cinifera (Becker) 長芒溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:995)
Lispa cinifera Becker, 1904:41.
=*Lispa seticincta* Becker, 1904:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：青海、遼寧；亞洲中部。

Lispe consanguinea Loew 吸溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:995)
Lispe consanguinea Loew, 1858:
=*Lispa truquii* Rondni, 1866:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、伊朗、德國、瑞典。

Lispe cotidiana Snyder 梯斑溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)
Lispe cotidiana Snyder, 1954:2.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：中國；蒙古、東西伯利亞、遠東地區、新北區(加拿大)、新熱帶區(墨西哥)。

Lispe flavicornis (Stein) 黃角溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)
Lispa flavicornis Stein, 1909:260.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣；菲律賓、印尼(爪哇)、斯里蘭卡。

Lispe flavinervis (Becker) 黃脈溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)
Lispa flavinervis Becker, 1904:20.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：廣東、青海；蒙古、烏克蘭、俄羅斯。

Lispe frigida Erichson 寒溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)
Lispe frigida Erichson, 1851:67.
=*Lispa parcespinosa* Becker, 1900:
=*Lispa behemica* Becker, 1904:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山西、遼寧；東西伯利亞、歐洲、北美洲。

Lispe hebeiensis Ma et Tian 河北溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)
Lispe hebeiensis Ma et Tian, 1993:82-84.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：河北。

Lispe hirsutipes Mou 毛脛溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:997)

Lispe hirsutipes Mou, 1992:371.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：遼寧。

Lispe kowarzi (Becker) 黃蹠溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Lispa kowarzi Becker, 1903:116.
=*Lispa pallitarsis* Stein, 1909:
=*Lispe unicolor* Hennig, 1960:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、埃及(開羅)。

Lispe lanceoseta Wang et Fan 柳葉溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Lispe lanceoseta Wang et Fan, 1981:253-254.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山西。

Lispe leucospila (Wiedemann) 白點溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Coenosia leucospila Wiedemann, 1830:441.
=*Lispe vittata* Stein, 1900:
=*Lispe pectinipes,* authors, *nec* Becker.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、浙江、上海、河南? 山東? 菲律賓、馬來西亞、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、東印度群島、澳洲區、非洲區。

Lispe litorea Fallén 海濱溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Lispe litorea Fallén, 1825:94.
=*Lispe pilosa* Loew, 1826:
=*Lispe gemina* Van de Wulp 1868:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山西、吉林；蘇聯、荷蘭、英國、德國、丹麥、瑞典、芬蘭。

Lispe loewi (Ringdahl) 缺髭溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Lispa loewi Ringdahl, 1922:177.
=*Lispa bayardi* Séguy, 1950:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山西、遼寧；北非、蘇丹、瑞典。

Lispe longicollis Meigen 長條溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)
Lispe longicollis Meigen, 1826:225.
=*Lispa leucomelaena* Kowatz, 1892:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：廣東、安徽、山東、山西、河北、北京、天津、新疆、遼寧、吉林、黑龍江蘇聯、印度、伊朗、土耳其、以色列、保加利亞、捷克和斯洛伐克、南斯拉夫匈牙利、英國、德國、丹麥、阿爾及利亞。

Lispe melaleuca Loew 月紋溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1002)

Lispe melaleuca Loew, 1847:28.
=*Lispa lecospyla* Rondani, 1866:
=*Lispa sexpunctata* Rondani, 1866:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山東、河北、北京、天津、新疆、遼寧、黑龍江；蒙古、蘇聯、印度、土耳其、摩洛哥、歐洲南部及中部(西西里島)。

Lispe monochaita Mou et Ma 單毛溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Lispe monochaita Mou et Ma, 1992:374.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：遼寧。

Lispe neeuliginosa Snyder 新濕溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Lispe neeuliginosa Snyder, 1954:24.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：遼寧；北美洲(加利福尼亞)。

Lispe orientalis Wiedemann 東方溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Lispe orientalis Wiedemann, 1830:51.
=*Lispe sinenisis* Schiner, 1868:
=*Lispa opac* Becker, 1914:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、馬來西亞、緬甸、印度東部、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼。

Lispe patellitarsis (Becker) 盤蹠溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Lispa patellitarsis Becker, 1914:87.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、河北、遼寧；日本。

Lispe pumila (Wiedemann) 侏溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Coenosia pumila Wiedemann, 1824:51.
=*Lispa ignobilis* Stein, 1910:
=*Lispa proletaria* Becker
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣；馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度東部、斯里蘭卡、印尼、澳洲、所羅門群島。

Lispe pygmaea (Fallén) 瘦鬚溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1006)

Lispa pygmaea Fallén, 1825:94.
=*Lispa paludosa* Desvoidy, 1830:
=*Lispa tenuipalpis* Stenhammar, 1845:

=*Lispe simplicissima* Loew, 1847:
=*Anthomyza lacteipalis* Zetterstedt. 1849:
=*Hyllemyia maculifrons* Macquart, 1857:
=*Lispa suturata* Rondani, 1866:
=*Lispe hyalinippennis* Thomson, 1869:
=*Lispa longiuscula* Rondani, 1877:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、福建、上海、山東、北京、新疆、遼寧、吉林；蒙古、亞洲西部、巴基斯坦、歐洲(瑞典)、非洲北部、夏威夷。

Lispe quaerens (Villeneuve) 天目溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1009)
Lispa quaerens Villeneuve, 1936:157.
=*Lispe tienmueensis* Fan, 1974:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：浙江、山西、遼寧、吉林；塔吉克斯坦、土耳其、伊朗、西班牙、意大利、南斯拉夫。

Lispe serricipalpis (Stein) 絹溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1009)
Lispa sericipalppis Stein, 1904:110.
=*Lispa trilineata* Stein, 1906:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣；緬甸、印度、斯里蘭卡、爪哇。

Lispe sinica Hennig 中華溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1009)
Lispe sinica Hennig, 1960:440.
=*Lispe leucospila sinica* Hennig, 1960:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：北京、內蒙古、黑龍江；印度。

Lispe tentaculata (De Geer) 螯溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1009)
Musca tentaculata De Geer, 1776:86.
=*Lispa fluviatilis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Lispa ripayia* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Lispa tarsalis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Lispe tibialis* Macquart, 1839:
=*Lispa cnariensis* Becker, 1904:
=*Lispe sakhaliensis* Yamada, 1927:
=*Lispa draperi* Segur, 1933:
=*Lispa dissona* Villeneuve, 1936:
=*Lispa fulviornata* Santos Abreu, 1976:
=*Lispa umbrata* Santos Abreu, 1976:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：山東、山西、河北、北京、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古亞洲中部和西部、印度北部、土耳其、埃及、非洲北部、西班牙(加那利群島)瑞典、北美洲、危地馬拉、秘魯。

Lispe tetrastigma Schiner 四點溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1010)

Lispe tetrastigma Schiner, 1868:297.
=*Lispa armipes* Becker, 1903:
=*Lispa delerminata* Becker, 1914:
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣；印度、斯里蘭卡。

Lispe vittipennis Thomson 明翅溜蠅 (Xue et al., 1996, 1:1010)
Lispe vittipennis Thomson, 1869:561.
捕 食：水中或水面小蟲。
分 佈：臺灣、香港。

Mesembrina aurpcaidata Emden 金尾墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1026)
Mesembrina aurpcaidata Emden, 1965:115, 116.
=*Mesembrina magnifica*; Fang et Fan, 1988:
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：雲南、西藏；緬甸。

Mesembrina decipiens Loew 迷墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)
Mesembrina decipiens Loew, 1873:239.
=*Mesembrina putziloi* Portschinsky, 1873:
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、俄羅斯(貝加爾湖)。

Mesembrina intermedia Zetterstedt 介墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)
Mesembrina intermedia Zetterstedt, 1849:3274.
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：山西、新疆、內蒙古；瑞典。

Mesembrina magnifica Aldrich 壯墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)
Mesembrina magnifica Aldrich, 1925:9.
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：四川、山西、新疆、內蒙古；歐洲。

Mesembrina meridiana meridiana (Linnaeus) 南墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)
Musca meridiana Linnaeus, 1758:595.
=*Mesembrina ingrica* Portschinsky, 1873:
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：四川、青海、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、俄羅斯、瑞典。
天 敵：食蟲虻。

Mesembrina meridiana nudiparafacia Fan 裸顴南墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)
Mesembrina meridiana nudiparafacia Fan, 1965:100.
捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。
分 佈：西藏、新疆。

Mesembrina montana Zimin 山墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)

Mesembrina montana Zimin, 1951:239.

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：青海。

Mesembrina montana asternopleuralis Fan 裸側山墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)

Mesembrina montana asternopleuralis Fan, 1992:267.

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：四川。

Mesembrina mystacea (Linnaeus) 蜂墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1027)

Musca mystacea Linnaeus, 1758:591.
=*Musca discolor* Linnaeus, 1758:
=*Musca bombylius* De Geer, 1776:
=*Syrphus apiarius* Fabricius, 1781:
=*Mesembrina matutina* Rondani, 1862:
=*Mesembrina vespertina* Rondani, 1862:

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：新疆；蒙古、俄羅斯、土耳其、歐洲、非洲北部山地。

Mesembrina resplendens Wahlberg 亮墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1028)

Mesembrina resplendens Wahlberg, 1844:66.

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：新疆；瑞典。

Mesembrina resplendens ciliimaculata Fan et Zheng 毛斑亮墨蠅 (Xue et al., 1996, 1:1028)

Mesembrina resplendens ciliimaculata Fan et Zheng, 1992:265.

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：雲南、西藏、四川、遼寧、吉林、黑龍江。

Mesembrina tristis Aldrich 幽墨蠅(Xue et al., 1996, 1:1028)

Mesembrina tristis Aldrich, 1926:7.

捕 食：三齡幼蟲可長達 20mm, 捕食其它蠅類和甲蟲的幼蟲。

分 佈：雲南、四川、青海。

Musca (s. str.) **domestica** Linnaeus 家蠅 (Xue et al., 1996, 1:1044-1052; Zhang et al., 1994, 21(1):90, 96)

Musca domestica Linnaeus, 1758:596.
=*Musca domestica major* De Geer, 1776:
=*Musca nebulo* Fabricius, 1794:
=*Ascaris conosoma* Jordens, 1802:
=*Musca umbraculata* Fabricius, 1805:
=*Musca aurifacies* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Musca vagatoria* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Musca lateralis* Macquart, 1834:
=*Musca pellucens* Meigen, 1835:
=*Musca frontalis* Macquart, 1843:

=*Musca vicina* Macquart, 1851:
=*Musca gymnosomea* Rondani, 1862:
=*Musca vaccina* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Musca campicola* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Musca rivularis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Musca frontalis* Rondani, 1868:
=*Musca tiberina* Saccà, 1947:
防治植病：幼蟲分泌物防治植物病害。
分 佈：北京；全世界。

Muscina (s. str.) **angustifrons** (Loew) 狹額腐蠅 (Fan, 1992:232; Xue et al., 1996, 1:1299)
Cyrtobeyra abgystufribs Loew, 1858:100-112.
捕 食：滋生爛冬瓜，三齡幼蟲捕食在同一滋生物中的其它雙翅目幼蟲。
分 佈：江西、廣西、四川、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(遠東)。

Muscina (s. str.) **assimilis** (Fallén) 肖腐蠅 (Fan, 1992:232)
Musca assimilis Fallén, 1823:56.
捕 食：三齡幼蟲捕食在同一滋生物中的其它雙翅目幼蟲。
分 佈：山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲、敘利亞、西班牙、北美。

Muscina (Pararicia) japonica Shinonaga 本腐蠅 (Fan, 1992:231; Xue et al., 1996, 1:1300)
Muscina nigra Shinonaga, 1970:
=*Muscina* (*Pararicia*) *japonica* Shinonaga, 1974:118. (nom. n. for *nigra*)
捕 食：三齡幼蟲捕食在同一滋生物中的其它雙翅目幼蟲。
分 佈：山西、河北、遼寧、吉林；日本。

Muscina (Pararicia) pascuroum (Meigen) 牧場腐蠅 (Fan, 1992:231; Xue et al., 11996, 1:1300)
Musca pascuroum Meigen, 1826:74.
捕 食：三齡幼蟲捕食在同一滋生物中的其它雙翅目幼蟲。
分 佈：雲南、浙江、江蘇、山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、西亞、南亞北部、北非、北美。

Muscina (s, str,) **stabulans** (Fallén) 廄腐蠅 (Fan, 1992:231; Xue et al., 1996, 1:1300)
Musca stabulans Fallén, 1817:252.
=*Musca prodeo* Harris, 1780:
=*Anthoomyia cinerascens* Wiedemann, 1817:
=*Muscina grisea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Muscina picaena* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Mydaea vomiturionis* Robineau-Desvoidy, 1849:
捕 食：三齡幼蟲捕食在同一滋生物中的其它雙翅目幼蟲。
分 佈：雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、天津、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；世界各地。

Ophyra chalcogster (Wd.) 斑蹠黑蠅 (He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)

分 佈：北京。

Passeromyia heterochaeta (Villeneuve) 異芒雀蠅 (Xue et al., 1996, 1:1302)

Muscina heterochaeta Villeneuve, 1915:225.

寄 主：產卵小型鳥類巢中，幼蟲吸食鳥血；家雀、燕、烏鴉等20餘種。

分 佈：臺灣、廣東；緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、埃塞俄比亞、津巴布韋。

Polietes domitor (Harris) 白線直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1066)

Musca domitor Harris, 1780:148.

=*Musca aalbolineata* Fallén, 1823:

=*Macrosoma floralis* Robineau-Desvoidy, 1830:

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：陝西、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、俄羅斯、歐洲中部及北部、葡萄牙(亞速爾群島)、英國。

Polietes fuscisquamosus Emden 峨嵋直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1066)

Polietes fuscisquamosus Emden, 1965:149.

=*Polietes omeishanensis* Fan, 1965:

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：四川；緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦。

Polietes hirticrura Meade 毛脛直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1066)

Polietes hirticrura Meade, 1887:179.

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：中國；蒙古、蘇聯、英國、愛爾蘭、美國。

Polietes koreicus Park et Shinonaga 朝鮮直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1066)

Polietes koreicus Park et Shinonaga, 1985:213.

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：中國北方? 朝鮮。

Polietes nigrolimbata (Bonsdorff) 黑緣直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1066)

Arocoa nigrolimbata Bonsdorff, 1866:172.

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、瑞典、芬蘭、挪威。

Polietes orientalis Pont 東方直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1068)

Polietes orientalis Pont, 1972:328-331.

捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。

分 佈：雲南、四川；印度、尼泊爾。

Polietes steinii (Ringdahl) 小直脈蠅 (Xue et al., 1996, 1:1068)

Trichopticus steinii Ringdahl, 1913:56.
捕 食：幼蟲肉食性，捕食同一小生境的其它蠅類幼蟲，具互相殘殺。
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯、德國、英國、瑞典、芬蘭、挪威。

Spilogona albiarenosa Xue et Wang 白沙點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Spilogona albiarenosa Xue et Wang, 1989:232.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西。

Spilogona almqvistii (Holmgren) 長喙點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Aricia almyqvistii Holmgren, 1880:17.
=*Limnophora rostrata* Ringdahl, 1920:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西；俄羅斯遠東地區、西伯利亞、歐洲北部、瑞典、北美洲北部。

Spilogona arenosa (Ringdahl) 沙點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Limnophora arenosa Ringdahl, 1918:155.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：新疆；瑞典、挪威、芬蘭、北美洲。

Spilogona argentea (Stein) 銀點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Limnophora argentea Stein, 1907:338.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海。

Spilogona bomynensis Hennig 柴達木點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Spilogona bomynensis Hennig, 1959:280.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海。

Spilogona capaciatrata Xue et Wang 大黑點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Spilogona capaciatrata Xue et Wang, 1990:14.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西、甘肅。

Spilogona changbaishanensis Xue 長白山點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Spilogona changbaishanensis Xue, 1981:353.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：遼寧。

Spilogona costalis (Stein) 緣刺點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:983)
Limnophora costalis Stein, 1907:345.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西、青海；俄羅斯(烏拉爾山區、西伯利亞)。

Spilogona depressiuscula (Zetterstedt) 小沉點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Anthomyza depressiuscula Zetterstedt, 1837:
Anthomyza depressiuscula Zetterstedt, 1838:674.
=*Anthomyza tristiola* Zetterstedt, 1837:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：新疆；法國、英國、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、冰島。

Spilogona eximia (Stein) 寬顴點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Limnophora eximia Stein, 1907:336.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海、新疆。

Spilogona gobiensis Hennig 戈壁點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Spilogona gobiensis Hennig, 1959:263.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海、新疆。

Spilogona impar (Stein) 尖角點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Limnophora impar Stein, 1907:343.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海、新疆。

Spilogona leptocerci Mou 瘦葉點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Spilogona leptocerci Mou, 1985:13.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：河北、遼寧。

Spilogona litorea yaluensis Ma et Wang 鴨綠江點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Spilogona litorea yaluensis Ma et Wang, 1992:351.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：吉林。

Spilogona nitidicauda (Schnabl) 亮尾點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Limnophora (*Spilogona*) *nitidicauda* Schnabl, 1911:154.
=*Limnophora* (*Spilogona*) *depressa* Schnabl, 1915:
=*Spilogona jamelandica* Ringdahl, 1918:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：新疆；西伯利亞、歐洲北部、新北區。

Spilogona littoralis Mou 海濱點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)

Spilogona littoralis Mou, 1985:14.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：遼寧。

Spilogona orthosurstyla Xue et Tian 直葉點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)
Spilogona orthosurstyla Xue et Tian, 1988:287.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：河北。

Spilogona pacifica (Meigen) 和平點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:985)
Anthomyia pacifica Meigen, 1826:149.
=*Aricia vana* Zetterstedt, 1845:
=*Aricia nupta* Zetterstedt, 1845:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西；蘇聯、保加利亞、波蘭、德國、奧地利、英國、歐洲北部、北美洲。

Spilogona scutulata (Schnabl) 小盾點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Limnophora scutulata Schnabl, 1911:284.
=*Limnophora signata* Stein, 1914:
=*Limnophora munda* Tiensun, 1936:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西；波蘭。

Spilogona setigera (Stein) 鬃脛點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Limnophora setigera Stein, 1907:341.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：

Spilogona spinicosta (Stein) 基棘緣點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Limnophora spinicosta Stein, 1907:342.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海。

Spilogona spiniterebra (Stein) 棘肛點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Limnophora spiniterebra Stein, 1907:337.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海。

Spilogona surda (Zetterstedt) 聾點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Aricia surda Zetterstedt, 1845:1476.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：黑龍江；俄羅斯(堪察加半島)、歐洲北部及中部、北美洲。

Spilogona taheensis Ma et Cui 塔河點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)
Spilogona taheensis Ma et Cui, 1992:350.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：黑龍江。

Spilogona tianchia Xue et Zhang 天池點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:988)

Spilogona tianchia Xue et Zhang, 1996, 1:988-989.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：吉林(長白山)。

Spilogona tibetana Hennig 青藏點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:989)

Spilogona tibetana Hennig, 1959:259.
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：青海。

Spilogona veterrima (Zetterstedt) 夕陽點池蠅 (Xue et al., 1996, 1:989)

Aricia veterrima Zetterstedt, 1845:1588.
=*Aricia alulata* Zetterstedt, 1855:
=*Aricia serta* Pandellé, 1899:
捕 食：成蟲捕食。
分 佈：山西；蘇聯(歐洲北部部分)、瑞典。

Stomorhina lunata (Fabricius) 月紋口鼻蠅 (ASZI, 1987, 2:662)

寄 主：蝗蟲卵塊中。
分 佈：臺灣、雲南、四川；亞洲、非洲、歐洲、北美。

Sarcophagidae 麻蠅科

Agria affinis (Fallén) 普野蠅 (Xue et al., 1996, 2:1561)

Musca affinis Fallén, 1817:237.
=*Agria punctata* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Agria grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Sarcophaga quinguevittata* Hartig, 1837:
=*Sarcophaga procax* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga arvensis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Agria vittata* Brauer, 1883:
寄 主：
分 佈：西藏、新疆；蒙古、蘇聯、歐洲(瑞典)，古北區。

Agria japonica Rohdendorf 日本野蠅 (He et al., 1988:22)

Agria japonica Rohdendorf
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。
分 佈：北京。

Agria latifrans Fall. 寬額野蠅 (ASZI, 1987, 2:677)

寄 主：柳毒蛾(幼蟲)
分 佈：北京、新疆、內蒙古；歐洲。

Agria punctata Robineau-Desvoidy 普點野蠅 (Fan, 1992:613)

Agria punctata Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Musca affinis* Fallén, 1817:
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：青海、新疆。

Agria xiangchengensis Chao et Zhang 鄉城野蠅 (Fan, 1992:613; Xue et al., 1996, 2:1561; Zhang et Zhao, 1992:1174)
Agria xiangchengensis Chao et Zhang, 1988:276.
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：四川(鄉城)。

Agriella gobica (Rohdendorf) 戈壁野折麻蠅 (Fan, 1992:625; Xue et al., 1996, 2:1569)
Blaesoxipha gobica Rohdendorf, 1928:38.
寄 主：擬步甲(Tenebrionidae)或蝗科(Acrididae)。
分 佈：內蒙古(西部戈壁、哈密東部)；蒙古。

Aleximyia albifrons Chao et Zhang 白頭阿蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1550)
Aleximyia albifrons Chao et Zhang, 1988:276.
寄 主：
分 佈：新疆。

Amobia deserta xizangensis Zhong, Wu et Fan 西藏沙摩蠅 (Wu, 1988:575)
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

Amobia distorta (Allén) 長突摩蜂麻蠅 (Fan, 1992:586; Xue et al., 1996, 2:1531;Zhang et Zhao, 1992:1181)
Pachyophthalmus distorta Allén, 1926:15.
=*Pachyophthalmus dyki* Jacentkovsky, 1939:
寄 主：
分 佈：臺灣、四川、陝西；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯(東歐)、歐洲北部、阿爾及利亞、北美。

Amobia pelopei (Rondani) 伯氏摩蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1531)
Sphixapata pelopei Rondani, 1859:228.
=*Pachyophthalmus auriceps* Baranov, 1935:
=*Senotainiella decolor* Zumpt, 1952:
=*Pachyophthalmus alienus* Dodge, 1955:
寄 主：
分 佈：臺灣；蘇聯、歐洲(意大利)、菲律賓、馬來西亞、斯里蘭卡、澳洲、俾斯麥群島。

Amobia signata (Meigen) 斑摩蜂麻蠅 (ASZI, 1987, 2:677; Fan, 1992:585; Xue et al., 1996, 2:1531; Zhang et Zhao, 1992:1181)
Tachina signata Meigen, 1824:303.
=*Amobia conica* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Megaera nigra* Macquart, 1834:

=*Sweden oculata* Zetterstedt, 1844:
=*Amobia odyneri* Zetterstedt, 1859:
=*Tachina anomalus* Zetterstedt, 1859:
=*Tachina deprimata* Zetterstedt, 1859:
=*Sooguxaoata maculosa* Rondani, 1859:
=*Amobia cinerea* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia ardeacea* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia obliquata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia laeta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia cinereifrons* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia fugitiva* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia incana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia hortulana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia despecta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia flavicans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia vivida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia pervia* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia biciliata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia aurifacies* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Amobia praecox* Robineau-Desvoidy, 1863:

寄 主：胎生幼蟲
Sphegidae 細腰蜂科(巢中)
Trypoxylonidae 擬細腰蜂科(巢中)
Vespidae 胡蜂科(巢中)
Apidae 蜜蜂科(巢中)。

分 佈：西藏、四川、陝西、北京、新疆、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲大部、加那利群島(西班牙)、北非、北美。

Angiometopa ruralis (Fallén) 菇長肛野麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1561; Zhang, 1988:166; Zhang et Zhao, 1992:1174)

Musca ruralis Fallen, 1817:236.

寄 主：

分 佈：四川、北京、內蒙古、遼寧；蒙古、西伯利亞、亞洲中部和西部、高加索、蘇聯歐洲部分、歐洲(瑞典)。

Apodacra (Xeromyia) argyrina Rohdendorf 銀柄蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:250)

Apodacra (*Xeromyia*) *argyrina* Rohdendorf, 1930:

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古西部。

Apodacra (Xerophilomyia) brachycera Rohdendorf 黃脛柄蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:250)

Apodacra (*Xerophilomyia*) *brachycera* Rohdendorf, 1925:

寄 主：

分 佈：新疆；烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦。

Apodacra pulchra Egge 欣柄蜂麻蠅 (Fan, 1992:590; Xue et al., 1996, 2:1550; Zhang, 1988:166)

Apodacra pulchra Egger, 1861:216.

寄 主：幼蟲捕食泥蜂(Sphecidae)。

分 佈：內蒙古；蘇聯(南部)、歐洲(法國)。

Asiometopia burjata Rohdendorf 布銀麻蠅 (Zhang, 1980:143)
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Asiometopia karkalpaka Rohdendorf 卡拉亞蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:249)
Asiometopia karkalpaka Rohdendorf, 1935:
寄 主：
分 佈：新疆；烏茲別克斯坦。

Asiometopia (s. str.) **kozlovi** (Rohdendorf) 布亞蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1532)
Pedimyia koxlovi Rohdendorf, 1925:83.
=*Asiometopia burjata* Rohdendorf, 1935:
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、俄羅斯(後貝加爾)。

Asiometopia (C.) **persa** Rohdendorf 波斯亞蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1532; Zhang, 1988:166)
Asiometopia persa Rohdendorf, 1935:127-128.
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、波斯灣(北部)、伊朗。

Asiometopia tadzhika Rohdendorf 塔吉克銀麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1532; Zhang, 1980:143)
Asiometopia tadzhika Rohdendorf, 1935:127.
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古；蘇聯。

Asiometopia uzbeka Rohdendorf 烏茲別克亞蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1532; Zhang et Zhao, 1996:250)
Asiometopia uzbeka Rohdendorf, 1935:127.
寄 主：
分 佈：新疆；烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦。

Bellicria maculata Meigen 斑黑麻寄蠅 (Zhang, 1998, 14(2):47)
寄 主：
分 佈：西藏。

Bellieria melanura (Meigen) 黑尾麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:229; He et al., 1991:63; Wu, 1988:574; Zhang et Zhao, 1992:1167)
Scarcophaga melanura Meigen, 1826:
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東、山西、河北、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、

黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、地中海地區、歐洲、小亞細亞、伊朗、克什米爾地區。

Bellieria pseudagnata Rohdendorf 擬黑麻蠅 (Zhang, 1980:143)

Bellieria pseudagnata Rohdendorf

寄 主：

分 佈：新疆。

Bellieriomima (s. str.) **yaanensis** Feng 雅安鉗麻蠅 (Feng, 1986:247)

Bellieriomima (s. str.) *yaanensis* Feng, 1986:247.

寄 主：

分 佈：四川。

Bengalia (Ochromyia) chekiangensis Fan 浙江孟蠅 (Fan, 1992:534)

Bengalia (*Ochromyia*) *chekiangensis* Fan, 1965:194.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：江西、浙江、安徽。

Bengalia (Ochromyia) escheri Bezzi 環斑孟蠅 (Fan, 1992:534)

Bengalia (*Ochromyia*) *escheri* Bezzi, 1913:76.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：臺灣、福建、海南、雲南、四川、浙江、安徽；印度。

Bengalia (Eubengalia) latro de Neij. 盜孟蠅 (Fan, 1992:532)

Bengalia (*Eubengalia*) *latro* de Neij., 1910:336.

=*Bengalia bezzii* Senior-White, 1923:306.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：臺灣、海南、四川、浙江；越南、菲律賓、寮國、新加坡、印度、斯里蘭卡、印尼、爪哇、日本。

Bengalia (Ochromyia) taiwanensis Fan 臺灣孟蠅 (Fan, 1992:534)

Bengalia (*Ochromyia*) *taiwanensis* Fan, 1965:194.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：臺灣(臺北)。

Bengalia (Anisomyia) torosa (Wiedemann) 側線孟蠅 (Fan, 1992:534)

Musca torosa Wiedemann, 1819:21.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：臺灣、雲南；日本、菲律賓、寮國、印度、斯里蘭卡、爪哇、澳洲。

Bengalia (Eubengalia) varicolor (Fabricius) 變色孟蠅 (Fan, 1992:532)

Musca varicolor Fabricius, 1805:296.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、雲南、浙江；菲律賓、印度南部、斯里蘭卡。

Bengalia (Eubengalia) emarginata Malloch 凹圓孟蠅 (Fan, 1992:532)

Bengalia (*Eubengalia*) *emarginata* Malloch, 1927:412.

捕 食：(成蟲)蟻(幼蟲)、白蟻。

分 佈：福建、海南、廣西；馬來西亞、新加坡。

Bercaea cruentata (Meiger) 紅尾糞麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:146)

Bercaea cruentata (Meiger, 1826:)

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、河南、山東、山西、河北、寧夏、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、印度、古北區亞洲部分、俄羅斯、伊朗、歐洲、北非、北美、夏威夷。

Bercaea haemorrhoidalis (Fallén) 紅尾糞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:230; He et al., 1988:22; Wu, 1988:574)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。

分 佈：雲南、西藏(米林、察隅、亞東、聶拉木；吉隆)、四川、青海、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯、印度、伊朗、古北區亞洲部分、歐洲、非洲、北美、夏威夷群島。

Blaesoxipha arenicola Rohdendorf 鐮葉折麻蠅 (Fan, 1992:630)

Blaesoxipha arenicola Rohdendorf, 1928:23.

=*Blaesoxipha fatciloba* Hsue, 1978:

寄 主：*Locusta migratoria migratoria* Linnaeus 亞洲飛蝗。

分 佈：遼寧；蒙古、蘇聯、南斯拉夫。

Blaesoxipha (s. str.) **benshiensis** Hsue 本溪折麻蠅 (ASZI, 1987,2:667; Hsue, 1978:187)

Blaesoxipha (s. str.) *benshiensis* Hsue, 1978:187.

寄 主：

分 佈：遼寧。

Blaesoxipha campestris (Robineau-Desvoidy) 線紋折麻蠅 (Chengg et Huang, 1995:535; Fan, 1992:631)

Listeria campestris Robineau-Desvoidy, 1863:600.

=*Musca lineata* Fallén, 1817: (*nec* Harris, 1776; Fabricius, 1781)

寄 主：幼蟲寄生蝗總科的成蟲：

Acrida oxycephala Pall. 荒地蚱蜢

Acrotylus insubricus Walker 蝗

Aiolopus thatassinus Fabricius 蝗

Aiolopus chinensis Kar. 蝗

Anacridium aegyptium Linnaeus 蝗

Bryodema tuberculatum Fabricius 痂蝗

Calliptamus italicus Linnaeus 意大利蝗

Calliptamus spretus 蝗

Celes variabilis Pall. 黑赤翅蝗

Chorthippus albomarginatus Deg. 白邊雛蝗
Chorthippus biguttulus meridionalis Mistsh. 異色雛蝗
Dericorys tibialis Pall. 藍翅瘤蝗
Dociostaurus brevicollis Sh. 狹條戟紋蝗
Euchorthippus pulvinatus F.-W. 草原異爪蝗
Gamposocleis schelkovnikovae Ad. 蝗
Gomphocerus sibiricus Linnaeus 西伯利亞蝗
Heteracris pterosticha F.-W. 蝗
Locusta migrotoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Melanotmethis fuscipennis Redt. 蝗
Melanoplus spp. 蝗
Mioscirtus wagneri Kitt. 小躍蝗
Notostaurus albicornis Ev. 小米紋蝗
Oedaleus decorus Germ. 黑條小車蝗
Oedipoda caerulescens Linnaeus 蝗
Oedipoda miniata miniata Pall. 紅斑翅蝗
Oedipoda miniata atripes B.-Bienko 小墊斑翅蝗
Oedipoda schochi Sauss. 蝗
Parapleurus alliacaceus Germ. 草綠蝗
Pyrgodera armata F.-W. 駝背蝗
Ramburiella turcomana F.-W. 土庫曼蝗
Schistocerca gregaria Forsk. 沙漠蝗
Schistocerca peregrina Burm. 蝗
Sphingonotus caerulans Linnaeus 蝗
Sphingonotus mecheriae Kr. 蝗
Stauroderus scalaris F.-W. 腫脈蝗
Metriptera affinis Fabricius 螽蟴
Barbitistes fischeri Yers. 螽蟴。

分 佈：浙江、江蘇、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；古北區、熱帶非洲區。

Blaesoxipha (s. str.) **changbaishanensis** Hsue 長白山折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:667; Hsue, 1978:189)

Blaesoxipha (s. str.) *changbaishanensis* Hsue, 1978:189.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林。

Blaesoxipha (Gesneriodes) cochlearis (Panddellé) 蝸折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:669; Fan, 1992:626; Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1573)

Sarcophaga cochlearis Panddellé, 1896:205.

=*Blaesoxipha sinica* Rohdendorf, 1928:

寄 主：*Bartitistes fischeri* 螽蟴科
Decticuss albifrons 螽蟴
Ephippiger ephippiger 螽蟴

Gampsocleis schelkovnikovae 螽蟴
Pholidoptera chabrieri 螽蟴
Platycheis denticulata 螽蟴
Tettigonnia viridissima 螽蟴
Eirenephilus longipennis (Shiraki) 長翅燕蝗
蟋蟀。
分 佈：甘肅、新疆、遼寧；朝鮮、蒙古、西伯利亞東部、歐洲中部及南部、阿及利亞。

Blaesoxipha (Servaisia) cothurnata Hsue 靴折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:670; Fan, 1992:627; Hsue, 1978:185)
Blaesoxipha (*Servaisia*) *cothurnata* Hsue, 1978:185.
寄 主：
分 佈：遼寧。

Blaesoxipha (Gesneriodes) dongfangis Hsue 東方折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:668; Fan, 1992:627; Hsue, 1978:186; Xue et al., 1996, 2:1574)
Blaesoxipha (*Gesneriodes*) *dongangis* Hsue, 1978:186.
寄 主：
分 佈：遼寧。

Blaesoxipha (s. str.) **falciloba** Hsue 鐮葉折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:670; Hsue, 1978:190; Xue et al., 1996, 2:1573)
Blaesoxipha (s. str.) *falciloba* Hsue, 1978:190.
寄 主：亞洲飛蝗成蟲體內。
分 佈：遼寧。

Blaesoxipha filipjevi Rohdendorf 菲利折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:666; Chao et Liang, 1984:173; Zhang, 1980: 143)
Blaesoxipha filipjevi Rohdendorf
寄 主：*Calliptamus abbreviatus* Ikonn. 短星翅蝗(北京)
Calliptamus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Locusta migratoria migratoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Gomphocerus sibricius (Linnaeus) 西伯利亞蝗
Schistocera gregaria Forsk. 蝗。
分 佈：北京、新疆、內蒙古；蘇聯、中亞、非洲、地中海東部沿岸、伊朗。

Blaesoxipha gladiatrix (Pandellé) 寬角折麻蠅 (Fan, 1992:628)
Sarcophaga gladiatrix Pandellé, 1896:205.
寄 主：幼蟲寄生于蝗科的若蟲及成蟲體內。已知寄主有：
Acrotylus insubricus Walker 圓頂蝗
Aeropedellus variegatus F.-W. 蛛蝗
Aukioys strepens Latr. 綠紋蝗
Calliptanmus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Chorthippas albomarginatus Deg. 白邊雛蝗
Chorthippas apricarius Linnaeus 雛蝗

Chorthippas brunucus Thunb. 蝗
Chorthippas kozhvnihvi Tarb. 蝗
Chorthippas mollis Ch. 蝗
Chorthippas parallelus Zett. 蝗
Chrotogonius taranicus Kur. 異膝蝗
Dociostaurus macroccanua Thnb. 戟紋蝗
Epacromius tergestinus Ch. 尖翅蝗
Euchorthippus pulvinatus F.-W. 優雛蝗
Locusta migratoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Myrmeleotettix maculatus Thnb. 班蟻蝗
Oedaleus decorus Germ. 小車蝗
Oedipoda coerulescens (Linnaeus) 絲角蝗
Oedipoda germanica Latr. 蝗
Oedipoda miniata Pall. 蝗
Omocestus heymonsi Ramme 牧草蝗
Omocestus viridulus (Linnaeus) 蝗
Pezotettix giornai Rossi 步蝗
Pyrgodera armata F.-W. 駝背蝗
Phrgomorpha conica Ol. 錐頭蝗
Ramburiella turcomana F.-W. 土庫曼蝗
Schistocerca gregaria Forsk. 沙漠蝗
Sphingonotus mecheriae Kr. 束頸蝗
Stauroderus scalaris F.-W. 腫脈蝗

分 佈：新疆、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲、阿富汗、伊朗、土耳其、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、埃及。

Blaesoxipha grylloctona Loew 長白山折麻蠅 (Fan, 1992:629)

Blaesoxipha grylloctona Loew, 1861:386.
=*Blaesoxipha changbaishanensis* Hsue, 1978:

寄 主：*Chorthippus biguttutus* (Linnaeus) 雛蝗
Chorthippus brunneus Thunb. 蝗
Chorthippus mollis Charp. 蝗
Chorthippus parallelus Zett. 蝗
Omocestus centralis Zett. 蝗。

分 佈：遼寧；日本、蒙古、蘇聯、歐洲(德國)。

Blaesoxipha kozlovi Rohdendorf 紅尾折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:668; Chao et Liang, 1984:173)

寄 主：蝗蟲。

分 佈：西藏、北京、內蒙古；蒙古、蘇聯(貝加爾)、東洋區、非洲。

Blaesoxipha (s. str.) **laotudingensis** Hsue 老禿頂折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:668; Fan, 1992:630; Hsue, 1978:187; Xue et al., 1996, 2:1574)

Blaesoxipha (s. str.) *laotudingensis* Hsue, 1978:187.
寄 主：
分 佈：遼寧。

Blaesoxipha lapidosa Pape 線紋折麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1573)
Blaesoxipha lapidosa Pape, 1994:37.
=*Musca lineata* Fallén 1817: (*nec* Harris, 1776; Fabriciuis, 1781)
=*Listeria campestris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Listeria agrestis* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：*Acrida oxycephala* Pall. 荒地蚱蜢
Acrotylus insubricus Walker 蝗
Aiolopus thalassinus Fabricius 蝗
Aiolopus chinensis Kar. 蝗
Anacridium aegyptium Linnaeus 蝗
Bryodema tuberculatum Fabricius 痂蝗
Calliptamus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Calliptamus spretus 蝗
Celes variobilis Pall. 黑赤翅蝗
Chorthippus albomaryinatus Deg. 白邊雛蝗
Chorthippus biguttulus meridionalis Mistsh 異色雛蝗
Dericorys tibialis Pall. 藍翅瘤蝗
Dociostaurus breevicollis Sh. 狹條戟紋蝗
Euchorthippus pulvinatus F.-W. 草原異爪蝗
Gampossocleis schelkovnikovae Ad. 蝗
Gomphocerus sibiricus Linnaeus 西北利亞蝗
Heleeracris plerosticha F.-W. 蝗
Locusta migrotoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Melanotmethis fuscipennis fuscipennis Redt. 蝗
Melanoplus spp. 蝗
Mioscirtus wagneri Kitt. 小躍蝗
Notostaurus albicornis Ev. 小米紋蝗
Oedaleus decorus Germ. 黑條小車蝗
Oedipoda caerulescens Linnaeus 蝗
Oedipoda miniata miniata Pall. 紅斑翅蝗
Oedipoda minata atripes B.-Bienko 小墊斑翅蝗
Oedipoda schochi Sauss. 蝗
Parapleurus alliacacerus Germ. 草綠蝗
Pyrgodera armata F.-W. 蝗
Romburiella turcomana F.-W. 土庫曼蝗
Schistocerea gregaria Forsk. 沙漠蝗
Schistocerea peregrina Burm. 蝗
Sphingonotus caerulans Linnaeus 蝗

Sphingonotus mecheriae Kr. 蝗
Stauroderus scalaris F.-W. 腫脈蝗
Metrioptera affinis Fieb. 螽蟴
Borbitistes fischeri Yers. 螽蟴
分 佈：江蘇、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(東北草原生境的優勢種)；古北區(瑞典)、蘇丹、索馬里。

Blaesoxipha laticornis (Meigen) 寬角折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:665; Xue et al., 1996, 2:1574; Zhang, 1980:143)

Sarcophaga laticornis Meigen, 1826:27.
=*Blaesoxipha grylloctoma* Loew, 1861:
=*Blaesoxipha changbaishanensis* Hsue, 1978:
=*Blaesoxipha takanoi* Rohdendorf et Verves, 1980:
=*Blaesoxipha scheenkoi* Artamanov, 1980:
寄 主：*Calliptamus italicus italicus* (Linnaeus) 意大利蝗
Chorthippus biguttulus (Linnaeus) 雛蝗
Chorthippus brunneeus Thunb. 蝗
Chorthippus mollis Charp 蝗
Chorthippus parallelus Zetterstedt 蝗
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus) 西伯利亞蝗
Locusta migratoria migratoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Oedipoda miniata (Pall.) 紅斑翅蝗
Omocestus centralis Zetterstedt 牧草蝗
Polisma pedestria Linnaeus 蝗
Pyrgodere armata F.-W. 駝背蝗
Ramburiella iurcomana (F.-W.) 土庫曼蝗
Schistocera gregaria Forsk. 蝗。
分 佈：新疆、遼寧、吉林；日本、蒙古、蘇聯、歐洲(西部)。

Blaesoxipha lautaretensis Villeneuve 本溪折麻蠅 (Fan, 1992:627; Xue et al., 1996, 2:1577)

Blaesoxipha lautaretensis Villeneuve, 1928:47.
=*Blaesoxipha benshiensis* Hsue, 1978:
=*Blaesoxipha hcaspica* Rohdendorf et Verves, 1979:
=*Blaexocipha laticerca* Rohdendorf et Verves, 1979:
寄 主：*Dociostaurus kraussi* (Ingen.) 紅脛戟紋蝗。
分 佈：遼寧；蒙古、蘇聯、捷克、斯洛伐克、法國。

Blaesoxipha lineata Fall. 線紋折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:667; Quo, 1954:277-286)

別 名：*擬麻蠅*。
寄 主：*Locusta migratoria migratoria* Linnaeus 亞洲飛蝗
Calliptamus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Gomphocerus sibiricus sibiricus (Linnaeus) 西伯利亞蝗
Dociostaurus maroccanus Thumb. 小眼戟紋蝗
Oedaleus decorus Germ. 黑條小車蝗

Celes variabilis Pall. 黑赤翅蝗
Dociostaurus turcomana Ev. 狹條戟紋蝗
Notostaurus albicornis Ev. 小米紋蝗
Ramburiella turcomana F. W. 土庫曼蝗
Aiolopus thalassinus Fabricius 綠紋蝗
Epacromius coerulipes (Ivan) 大墊尖翅蝗
Oedipoda schochi Sauss. 寬股斑翅蝗
Oedipoda coerulescens Linnaeus 藍斑翅蝗
Acrotylus insubricus Scop. 小墊長距蝗
Mioscirtus wagneri Ev. 小躍蝗
Acrida oxycephala (Pall.) 荒地蚱蜢
Parapleurus alliaceus Germ. 草綠蝗
Metrioptera affnis Fieb. 蟈蟈
Gampsocleis schelkovnikovae Ad. 蟈蟈

分 佈：河南、山東、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、蘇丹、地中海地區。

Blaesoxipha (Gesneriodes) litoralis (Villeneuve) 階突折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:666; Fan, 1992:627; Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1577)

Gesneriodes litoralis Villeneuve, 1911:129.
=*Blaesoxipha acuminata* Villeneuve, 1912:

寄 生：*Callipiamus italicus* (Linnaeus) 意大利蝗
Locusta migritoria Linnaeus 亞洲飛蝗。

分 佈：山西、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、蒙古、蘇聯、伊朗、歐洲(南部)、法國、阿爾及利亞。

Blaesoxipha (s. str.) **macula** Hsue 斑折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:670; Hsue, 1978:189; Xue et al., 1996, 2:1577)

Blaesoxipha (s. str.) *macula* Hsue, 1978:189.

寄 主：

分 佈：遼寧。

Blaesoxipha magniforcipis Chao et Zhang 巨尾折麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1577)

Blaesoxipha magniforcipis Chao et Zhang, 1988:75.

寄 主：

分 佈：新疆。

Blaesoxipha plumicornis (Zetterstedt) 寬角折麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1574)

Miltogramma plumicornis Zetterstedt, 1859:6153.
=*Blaexoxipha laticornis* authers. (*nec* Meigen, 1826).
=*Sarcophage gladiatrix* Pandellé, 1896:

寄 主：幼蟲寄生蝗科的若蟲及成蟲內。已知：
Acrotylus insubricus Walker 圓頂蝗
Aeropedellus variegatus F.-W. 蛛蝗

Ailopus strepens Latr. 綠紋蝗
Calliptanmus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Chrothippa albomarginatus Deg. 白邊雛蝗
Chrothippa apricarius Linnaeus 蝗
Chrothippa brunneus Thunberg 蝗
Chrothippa kozhevnikvi Tarb. 蝗
Chrothippa mollis Ch. 蝗
Chrothippa parallelus Zetterstedt 蝗
Chrotogonius taranicus Kur. 異膝蝗
Dociostaurus maroccanua Thnb. 戟紋蝗
Epacromius tergestinus Ch. 尖翅蝗
Euchorthippus pulvinatus F.-W. 優雛蝗
Locusta migrotoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Mymeleotettix maculatus Thnb. 斑蟻蝗
Oedaleus decorus Germ. 小車輪蝗
Oedipoda coerulescens (Linnaeus) 蝗
Oedipoda germanica Latr. 蝗
Oedipoda miniata Pall. 蝗
Omocestus heymonsi Ramme 牧草蝗
Omocestus viridulus (Linnaeus) 蝗
Pezotettix giornai Rossi 步蝗
Pyrgodera armata F.-W. 駝背蝗
Pyrgomorpha conica Ol. 錐頭蝗
Ramburiella turcomana F.-W. 土庫曼蝗
Schistocerca gregaria Forsk. 沙漠蝗
Sphingonotus mecheriae Kr. 束頸蝗
Stauroderus scalaris F.-W. 腫脈蝗
雌蠅產幼蟲于蝗蟲的生殖孔內。

分 佈：新疆、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、阿富汗、伊朗、土耳其、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、埃及、歐洲(瑞典)。

Blaesoxipha (s. str.) **popovi** Rohdendirf 叉突折麻蠅 (Mou, 1980:391)

Blaesoxipha (s. str.) *popovi* Rohdendirf, 1937:

寄 主：

分 佈：遼寧。

Blaesoxipha potanini Rohdendorf 坡坦折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:665; Zhang, 1980:143)

寄 主：*Gomphocerus sibiricus* (Linnaeus) 西伯利亞蝗。

分 佈：新疆；蒙古、蘇聯。

Blaesoxipha (Servaisia) rossica Vill. 毛股折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:666; Hsue, 1980:191)

寄 主：*Gomphocerus sibiricus* (Linnaeus) 西伯利亞蝗。
分 佈：遼寧、吉林；亞洲(北部)、蘇聯、東歐。

Blaesoxipha rufipes (Macquart) 亞非折麻蠅 (Fan, 1992:633; Xue et al., 1996, 2:1577; Zhng, 1997:1519)
Agria rufipes Macquart, *in* Webb et Berthelot, 1838:113.
=*Gesneriella rubripes* Villeneuve, 1912:
=*Blaesoxipha filipjevi* Rohdendorf, 1928:
=*Blaesoxipha povolnyi* Rohdendorf, 1975:
寄 主：幼蟲寄生于蝗科的成蟲，已知有：
Acanthacrus ruficornis lineata Stoll. 蝗
Acrida oxycephala Pall. 荒地蚱蜢
Aiolopus thalassinus Fabricius 綠紋蝗
Anacridum aegyptilum 蝗
Anacridum moestum Serv. 蝗
Calliptamus coelesyriens 蝗
Calliptamus italicus Linnaeus 意大利蝗
Dociostaurus kraussi Ingen. 紅脛戟紋蝗
Dociostaurus maroceanus Thnb. 戟紋蝗
Dociostaurus nigrogeniculatus Tarb. 蝗
Epacroomius coerulipes Joh. 大墊尖翅蝗
Locusta migratoria Linnaeus 亞洲飛蝗
Mesosippus kozhevnikovi Tarb. 蝗
Oedaleua sp. 小車蝗
Oedipoda miniata Pall. 絲角蝗
Phymateus morbillosus Linnaeus 蝗
Poecilocerus pictus Fabricius 蝗
Schistocerea gregaria Forsk. 沙漠蝗
Sphingoderus carinatus Sauss. 側角瓜蝗
Stauronotus sp. 蝗
Zonocerus variegatus Linnaeus 蝗·
Zonocerus sp. 蝗。
分 佈：廣東、雲南、四川、湖北、北京、新疆、內蒙古、遼寧；蘇聯、朝鮮、蒙古、阿富汗、伊朗、沙特阿拉伯、葉門、約旦、敘利亞、黎巴嫩、以色列、歐洲南部、西班牙(加那利群島)、埃及、熱帶非洲。

Blaesoxipha (Servaisia) silantjevi Bohddendorf 寬陽折麻蠅 (ASZI, 2:666; Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：北京、遼寧、內蒙古；蘇聯。

Blaesoxipha (s. str.) **sublaticornis** Hsue 擬寬角折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:669; Fan, 1992:630; Hsue, 1978:189; Xue et al., 1996, 2:1578)
Blaesoxipha (s. str.) *sublaticornis* Hsue, 1978:189.
=*Blaesoxipha laticornis,* Kano et al., 1967: (nec Meigen, 1826)

=*Blaesoxipha juryi* Verves, 1980:
寄 主：
分 佈：遼寧；日本、蘇聯。

Blaesoxipha (s. str.) **subunicolor** Ma 肖單色折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:669; Fan, 1992:630; Ma, 1981:186; Xue et al., 1996, 2:1578)
Blaesoxipha (s. str.) *subunicolor* Ma, 1981:186.
寄 主：
分 佈：遼寧(建昌)。

Blaesoxipha (s. str.) **unicolor** (Villeneuve) 單色折麻蠅 (ASZI, 1987, 2:669; Fan, 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1578)
Gesneriella unicolor Villeneuve, 1912:615.
寄 主：*Aeropedellus variegatus* F.-W. 蛛蝗
Calliptamus italicus (Linnaeus) 意大利蝗
Chorthippus albomarginatus (De Geer) 白邊雛蝗
Chorthippus apricarius (Linnaeus) 中寬雛蝗
Chorthippus biguttulus (Linnaeus) 蝗
Docistaurus genei Osk. 戟紋蝗
Docistaurus maroccanus Thnt. 蝗
Euchorthippus pulvinatus F.-W. 優雛蝗
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus) 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus Germ. 黑條小車蝗
Ramburiella hispanica (Ramb.) 西班牙蝗
Sphingonotus caerulans (Linnaeus) 束頸蝗
Stauroderus sealaris (F.-W.) 腫脈蝗
Stenobothrus nigrimaculatus H.-Sch. 直溝蝗
Stenobothrus eurasius Zub. 蝗。
分 佈：內蒙古、遼寧；蒙古、蘇聯、歐洲南部和東部。

Boettcherisca peregrina (Robineau-Desvoldy.) 棕尾別麻蠅 (ASZI, 1987, 2:671; He et al., 1988:22; Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992:1169)
Boettcherisca peregrina (Robineau-Desvoldy, 1830:)
寄 主：*Dendrolimus tatulaefromis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲、蛹)
狗糞。
分 佈：湖南、貴州、四川、湖北、全國各地、北京；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印度、印尼、澳洲、薩摩亞島、菲吉群島。

Boettcherisca peregrina (Robineau-Desvoldy) 棕尾別麻蠅 (Chen et Luo, 1990:81; He et al., 1991:63; Zhang, 1997:1524)
Boettcherisca peregrina (Robineau-Desvoldy, 1839:)
寄 主：*Mythimna separata* Walker 粘蟲
Dasychira horsfieldi 黑頸茸毒蛾

松毛蟲(幼蟲)
動物糞便。
分 佈：福建、廣西、全國各地；蒙古、俄羅斯、朝鮮、日本、西南亞、北非、熱帶非洲、北美洲、南美洲、夏威夷。

Boettcherisca septentrionalis Rohdendorf 北方別麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：遼寧。

Bororhinia bivittata (Walker) 雙條污彩蠅 (Fan, 1992:562)
Idia bivittata Walker, 1857:128.
寄 主：白蟻巢。
分 佈：臺灣、雲南；菲律賓、寮國、馬來西亞(沙撈越)、印度、斯里蘭卡、印尼、爪哇。

Brachycoma devia (Fallén) 寂短野麻蠅 (Fan, 1992:616; Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1563; Zhang et Zhao, 1992:1173; 1996:247)
Tachina devia Fallén, 1820:6.
=*Tachina vilis* Zetterstedt, 1844:
=*Tachina separata* Walker, 1853:
=*Tachina senta* Walker, 1853:
=*Tachina nitidula* Rondani, 1856:
=*Brachicoma adolescens* Rondani, 1859:
=*Oppia ciligera* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Meigenia bombivora* Van der Wulp, 1869:
別 名：*戴維短野麻蠅，寂短麻蠅*。
寄 主：熊蜂巢內 *Bombus* 和胡蜂巢內。
分 佈：雲南、西藏、四川、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、俄羅斯(遠東地區、西伯利亞、外高加索、歐洲部分)、吉爾吉斯斯坦、英國、法國、丹麥、瑞典、北美。

Brachycoma nigra Chao et Zhang 黑短野蠅 (Fan, 1992:615; Xue et al., 1996, 2:1563; Zhang et Zhao, 1992:1174)
Brachycoma nigra Chao et Zhang, 1988:275.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Burmanomyia beosoni (Senior-White) 松毛蟲緬麻蠅 (ASZI, 1987, 2:673; Chao et Liang, 1984:179; Fan, 1992:663; Hun., 1992:1160; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Wang et Zhou, 1995, 17(4):147-152; Zhang, 1987[ed.] 2:69; Zhang et Fan, 1992:611)
Sarcophaga beesoni Senior-White, 1824:243.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、黑龍江；日本、泰國、緬甸。

Burmanomyia (Coonooria) pattoni (Senior-White) 盤突緬麻蠅 (Fan, 1992:663)

Sarcophaga pattoni Senior-White, 1924:242.
=*Sarcophaga pilipleuris* Salem, 1945:
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、四川、湖北、河南；越南、印度、尼泊爾、爪哇。

Caiusa testacea Seniior-White 黃褐絳蠅 (Fan, 1992:531)
Caiusa testacea Seniior-White, 1923:310.
=*Caiusa dubiosa* Villeneuve, 1927:
寄 主：在印度從蛙卵中育出。
分 佈：臺灣；馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡。

Cephinopode sp. 痲蠅 (Liu et al., 1999, 21(3):99)
寄 主：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木痲黃)。
分 佈：廣東。

Cylindrothecum takanoi (Kurahashi) 棘葉長鞘蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林。

Dinemomyia nigribasicosta Chen 黑鱗鬚痲蠅 (Xue et al., 1996, 2:1587)
Dinemomyia nigribasicosta Chen, 1975:114-115.
=*Pierretia melania* Shinonaga et Tumrasvin, 1970:
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、浙江；泰國。

Eumetopiella (Asiarata) jacobsoni Rohdendorf 雅氏楔蜂痲蠅 (Xue et al., 1996, 2:1534)
Sphenometopa jacobsoni Rohdendorf, 1967:457.
寄 主：
分 佈：新疆；塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Eumetopiella (Asiarata) koulingiana (Séguy) 牯嶺楔蜂痲蠅 (Xue et al., 1996, 2:1534)
Araba koulingiana Séguy, 1941:318.
寄 主：
分 佈：江西、雲南、西藏、四川、河南、山東、北京、遼寧、黑龍江。

Eumetopiella (Asiarata) kozlovi (Rohdendorf) 柯氏楔蜂痲蠅 (Xue et al., 1996, 2:1534)
Spphenometopa kozlovi Rohdendorf, 1967:458.
寄 主：
分 佈：北京、新疆、內蒙古；蒙古。

Eumetopiella (s. str.) licenti (Séguy) 利氏楔蜂痲蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)
Araba licenti Séguy, 1962:455.
寄 主：
分 佈：山西。

Eumetopiella (Intermedia) luridimacula Chao et Zhang 淡斑楔蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)

Eumetopilla (*Intermedia*) *luridimacula* Chao et Zhang, 1988:281.

寄 主：

分 佈：新疆。

Eumetopiella matsumurai Rohdendorf 松村楔蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)

Eumetopiella matsumurai Rohdendorf, 1867:457.

寄 主：

分 佈：中國；日本(北海道)。

Eumetopiella (Euaraba) mongolia (Fan) 蒙古楔蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)

Araba mongolia Fan, 1965:297-298.

寄 主：

分 佈：北京、內蒙古。

Eumetopiella (Arabiopsis) mesomelaenae Chao et Zhang 黑條楔蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)

Eumetopiella (*Arabiopsis*) *mesomelaenae* Chao et Zhang, 1988:281.

寄 主：

分 佈：四川。

Eumetopiella (s. str.) **semenovi** (Rohdendorf) 塞氏楔蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1536)

Sphenometopa (*Euaraba*) *semenovi* Rohdendorf, 1967:466.

寄 主：

分 佈：內蒙古；蒙古。

Fengia ostinddicae (Senior-White) 印東馮麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1589)

Sarcophaga ostinddicae Senior-White, 1924:233.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；印度東部。

Goniphyto formosensis Townsend 臺灣沼野蠅 (Xue et al., 1996, 2:1569)

Goniphyto formosensis Townsend, 1927:281.

寄 主：

分 佈：臺灣(安平)。

Goniphyto honshuensis Rohdendorf 本州沼野蠅 (Xue et al., 1996, 2:1569)

Goniphyto honshuensis Rohdendorf, 1962:936.

寄 主：魚、蛙、蟹、鳥。

分 佈：臺灣、上海；日本(本州)、蘇聯。

Harpagophalla kempi (Senior-White) 曲突鈎麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1589)

Sarcophaga kempi Senior-White, 1924:247.

=*Sarcophaga* (*Harpagophalla*) *sera* Rohdendorf, 1930:

=*Sarcophaga* (*Thyrsocnema*) *kemppioides* Baranov, 1931:
寄 主：天蛾幼蟲及軟體動物(*Achatina fulic*)。
分 佈：福建、江西、海南、雲南；寮國、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、爪哇、新幾內亞島。

Harpagophalla sera (Rhodendorf) 曲突鈎麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1168)
Harpagophalla sera (Rhodendorf, 1930:)
寄 主：
分 佈：福建、海南、雲南、四川。

Helicophagella melanura (Meigen) 黑尾黑麻蠅 (Zhang, 1997:1520; Zhang et Fan, 1992:610; Zhang et Zhao, 1996:245)
Helicophagella melanura (Meigen, 1826:)
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江，全國；蒙古、朝鮮、日本、馬來西亞、克什米爾、中亞、西亞、伊朗、地中海、北非、歐洲、北美。

Helicophagella rohdendorfi (Grunin) 瘦葉黑麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:246)
Helicophagella rohdendorfi (Grunin, 1964:)
寄 主：
分 佈：西藏、青海、新疆；吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦。

Heteronychia (s. str.) **abramovi** (Rohdendorf) 海北歐麻蠅 (Fan, 1992:652; Xue et al., 1996, 2:1593)
Pierretia abramovi Rohdendorf, 1938:108.
寄 主：本屬部分幼蟲寄生于蝸牛和蝗蟲成蟲體內。
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯。

Heteronychia (s. str.) **bajkalensis** (Rohdendorf) 貝加爾歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Xue et al., 1996, 2:1596)
Sarcophaga bajkalensis Rohdendorf, 1925:56.
寄 主：
分 佈：吉林、黑龍江；俄羅斯(西伯利亞貝加爾湖畔)。

Heteronychia (Eupierretia) brachystylata Chao et Zhang 短插歐麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1596; Zhang et Zhao, 1996:246)
Heteronychia (*Eupierretia*) *brachystylata* Chao et Zhang, 1988:
寄 主：
分 佈：新疆。

Heteronychia curvifemoralis Li 曲股歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Wei et al., 1988:311; Xue et al., 1996, 2:1596)
Heteronychia curvifemoralis Li, 1980:276, 277.
寄 主：
分 佈：廣西、貴州、四川。

Heteronychia guoi Fan 郭氏歐麻蠅 (Zhang, 1997:1521; Zhang et Fan, 1992:611)

Heteronychia guoi Fan, 1964:

寄 主：葡萄十星葉甲(幼蟲)。

分 佈：廣西、貴州、上海、湖北、河北、北京、遼寧。

Heteronychia (Eupierretia) helanshanensis Han, Zhao et Ye 賀蘭山歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Han et al., 1985:76; Xue et al., 1996, 2:1596)

Heteronychia (*Eupierretia*) *helanshanensis* Han, Zhao et Ye, 1985:76-77.

寄 主：

分 佈：寧夏(賀蘭山小口子)。

Heteronychia (s. str.) **heptapotamica** (Rohdendorf) 狹額歐麻蠅 (Fan, 1992:652; Xue et al., 1996, 2:1596)

Pierretia heptapotamica Rohdendorf, 1937:357.

=*Heteronychia kazachstanica* Verves, 1975:

=*Heteronychia pogrebennyki* Verves, 1977:

寄 主：

分 佈：新疆；哈薩克斯坦(阿拉木圖)、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲克斯坦。

Heteronychia (s. strl) **kozlovi** (Rohdendorf) 開枝歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Xue et al., 1996, 2:1596)

Pierretia kozlovi Rohdendorf, 1937:382.

寄 主：

分 佈：內蒙古(賀蘭山)。

Heteronychia (s. str.) **macromembrana** Ye 巨膜歐麻蠅 (Fan, 1992:654; Xue et al., 1996, 2:1596)

Heteronychia (s. str.) *macromembrana* Ye, 1980:286-287.

寄 主：

分 佈：四川(南坪)。

Heteronychia (s. str.) **plotnikovi** (Rohdendorf) 長端歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Xue et al., 1996, 2:1596)

Sarcophaga plotnikovi Rohdendorf, 1925:53.

寄 主：

分 佈：新疆；塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦(塔什干)。

Heteronychia (Eupierretia) proxima (Rohdendorf) 長插歐麻蠅 (Zhang, 1980:143)

寄 主：

分 佈：新疆。

Heteronychia (s. str.) **quoi** Fan 郭氏歐麻蠅 (ASZI, 1987, 2:672; Fan, 1992:652; Chao et Liang, 1984:177; Xue et al., 1996, 2:1597)

Heteronychia (s. str.) *quoi* Fan, 1964:313-314. (new name for *Sarcophaga parva* Quo, 1952)

Sarcophaga parva Quo, 1952: (*nec* Walker, 1852; Robineau-Desvoidy, 1863)

寄 主：*Oides decipunctata* 葡萄十星葉甲(幼蟲)。

分 佈：廣東、廣西、貴州、江蘇、上海、河北、北京、黑龍江。

Heteronychia shnitnikovi (Rohdendorf) 細紐歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Xue et al., 1996, 2:1597; Ye, 1980:435)

Pierretia shnitinikovi Rohdendorf, 1937:365.

寄 主：

分 佈：新疆；烏茲別克斯炟、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦(阿拉木圖)。

Heteronychia (s. str.) **spatulifera** Chen et Lu 匙突歐麻蠅 (Fan, 1992:655; Xue et al., 1996, 2:1597)

Heteronychia (s. str.) *spatulifera* Chen et Lu, 1982:256-257.

寄 主：

分 佈：山西、青海(玉樹)。

Heteronychia (Eupierretia) tenupenialia Chao et Zhang 細莖歐麻蠅 (Zue et al., 1996, 2:1597)

Heteronychia (*Eupierretia*) *tenupenialia* Chao et Zhang, 1988:77.

寄 主：

分 佈：新疆(昭蘇阿臘散)。

Heteronychia (s. str.) **tsinanensis** Fan 濟南歐麻蠅 (Fan, 1992:654: Xue et al., 1996, 2:1597)

Heteronychia (s. str.) *tsinanensis* Fan, 1964:314-315.

寄 主：

分 佈：山東(濟南)。

Hilarella siphonina Zell. 淡黃喜麻蠅 (Zhang, 1980:143)

寄 主：

分 佈：內蒙古。

Hilarella stictica (Meigen) 點斑喜蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1537)

Hilarella stictica Meigen, 1830:367.

=*Megaera dira* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Miltogramma pusilla* Zetterstedt, 1859；

=*Hilarella italica* Rondani, 1859:

寄 主：

分 佈：河北、內蒙古；西伯利亞、東哈薩斯坦、外高加索、歐洲部分、瑞典、北非

Hoa flexuosa (Ho) 捲陽何麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1599)

Saarcophaga flexuosa Ho, 1934:25.

寄 主：

分 佈：江蘇、上海、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧。

Horia oitana (Hori) 大分鶴麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1599)

Sarcophaga oitana Hori, 1955:247.

寄 主：

分 佈：四川；日本(九州大分)。

Horiisca hozawai (Hori) 鹿角堀麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1:1600)

Sarcophaga hozawai Hori, 1954:46.
寄 主：
分 佈：雲南、浙江；朝鮮、日本(本州石川)。

Hosrcophaga serrata (Ho) 鋸緣琦麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1:1600)
Sarcophaga serrata Ho, 1938:120.
寄 主：
分 佈：臺灣；泰國、印尼(爪哇)。

Iranihindia spinosa Li, Ye et Liu 密刺伊麻蠅 (Li et al., 1985:294; Xue et al., 1996, 2:1600)
Iranihindia spinosa Li, Yu et Liu, 1985:294-295.
寄 主：
分 佈：雲南(盈江)。

Johnstonimyia taiwanensis (Kano et Lopes) 臺灣姜麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1:1601)
Burmanomyia taiwanensis Kano et Lopes, 1969:5-9.
寄 主：
分 佈：臺灣(嘉義)。

Kanomyia bangkokensis Shinonaga et Tumrasvin 曼谷加麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1:1601)
Kanomyia bangkokensis Shinonaga et Tumrasvin, 1979:136-138.
寄 主：
分 佈：雲南；泰國(曼谷)。

Kozlovea cetu Chao et Zhang 側突庫麻蠅 (Chao et Zhang, 1978:445; 1982:228; Xue et al., 1996, 2:1602; Zhang et Zhao, 1992:1166)
Kozlovea cetu Chao et Chang, 1978:445.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(察隅)、四川、河北、北京(百花山)。

Kozlovea lopesi Nandi 陋庫麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:228; Xue et al., 1996, 2:1602; Zhang, 1980:214)
Kozlovea lopesi Nandi, 1976:369.
寄 主：
分 佈：西藏(吉隆)；印度、尼泊爾。

Kozlovea tshernovi Rohdendorf 復斗庫麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1602)
Kozlovea tshernovi Rohdendorf, 1937:300.
寄 主：
分 佈：中國。

Kramerea schuetzei (Kramer) 舞毒蛾克麻蠅 (ASZI, 1987, 2:672; Chao et Liang, 1984:178; Fan, 1992:666; Hun., 1992:1159; Xue et al., 1996, 2:1603; Yan et al., 1993, 9(2):50; Zhang et Fan, 1992:611)
Sarcophaga schuetzei Kramer, 1909:14.
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)

Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 模舞毒蛾(僧尼舞毒蛾)
分 佈：湖南、貴州、四川、河南、陝西、山西、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、俄羅斯遠東、阿塞拜疆、北亞、歐洲、波蘭、德國東部、捷克、匈牙利、保加利亞、南斯拉夫。

Leucomyia cinerea (Fabricius) 灰斑白麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1603)
Musca cinerea Fabricius, 1794:331.
寄 主：
分 佈：河北(秦皇島)、遼寧；日本、泰國、印度(東部)、斯里蘭卡。

Leucomyia cinerea dukoicus Zhang et Chao 渡口白麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1606; Zhang et Zhao, 1992:1173)
Leucomyia dukoicus Zhang et Chao, 1988:289-290.
寄 主：
分 佈：四川(渡口)。

Lioproctia beesoni (Senior-White) 松毛蟲緬麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1587)
Sarcophaga beesoni Senior-White, 1924:243.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南；日本、泰國、緬甸。

Lioproctia pattoni (Senior-White) 盤突緬麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1587)
Sarcophaga pattoni Senior-White, 1924:242.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、四川、湖北、河南；越南、印度、爪哇。

Macronychia (Moschusa) dumosa (Pandellé) 棘叢巨爪麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1529)
Miltogramma dumosa Pandellé, 1895:301.
=*Tachina agrestis* Meigen, 1824:
寄 主：
分 佈：中國；蒙古、蘇聯、歐洲(法國)。

Macronychia (Maschusa) griseola (Fallén) 灰巨爪麻蠅 (Fan, 1992:584; Xue et al., 1996, 2:1529)
Musca griseola Fallén, 1820:10.
=*Tachina viatica* Meigen, 1824:
寄 主：
分 佈：臺灣、內蒙古；蒙古、蘇聯、歐洲(瑞典)。

Macronychia (Moschusa) polyodon (Meigen) 坡巨爪麻蠅 (Fan, 1992:584)
Tachina polyodon Meigen, 1824:302.
=*Theone villana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Macronichia silvestrs* Rondani, 1865

寄 主：幼蟲曾從膜翅目昆蟲如 *Bombus, Cemonus, Clytochrysus, Solenius* 等巢中培育出(歐洲)。
分 佈：北京、內蒙古；日本、蘇聯(南半部)、以色列、法國、英國。

Macronychia (s. str.) **striginervis** (Zetterstedt) 蕥巨爪痳蠅 (Fan, 1992:583; Xue et al., 1996, 2:1530; Zhang, 1988:166)
Xysta striginervis Zetterstedt, 1844:1260.
=*Miltogramma ungulans* Pandelle, 1895:
=*Macronychia agrestis* Rondani, 1859: (nec Fallén, 1810)
寄 主：幼蟲曾發現于 *Clytochrysus cavifrons* Thoms. 的巢中(歐洲)。
分 佈：西藏、內蒙古；日本、蘇聯、英國、德國、法國、意大利、瑞典。

Macronychia ungulans (Pandelle) 雍巨爪痳蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1181)
Macronychia ungulans (Pandelle, 1895:)
寄 主：
分 佈：西藏、內蒙古；日本、蘇聯、英國、德國、法國、意大利。

Melinda cognata (Meigen) 寬葉蝸蠅 (Fan, 1992:520)
Musca cognata Meigen, 1839:374.
寄 主：陸生蝸牛。
分 佈：新疆；蘇聯(中亞、歐洲部分)、摩洛哥。

Melinda gentilis Robineau-Desvoidy 錐葉蝸蠅 (Fan, 1992:523)
Melinda gentilis Robineau-Desvoidy, 1830:441.
寄 主：陸生蝸牛。
分 佈：日本、蘇聯、歐洲、新北區。

Mesomelaena messomelaena (Löw) 黑條蠅 (Xue et al., 1996, 2:1537)
Metopia mesomelaena Löw, 1848:377.
=*Mesomelaena loewi* Rondani, 1859:
=*Sarcopila megacephala* Portshinsky, 1881:
寄 主：
分 佈：內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯、歐洲(匈牙利)。

Metopia argentata Macquart 雙纓突額蜂痳蠅 (Fan, 1992:607)
Metopia argentata Macquart, 1850:442.
=*Metopia staegeri* Rondani, 1859:
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：雲南、西藏、四川；法國。

Metopia argyrocephala (Meigen) 白頭突額蜂痳蠅 (Fan, 1992:608; Xue et al., 1996, 2:1540; Zhang et Fan, 1992:613; Zhang et Zhao, 1992:1181)
=*Musca leucocephala* Rossi, 1790:
Tachina argyrocephala Meigen, 1824:372, 230.
=*Araba philanthi* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Araba minuta* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Araba assimilis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Araba obscura* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Araba squamipallens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Metopia roserii* Rondani, 1859:
=*Argyria hilaris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Argyria humilis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Argyria dissimilis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Argyria festinans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Argyria cinerella* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Arabella jocose* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Arabella vigilans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Arabella ruralis* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、河南、河北、北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞東部、中亞細亞、歐洲部分)、阿富汗、伊朗、伊拉克、歐洲、北美。

Metopia auripulvera Chao et Zhang 金粉突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:607; Xue et al., 1996, 2:1540; Zhang et Zhao, 1992:1178)
Metopia auripulvera Chao et Zhang, 1988:284.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：雲南、四川。

Metopia campestris (Fallén) 纓跗突額麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1540; Zhang, 1980:143; Zhang et Zhao, 1992:1180; 1996:250)
Tachina campestris Fallén, 1820: 8.
=*Tachina amabilis* Meigen, 1824:
=*Ophelia gracilis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Ophelia cinerea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Ophelia lutescens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Metopia flavescens* Macquart, 1834:
=*Metopia crassicornis* Perris, 1852:
=*Ophelia caesia* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Ophelia demissa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Anicia sabulosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Anicia insidiosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Anicia demissa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Anicia muricola* Robineau-Desvoidy, 1863:
別 名：*平原突額蜂麻蠅*。
寄 主：
分 佈：雲南、河北、北京、新疆、內蒙古、黑龍江；日本、蒙古、西伯利亞、歐洲(瑞典)、北美洲，全北區。

Metopia instruens Walker 印尼突額蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1543)
Metopia instruens Walker, 1860:129.
寄 主：
分 佈：臺灣；印尼。

Metopia pollenia Chao et Zhang 粉突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:607; Xue et al., 1996, 2:1540; Zhang et Zhao, 1992:1178)
Metopia pollenia Chao et Zhang, 1988:284.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：四川。

Metopia nudibasis (Malloch) 裸基突額蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1540)
Opsidiopsis nudibasis Malloch, 1930:439.
寄 主：
分 佈：中國；日本、澳洲。

Metopia sauteri (Townsend) 臺灣突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:605; Xue et al., 1996, 2:1543; Zhang et Fan, 1992:613; Zhang et Zhao, 1992:1180)
Chaetanicia sauteri Townsend, 1932:445.
=*Metopia amaniensis* Fan, 1965:301-302.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、江蘇、上海；日本，全北區。

Metopia stackelbergi Rohdendorf 斯突額蜂麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:233; Fan, 1992:608; Xue et al., 1996, 2:1543; Zhang et Zhao, 1992:1181)
Metopia stackelbergi Rohdendorf, 1955:369.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：西藏(芒康)、四川、河北；蒙古、烏克蘭、匈牙利、南斯拉夫、意大利、奧地利、捷克，古北區。

Metopia staegeri Rondani 雙纓突額蜂蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1180)
Metopia staegeri Rondani, 1859:
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川；歐洲。

Metopia suifenhoensis Fan 綏芬河突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:605; Xue et al., 1996, 2:1543; Zhang et Zhao, 1992:1180)
Metopia suifenhoensis Fan, 1965:300.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：雲南、四川、內蒙古、黑龍江；朝鮮。

Metopia tshernovae Rohdendorf 柴突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:605; Xue et al., 1996, 2:1543; Zhang, 1980:143)
Metopia tshernovae Rohdendorf, 1955:368.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。
分 佈：內蒙古；蒙古、亞洲西部、歐洲北部。。

Metopia yunnanica Chao et Zhang 雲南突額蜂麻蠅 (Fan, 1992:605; Xue et al., 1996, 2:1543; Zhang et Zhao, 1992:1178)
Metopia yunnanica Chao et Zhang, 1988:283.
寄 主：幼蟲多滋生蜂類巢內。

分 佈：雲南。

Metopia zenigoi Kurahashi 寬陽突額蠅 (Hsue, 1980:191)

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林。

Metopia zosea Séguy 江蘇突額蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1543)

Metopia zosea Séguy, :182.

寄 主：

分 佈：江蘇。

Metopodia grisea Brauer et Bergenstamm 灰麥蜂麻蠅 (Xue et al., 1966, 2:1543; Zhang, 1980:143)

Metopodia grisea Brauer et Bergenstamm, 1889:359.

=*Metopia pilicornis* Pandellé, 1895:

寄 主：

分 佈：河北、北京；蒙古、蘇聯、伊朗、土耳其、歐洲南部和中部。

Miltogramma (Cylindrothecum) angustifrons (Townsend) 狹額長鞘蜂麻蠅 (Fan, 1992:593; Xue et al 1996, 2:1552)

Eumiltogramma angustifrons Townsend, 1932:443.

=*Eumiltogramma* (*Cylindrothecum*) *takanoi* Kurahashi, 1970:

寄 主：幼蟲寄生于切葉蜂(*Megachile tsurufensis*)的巢內。

分 佈：臺灣、北京；日本。

Miltogramma (Stephanodactylum) asiaticum Rohdendorf 亞洲蜂麻蠅 (Fan, 1992:591; Xue et al., 1996, 2:1552; Zhang et Zhao, 1996:250)

Miltogramma (*Stephanodactylum*) *asiaticum* Rohdendorf, 1935:35-36.

寄 主：單棲性蜂巢內，較少也在泥蜂總科(Sphecoidea)及蜾蠃總科(Eumenoidea)等的巢內。

分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、亞洲中部、北非、歐洲。

Miltogramma (Pseudomiltogramma) bervipilum Villen 短毛蜂麻蠅 (Zhang, 1980:214)

寄 主：

分 佈：新疆。

Miltogramma (Stephanodactylum) bimaculatum Chao et Zhang 兩斑蜂麻蠅 (Fan, 1992:591; Xue et al., 1996, 2:1552; Zhang et Zhao, 1992:1176)

Miltogramma (*Stephanodactylum*) *bimaculatum* Chao et Zhang, 1988:227.

寄 主：

分 佈：雲南。

Miltogramma (Pseudomiltogramma) brevipilum Villeneuve 短毛蜂麻蠅 (Fan, 1992:593; Xue et al., 1996, 2:1552)

Miltogramma (*Pseudomiltogramma*) *brevipilum* Villeneuve, 1911:118.

寄 主：
分 佈：新疆；蘇聯、土耳其斯坦、歐洲南部和中部。

Miltogramma (Cylindrothecum) iberium Villeneuve 西班牙長鞘蜂麻蠅 (Fan, 1992:593; Xue et al., 1996, 2:1552; Zhang et Zhao, 1992:1176)
Miltogramma (*Cylindrothecum*) *iberium* Villeneuve, 1912:508.
=*Cylindrothecum necopinotum* Rohdendorf, 1935:31-32.
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯、西班牙、阿爾及利亞。

Miltogramma (Cylindrothecum) iberium brachygonitum Fan et Ge 短突長鞘蜂麻蠅 (Fan, 1992:593)
Miltogramma (*Cylindrothecum*) *iberium brachygonitum* Fan et Ge, 1992:593.
寄 主：
分 佈：河南、陝西。

Miltogramma (Pseudomiltogramma) kirgizorum Rohdendorf 金赤蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:250)
寄 主：
分 佈：新疆；蒙古、Chiva.

Miltogramma (Stephanodactylum) punctatum Meigen 斑蜂麻蠅 (Zhang, 1980:214; Zhang et Zhao, 1996:250)
Miltogramma punctatum Meigen, 1824:
別 名：*黑斑赤蜂麻蠅*。
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古；吉爾吉斯斯坦、土耳其。

Miltogramma (Miltogrammidium) rutilans Meigen 紅角蜂麻蠅 (Fan, 1992:591; Xue et al., 1996, 2:1554; Zhang, 1980:214)
Miltogramma rutilans Meigen, 1824:231.
寄 主：
分 佈：內蒙古；蘇聯、歐洲中部和北部(德國)。

Miltogramma (Anacanthothecum) testaceifrons (von Roser) 殼額蜂麻蠅 (Fan, 1992:591; Xue et al., 1996, 2:1554; Zhang, 1980:214; Zhang et Zhao, 1992:1176; 1996:250)
Xysta testaceifrons von Roser, 1840:58.
=*Miltogramma pilitarse* Rondani, 1859:
=*Miltogramma nuditarse* Villeneuve, 1928:
寄 主：單棲性蜂巢內，較少數也在泥蜂總科(Sphecoidea)及蜾蠃總科(Eume-noidea)等的巢內。
分 佈：西藏、新疆、內蒙古；蘇聯、亞洲北部和中部、歐洲南部和中部、非洲北部。

Miltogramma (Pseudomiltogramma) tibitum Chao et Zhang 西藏蜂麻蠅 (Fan, 1992:592; Zhang et Zhao, 1992:1176)

Miltogramma (*Pseudomiltogramma*) *tibitum* Chao et Zhang, 1988:278.
寄 主：
分 佈：西藏(芒康)、四川。

Miltogrammoides alashanicus Rohdendorf 阿拉山擬蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1554)
Miltogrammoides alashanicus Rohdendorf, 1930:23.
寄 主：
分 佈：中國；蒙古。

Miltogrammoides major (Rohdendorf) 極限擬蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1554)
Peddiasiomyia major Rohdendorf, 1925:62.
寄 主：
分 佈：中國(中蒙邊境)。

Miltogrammoides maximum (Rohdendorf) 濟民擬蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1554)
Pediasiomyia maximum Rohdendorf, 1925:62.
=*Miltogrammoides chorezmicus* Rohdendorf, 1930:
=*Miltogrammoides zimini* Rohdendorf, 1930:
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、烏茲別克斯坦。

Miltogrammoides tsajdamicus Rohdendorf 柴達木擬蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1555)
Miltogrammoides tsajdamicus Rohdendorf, 1930:25.
寄 主：
分 佈：青海。

Oebalia harpax Fan 鈎鐮折蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1544)
Oebalia harpax Fan, 1987:304.
寄 主：
分 佈：西藏。

Oebalia (s. str.) **pedicella** Fan 細柄折蜂麻蠅 (Fan, 1992:603; Fan et Ma, 1988:191; Xue et al., 1996, 2:1544)
Oebalia (s. str.) *pedicella* Fan, 1988:191.
寄 主：幼蟲在泥蜂科(Sphecidae)的巢內。
分 佈：青海。

Parasarcophaga (s. str.) **albiceps** (Meigen) 白頭亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:674; Chao et Zhang, 1982:232; Fan, 1992:706; He et al., 1991:64; Hun., 1992:1161; Wu, 1988:574; Zhang, 1997:1527; Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992:1169)
Sarcophaga albiceps Meigen, 1826:22.
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Dendrolimus albolineatus Matsumura 松毛蟲(日本)
幼蟲也滋生于新鮮的人糞或動物尸體中。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、樟木)、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏

內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯、朝鮮、日本、菲律賓、越南、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、東洋區、古北區、歐洲、非洲、夏威夷群島、大洋洲部分地區、澳洲。

Parasarcophaga anchoriformis Fan 錨形亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992:1170)
Parasarcophaga anchoriformis Fan, 1964:
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、浙江、安徽、河北。

Parasarcophaga angarosinica Rohdendorv 華北亞麻蠅 (He et al., 1988:22; Yan et al., 1993, 9(2):50)
Parasarcophaga angarosinica Rohdendorv
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲、蛹)。
分 佈：北京、遼寧。

Parasarcophaga aratrix (Pand.) 犁頭亞麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) brevicornis Ho 短角亞麻蠅 (Zhang, 1997:1527; Zhang et Zhao, 1992:1171)
Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *brevicornis* Ho, 1934:
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧；俄羅斯、朝鮮、日本、馬來西亞、泰國、澳洲。

Parasarcophaga (Jantia) crassipalis (Macquart) 肥須亞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:231; Zhang, 1997:1525)
Parasarcophaga crassipalis (Macquart, 1839:)
寄 主：
分 佈：西藏、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯、地中海地區、歐洲、北美、南美、大洋洲、南非。

Parasarcophaga daurica Grunin 達烏力亞麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林。

Parasarcophaga dolescalli Johnston et Tiegs 峨眉亞麻蠅 (Ye, 1980:435)
Parasarcophaga dolescalli Johnston et Tiegs,1921:
=*Robineauella coei* Rohdendorf, 1966:
寄 主：
分 佈：四川(峨眉山、西昌、雅安)。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) dux (Thomsan) 醬亞麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:247)

Parasarcophaga dux (Thomsan, 1868:)
寄 主：幼蟲滋生于醬缸鹹菜缸或腐敗的動物糞便，也曾從松毛蟲體育出。
分 佈：福建、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、澳洲。

Parasarcophaga fedtshencoi Rohdendorf 長突亞麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：吉林。

Parasarcophaga (Rosellea) gigas (Thomas) 巨亞麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1171)
Parasarcophaga (*Rosellea*) *gigas* (Thomas, 1949:)
寄 主：
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、遼寧、黑龍江；朝鮮。

Parasarcophaga grunini Rohdendorf 闊葉亞麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：遼寧。

Parasarcophaga harpax (Pandellé) 貪食亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:675; Chao et Liang, 1984:180; Fan, 1992:715; He et al., 1988:22; Zhao, 1982 4(4):41; Zhao et Zhu, 1983:42-43)
Sarcophaga harpax Pandellé, 1896:189.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
Dictyoploca japonica Moore 銀杏大蠶蛾(蛹)。
分 佈：山東、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、亞洲北部、蘇聯、歐洲、北美。

Parasarcophaga huangshanensis (Fan) 黃山亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:613)
寄 主：
分 佈：湖南、浙江、安徽。

Parasarcophaga hui (Ho) 胡氏亞麻蠅 (Ye, 1985:107)
Parasarcophaga hui (Ho)
寄 主：
分 佈：廣西(龍州)。

Parasarcophaga idmais (Seguy) 巧亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612)
寄 主：
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、河南。

Parasarcophaga iwuensis (Ho) 叉鳥亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992:1170)

Parasarcophaga iwuensis (Ho, 1934:)
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) jacobsoni Rohdendorf 蝗屍亞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:232; Fan, 1992:706; Zhang et Zhao, 1992:1172)
Sarcophaga jacobsoni Rohdendorf, 1937:706.
寄 主：蝗屍。
分 佈：西藏、四川、山東、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、伊朗、保加利亞。

Parasarcophaga jaroschevskyi Rohdendorf 波突亞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:232; He et al., 1988: 22; Zhang et Zhao, 1992:1172)
Parasarcophaga jaroschevskyi Rohdendorf, 1937:
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
分 佈：西藏(貢覺、察雅、樟木、吉隆)、陝西、山東、北京、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯(烏蘇里斯克，即雙城子)。

Parasarcophaga (Kanoisca) kanoi (Parker) 擬對島亞麻蠅 (Zhang, 1997:1528; Zhang et Fan, 1992:613; Zhang et Zhao, 1992:1172)
Parasarcophaga (*Kanoisca*) *kanoi* (Parker, 1962:)
寄 主：
分 佈：江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、俄羅斯(遠東部分，東自烏蘇里邊境，西至阿爾泰邊區)。

Parasarcophaga khasinesis (Sen.-Wh.) 卡西亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992: 1172)
Parasarcophaga khasinesis (Sen.-Wh., 1924:)
寄 主：
分 佈：雲南；印度。

Parasarcophaga kirgizica Rohdendorf 三鬃亞麻蠅 (Ye, 1980:435; Zhang et Zhao, 1996:246)
Parasarcophaga kirgizica Rohdendorf, 1969:945-946.
寄 主：
分 佈：新疆；吉爾吉斯斯坦。

Parasarcophaga knobi (Parker) 褐須亞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:231; Zhang et Fan, 1992:613; Zhang et Zhao, 1992:1173)
Parasarcophaga knobi (Parker, 1917)
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏(樟木)、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、蘇聯、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Parasarcophaga kobayashii (Hori) 垂叉亞麻蠅 (Hsue, 1980:191)

寄 主：

分 佈：遼寧。

Parasarcophaga (s. str.) **macroauriculata** (Ho) 巨耳亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992:1171)

寄 主：

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、陝西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、海參威。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) misera misera (Walker) 醬亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:674; Xie et al., 1999, 21(2):84; Zhang, 1997:1525; Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992:1170)

Parasarcophaga misera misera (Walker, 1849:)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)

醬缸、鹹菜缸、動物糞便中。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲、薩摩亞群島、新赫布里底群島、澳洲(昆士蘭)。

Parasarcophaga misera exuferans Pand 多子醬亞麻蠅 (He et al., 1991:63)

寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(幼蟲)。

分 佈：江西。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) ngnpingensis Ye 南坪亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1619)

Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) ngnpingensis Ye, 1980:288.

寄 主：

分 佈：四川(南坪)。

Parasarcophaga (Pterophalla) oitana (Hori) 翼突亞麻蠅 (Feng, 1986:248)

Sarcophaga oitana Hori, 1955:243.

Parasarcophaga (*Pterophalla*) *oitana,* Rohdendorf, 1965:687.

寄 主：

分 佈：四川；日本(九州)。

Parasarcophaga (s. str.) **orchidea** (Bött.) 黃鬚亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992: 1172)

Parasarcophaga orchidea (Bött., 1913:)

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、薩摩亞群島、新赫布里底群島、帕果帕果。

Parasarcophaga (Pandelleisca) pingi (Ho) 秉氏亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:674; Hun., 1992:1162; Xue et al., 1996, 2:1619; Zhang et Fan, 1992:612; Zhang et Zhao, 1992:1170)

Sarcophaga pingi Ho, 1934:19.

寄 主：菜青蟲(蛹)。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、蘇聯。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) pleskei Rohdendorf 天山亞麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992: 1171)

Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *pleskei* Rohdendorf, 1937:230.

寄 主：

分 佈：雲南、新疆、黑龍江；吉爾吉斯斯坦(天山中部)。

Parasarcophaga (Pandelleisca) polystylata (Ho) 多突亞麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1172)

Sarcophaga polystylata Ho, 1934:21.

寄 主：

分 佈：廣西、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯。

Parasarcophaga (Liosarcaphaga) portschinskyi Rohdendorf 急鈎亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:675; Chao et Liang, 1984:181; Chao et Zhang, 1982:232; Fan, 1992:716; Xue et al., 1996, 2:1619; Zhang et Zhao, 1992:1172; 1996:247)

Parasarcophaga portschinskyi Rohdendorf, 1937:226.

=*Parasarcophaga verticina* Ringdahl, 1945:

寄 主：楊毒蛾(幼蟲)

楊雪毒蛾

黃紋星天牛。

分 佈：雲南、西藏、四川、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、烏克蘭、克里木半島、北高加索、南烏拉爾、中亞細亞。

Parasarcophaga pseudoscoparia Kramer 偽叉亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:674)

寄 主：*Lymantria monacha* Linnaeus 模毒蛾(幼蟲)。

分 佈：黑龍江；亞洲(北部)、東歐。

Parasarcophaga (Liopygia) ruficornis (Fabricius) 緋角亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)

Musca ruficornis Fabricius. 1794:314.

=*Liopygia friederichsiana* Enderlein, 1928:

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東、海南；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度(東部)、斯里蘭卡、夏威夷、馬里亞納島、薩摩亞群島、索科特拉島、巴西、馬達加斯加、非洲。

Parasarcophaga (Robineauella) scoparia (Pandellé) 巨叉亞麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:232; Zhang et Zhao, 1992:1171)

Parasarcophaga scoparia (Pandellé, 1896:)
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(察雅)、四川、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲、北美。

Parasarcophaga scopariiformis (Senior-White) 叉形亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621; Ye, 1985: 107)
Sarcophaga scopariiformis Senior-White, 1927:77.
=*Sarcophaga idmais* Séguy, 1934:
=*Sarcophaga pingiana* Hsieh, 1958:
寄 主：
分 佈：福建、廣東、海南(蜈蚑洲)、廣西、浙江、河北；越南、寮國、斯里蘭卡。

Parasarcophaga (Ziminisca) semenovi (Rohdendorf) 沙州亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)
Sarcophaga semenovi Rohdendorf, 1925:121.
=*Sarcophaga linearis* Villeneuve, 1935:
寄 主：
分 佈：甘肅、寧夏、新疆、吉林；蒙古、蘇聯。

Parasarcophaga (s. str.) **sericea** (Walker) 褐鬚亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621; Zhang, 1997:1526)
Sarcophaga sericea Walker, 1852:326.
=*Sarcophaga knabi* Parker, 1917:
=*Sarcophaga frogatti* Johnston et Tiegs, 1921:
=*Sarcophaga* (*Parasarcophaga*) *omega* Johnston et Tiegs, 1921:
=*Sarcophaga knabi flavipapis* Johnston et Tiegs, 1924:
寄 主：人糞、兔尸中。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；俄羅斯(遠東烏蘇里邊境)、朝鮮、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Parasarcophaga (Pandelleisca) similes (Meade) 野亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1622; Zhang et Zhao, 1992:1170)
Sarcophaga similes Meade, 1876:261.
=*Sarcophaga appendiculata* Kramer, 1905:
=*Parasarcophaga popovi* Trofimov, 1948:
寄 主：
分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、亞洲東南部和北部、薩哈林島、俄羅斯、德國。

Parasarcophaga teretirostris Pandellé 直葉亞麻蠅 (Zhang, 1980:143)
寄 主：
分 佈：新疆。

Parasarcophaga (Liosarcaphaga) tuberosa (Pandellé) 結節亞麻蠅 (ASZI, 1987, 2:675; Fan, 1992:715; Xue et al., 1996. 2:1622; Zhang et Zhao, 1992:1171; 1996:246)

Sarcophaga tuerosa Pandellé, 1896:192.
寄 主：*Lymantria monacha* Linnaeus　模毒蛾(僧尼舞毒蛾)
Dendrolimus spp.　松毛蟲。
分 佈：廣西、四川、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯、歐洲(法國南部)、北非、北美洲。

Parasarcophaga tuberosa liukiuensis Fandellé 琉球節亞麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:612)
寄 主：
分 佈：貴州、雲南；日本。

Parasarcophaga (Variosellea) uliginosa (Kramer) 槽葉亞麻蠅 (Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1622)
Sarcophaga uliginos Kramer, 1908:152.
寄 主：
分 佈：寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、法國、意大利、德國、丹麥、南斯拉夫、羅馬尼亞、美洲。

Parasarcophaga (s. str.) **unguitigris** Rohdendorf 虎爪亞麻蠅 (Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1622)
Parasarcophaga (s. str.) *unguitigris* Rohdendorf, 1938:104.
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(錫霍特山脈)。

Parasarcophaga (Curranea) yunnanensis Fan 雲南亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1624)
Parasarcophaga (*Curranea*) *yunnanensis* Fan, 1964:307.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)；越南、泰國。

Pandelleana protuberans (Pandellé) 腫額潘麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1606)
Sarcophaga protuberans Pandellé, 1896:187.
=*Sarcophaga angustifrons* Baranov, 1926:
=*Pandalleana dzhavachetica* Gudjabidze, 1966:
寄 主：
分 佈：新疆；蘇聯、土耳其、法國、意大利、德國。

Pandelleana protuberans shantungensis Yeh 山東潘麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1607)
Pandelleana protuberans shantungensis Yeh, 1964:302.
寄 主：
分 佈：山東(鰲山衛)、山西、河北。

Pandelleana struthiodes Xue et Feng 駝潘麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1607)
Pandelleana struthiodes Xue et Feng, 1986:203-206.
寄 主：
分 佈：四川(雅安名山)。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) aegyptica (Salem) 埃及亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1611)

Sarcophaga aegyptica Salem, 1935:56.
=*Parasarcophaga parkeri* Rohdendorf, 1937:
寄 主：
分 佈：甘肅、寧夏、新疆；蘇聯、小亞細亞半島、北非(埃及)。

Parasarcophaga (s. str.) **albiceps** (Meigen) 白頭亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1611)
Sarcophaga albiceps Meigen, 1826:22.
=*Sarcophaga privigna* Rondani, 1860:
=*Sarcophaga cyathisans* Pandellé, 1896:
=*Sarcophaga pauciseta* Kramer, 1905:
=*Parasarcophaga colchica* Gudjabize, 1966:
寄 主：*Dendrolimus albolineatus* 松毛蟲(幼蟲)(日本)
人糞塊、兔尸中、寄生水牛組織引起蛆症。
分 佈：中國大部分地區；蘇聯、日本、朝鮮、菲律賓、越南、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、澳洲、歐洲。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) angarosinica Rohdendorf 華北亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1612)
Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *angarosinica* Rohdendorf, 1937:237.
寄 主：
分 佈：江蘇、河南、陝西、山東、河北、青海、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(西伯利亞東部)。

Parasarcophaga (Rosellea) aratrix (Pandellé) 犁頭亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1612)
Sarcophaga aratrix Pandellé, 1896:191.
=*Sarcophaga kuntzei* Kramer, 1905:
=*Sarcophaga pseudaratrix* Baranov, 1925:
寄 主：
分 佈：內蒙古、遼寧、黑龍江；蘇聯、西班牙、法國、意大利、南斯拉夫。

Parasarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy) 銀口亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1612)
Myophora argyrostoma Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Sarcophaga barbata* Thomson, 1869:
=*Sarcophaga falculata* Pandellé, 1896:
=*Sarcophaga persicae* Senior-White, 1924:
=*Sarcophaga chivensis* Zimin, 1928:
寄 主：
分 佈：中國；蒙古、印度、阿富汗、土耳其、伊拉克、沙特阿拉伯、以色列、敘利亞、埃及、突尼斯、南非、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) brevicornis (Ho) 短角亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1612)
Sarcophaga brevicornis Ho, 1934:23.
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯、馬來西亞、泰國、緬甸、澳洲。

Parasarcophaga (Jantia) crassipalpis (Macquart) 肥鬚亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1612)

Sarcophaga crassipalpis Macquart, 1839:112.
=*Sarcophaga dalmatina* Schiner, 1862:
=*Sarcophaga securifera* Villeneuve, 1908:
寄 主：
分 佈：西藏、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、地中海地區、歐洲(加那利群島)、非洲南部、大洋洲部地區、北美洲、南美洲部分地區。

Parasarcophaga (Jantiella) doleschalli Johnston et Tiegs 峨嵋亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1613)

Parasarcophaga doleschalli Johnston et Tiegs, 1921:73.
=*Sarcophaga aurifrons* Doleschall, 1858:
=*Robineauella coei* Rohdendorf, 1966:
寄 主：
分 佈：廣西、四川、甘肅；越南、泰國、印尼(爪哇)。

Parasarcophaga (Liosarcaophaga) dux (Thomson) 醬亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1613)

Sarcophaga dux Thomson, 1868:534.
=*Sarcophaga subtuberosa* Parker, 1917:
=*Parasarcophaga misera*; Rohdendorf, 1970:
寄 主：幼蟲孳生醬缸和鹹菜缸中、馬糞、魚油渣
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、菲律賓、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、西薩摩亞、美國(夏威夷、關島、東薩摩亞)。

Parasarcophaga (Apicamplexa) emdeni Rohdendorf 直葉亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1613)

Parasarcophaga (Apicamplexa) emdeni Rohdendorf, 1969:946. (new name fro *teretirrostris* Rhodendorf, 1937, *nec* Pandellé)
寄 主：
分 佈：新疆；蘇聯、歐洲、非洲北部。

Parasarcophaga (Liosarcaophaga) fedtshenkoi Rohdendorf 長突亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1613)

Parasarcophaga (Liosarcaophaga) fedtshenkoi Rohdendorf, 1969:943.
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林；塔吉克斯坦。

Parasarcophaga (Rosellea) gigas (Thomas) 巨亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)

Sarcophaga gigas Thomas, 1949:166.
=*Sarcophaga koreaensis* Park et Kano, 1961:
寄 主：
分 佈：四川(重慶歌樂山)、浙江、江蘇、湖北、河南、遼寧；朝鮮。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) harpax (Pandellé) 貪食亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)

Sarcophaga harpax Pandellé, 1896:192.
=*Sarcophaga ambigua* Kramer, 1905:
寄 主：
分 佈：山東、北京、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、北美洲。

Parasarcophaga (Curranea) hinglungensis Fan 興隆亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)
Parasarcophaga (*Curranea*) *hinglungensis* Fan, 1964:307.
寄 主：
分 佈：海南(興隆)、浙江、湖北。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) hui (Ho) 胡氏亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)
Sarcophaga hui Ho, 1936:259.
寄 主：
分 佈：海南、廣西、雲南。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) idmais (Séguy) 巧亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)
Sarcophaga idmais Séguy, 1934:24.
寄 主：
分 佈：江西、廣西、西藏、浙江、江蘇、河南、寧夏；泰國、尼泊爾。

Parasarcophaga (Curransis) iwuensis (Ho) 義烏亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1614)
Sarcophaga iwuensis Ho, 1934:34.
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江(義烏)、江蘇；泰國。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) jacobsoni Rohdendorf 蝗尸亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1617)
Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *jacobsoni* Rohdendorf, 1937:220.
=*Parasarcophaga sachtlebeni* Lehrer, 1959:
寄 主：
分 佈：西藏、青海、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯(高加索)、亞洲中部、伊朗、保加利亞。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) jaroschevskyi Rohdendorf 波突亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1617)
Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *jaroschevskyi* Rohdendorf, 1937:231.
寄 主：
分 佈：河南、陝西、山東、河北、北京、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、俄羅斯(烏蘇里)。

Parasarcophaga (Kanoisca) kanoi (Park) 擬對島亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1617)
Sarcophaga kanoi Park, 1962:6.
=*Parasarcophaga tssuhimae*; Rohdendorf, 1937: (*nec* Senior-White)
寄 主：
分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮(大邱)、蘇聯。

Parasarcophaga (Pandelleisca) kowayuensis (Kano) 擬野亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1617)

Sarcophaga kawayuensis Kano, 1950:825.

寄 主：

分 佈：吉林；日本(北海道)。

Parasarcophaga (Rosellea) khasiensis (Senior-White) 卡西亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Sarcophaga khasiensis Senior-White, 1924:246.

寄 主：

分 佈：貴州、雲南、西藏、四川；泰國、印度、尼泊爾。

Parasarcophaga (Apicamplexa) kirgizica Rohdendorf 三鬃亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Parasarcophaga (*Apicamplexa*) *kirgizica* Rohdendorf, 1969:944.

寄 主：

分 佈：新疆；吉爾吉斯斯坦。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) kitaharai (Miyazaki) 裂突亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Sarcophaga kitaharai Miyazaki, 1958:143.

=*Parasarcophaga apiciscissa* Fan, 1964:

寄 主：

分 佈：江蘇、遼寧；日本(九州)。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) kobayashii (Hori) 垂叉亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Sarcophaga kobayashii Hori, 1954:296.

寄 主：

分 佈：遼寧、黑龍江；日本(石川後高山)。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) liui Ye et Zhang 柳氏亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Parasarcophaga (*Liosarcophaga*) *liui* Ye et Zhang, 1989:355-357.

寄 主：

分 佈：湖南(沅江)。

Parasarcophaga (s. str.) **macroauriculata** (Ho) 巨耳亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Sarcophaga macroauriculata Ho, 1932:347.

寄 主：

分 佈：福建、江西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、河南、陝西、河北、北京、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、俄羅斯。

Parasarcophaga (s. str.) **misera** (Walker) 黃鬚亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1618)

Sarcophaga misera Walker, 11849:829.

=*Sarcophaga orchidea* Boettcher, 1913:

=*Sarcophaga gamma* Johnston, 1921:

=*Sarcophaga inoumca* Curran, 1929:

=*Sarcophaga neopalpus* Johnston et Tiegs, 1932:

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲區。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) nanpingensis Ye 南坪亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1619)

Parasarcophaga (Liosarcophaga) nanpingensis Ye, 1980:288.

寄 主：

分 佈：四川(南坪)。

Parasarcophaga (Pandelleisca) ping (Ho) 秉氏亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1619)

Sarcophaga pingi Ho, 1934:19.

寄 主：

分 佈：福建、廣西、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、河北(北京)、甘肅、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、蘇聯。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) pleskei Rohdendorf 天山亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1619)

Parasarcophaga (Liosarcophaga) pleskei Rohdendorf, 1937:230.

寄 主：

分 佈：新疆、黑龍江；吉爾吉斯斯坦(天山中部)。

Parasarcophaga (Pandelleisca) polystylata (Ho) 多突亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1619)

Sarcophaga polystylata Ho, 1934:21.

寄 主：

分 佈：廣西、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北(北京)、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) portschinskyi Rohdendorf 急鈎亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)

Parasarcophaga (Liosarcophaga) portschinskyi Rohdendorf, 1937:226.

=*Parasarcophaga verticina* Ringdahl, 1945:

寄 主：

分 佈：四川、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、烏克蘭。

Parasarcophaga (Liogygia) ruficornis (Fabricius) 緋角亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)

Musca ruficornis Fabricius, 1794:314.

=*Liopygia friederichsiana* Enderlein, 1928:

寄 主：孳生于廁所、廚房垃圾及殘餘物、動物尸體，成蠅見于海濱。

分 佈：臺灣、廣東、海南；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度(東部)、斯里蘭卡印尼、夏威夷、馬里亞納群島、薩摩亞群島、索科特拉島、巴西、馬達加斯加非洲。

Parasarcophaga (Ziminisca) semenovi (Rohdendorf) 沙州亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)

Sarcophaga semenovi Rohdendorf. 1925:121.

=*Sarcophaga linearis* Villeneuve, 1935:

寄 主：
分 佈：甘肅、寧夏、新疆、吉林；蒙古、蘇聯。

Parasarcophaga (Curranea) scopariiformis (Senior-White) 叉形亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)
Sarcophaga scopariiformis Senior-White, 1927:77.
=*Sarcophaga idmais* Séguy, 1934:
=*Sarcophaga pingiana* Hsieh, 1958:
寄 主：
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、河北；越南、寮國、斯里蘭卡。

Parasarcophaga (s. str.) **sericea** (Walker) 褐鬚亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1621)
Sarcophaga sericea Walker, 1852:326.
=*Sarcophaga knabi* Parker, 1917:
=*Sarcophaga frogatti* Johnston et Tiegs, 1921:
=*Sarcophaga* (*Parasarcophaga*) *omega* Johnston eet Tiegs, 1921:
=*Sarcophaga knabi flavipalpis* Senior-White, 1924:
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Parasarcophaga (Pandelleisca) similes (Meade) 野亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1622)
Sarcophaga similes Meade, 1876:261.
=*Sarcophaga appendiculata* Kramer, 1905:
=*Parasarcophaga popovi* Trofimov, 1948:
寄 主：
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；亞洲東南部、俄羅斯、歐洲(德國)。

Parasarcophaga (Liosarcophaga) tuberosa (Pandellé) 結節亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1622)
Sarcophaga tuberosa Pandellé, 1896:192.
寄 主：
分 佈：廣西、江蘇、湖北、河南、山東、河北、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、北非、北美洲。

Parasarcophaga (Variosellea) uliginosa (Kramer) 槽葉亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1622)
Sarcophaga uliginosa Kramer, 1908:152.
寄 主：
分 佈：寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、法國、意大利、德國、丹麥、南斯拉夫、羅馬尼亞、北美洲。

Parasarcophaga (s. str.) **unguitigris** Rohdendorf 虎爪亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1622)
Parasarcophaga (s. str.) *unguitigris* Rohdendorf, 1938:104.

寄 主：
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(錫霍特山脈)。

Parasarcophaga (Curranea) yunnanensis Fan 雲南亞麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1624)
Parasarcophaga (*Curranea*) *yunnanensis* Fan, 1964:307.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)；越南、泰國。

Phallocheira minor Rohdendorf 小曲麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1624)
Phallocheira minor Rohdendorf, 1937:269.
寄 主：
分 佈：湖北、河南、山西、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(季格魯伐亞)。

Phallosphaera (Yunnanomyia) amica Ma 友誼球麻蠅 (Fan, 1992:665; Xue et al., 1996, 2:1625)
Phallosphaera amica Ma, 1964:56.
寄 主：
分 佈：遼寧(千山)；朝鮮。

Phallosphaera (Yunnanomyia) gravelyi (Senior-White) 華南球麻蠅 (Fan, 1992:664; Xue et al., 1996, 2:1625; Zhang, 1997:1523)
Sarcophaga gravelyi Senior-White, 1924:229.
=*Sarcophaga longicornis* Boettcher, 1912: (*nec* Macquart, 1843)
=*Sarcophaga formosana* Senior-White, 1924: (new name for *Sarcophaga longicornis,* Bött.)
=*Sarcophaga kinoshitai* Hori, 1954:
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 松毛蟲(幼蟲)(浙江)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、遼寧；朝鮮、日本、琉球、泰國、印度、尼泊爾。

Phallosphaera (Yannanomyia) kinoshitai (Hori) 華南球麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992:1168)
Phallosphaera (*Yannanomyia*) *kinoshitai* (Hori, 1954:)
寄 主：
分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、遼寧；朝鮮、日本。

Phallosphaera (s. str.) **konakovi** Rohdendorf 東北球麻蠅 (Fan, 1992:664; Xue et al., 1996, 2:1625; Zhang, 1997:1523; Zhang et Zhao, 1992:1168)
Phallosphaera (s. str.) *konakovi* Rohdendorf, 1938:107.
=*Sarcophaga shiroganensis* Kano et Okazaki, 1956:
寄 主：
分 佈：雲南、四川、陝西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、俄羅斯(西伯利亞東部)。

Phrosinella nasuta (Wiedemann) 短鼻法蜂麻蠅 (Fan, 1992:609; Xue et al., 1996, 2:1545; Zhang, 1988:166)
Tachina nasuta Wiedemann, 1824:374, 233.
=*Tachina snnio* Zetterstedt, 1838:

=*Tachina pilitarsis* Zetterstedt, 1844:
=*Miltogramma strenua* Perris, 1852:
=*Sphixapata lineolata* Rondani, 1859:
=*Phrosina argyrina* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：泥蜂巢內捕食
分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯(中亞、外高加索、歐洲部分)、歐洲、北非，利比亞，全北區。

Phylloteles pictipennis Loew 花翅葉蜂麻蠅 (Fan, 1992:610; Xue et al., 1996, 2:1545; Zhang et Zhao, 1992:1181)
Phylloteles pictipennis Loew, 1844:168.
=*Thelodiscoprosopa formosana* Townsend, 1932:
寄 主：泥蜂巢內捕食。
分 佈：四川；日本、亞洲中部、高加索、土耳其、歐洲(奧地利)。

Phylloteles stackelbergi Rohdendorf 斯氏葉蜂麻蠅 (Fan, 1992:610; Xue et al., 1996, 2:1547; Zhang, 1988:166)
Phylloteles stackelbergi Rohd., 1975: 232-233.
=*Phylloteles pictipennis* Hori et Kurhashi, 1960:
寄 主：泥蜂巢內捕食。
分 佈：河北、北京、黑龍江；日本、蘇聯(西伯利亞東部、遠東地區)、歐洲。

Pierretia (Bellierriomima) baoxingensis Feng et Ye 寶興細麻蠅 (Feng et Ye, 1987:189; Xue et al., 1996, 2:1630)
Pierretia baoxingensis Feng et Ye, 1987:189.
寄 主：
分 佈：四川。

Pierretia bihami Qian et Fan 雙鈎細麻蠅 (Fan, 1992:675; Xue et al., 1996, 2:1630)
Pierretia bihami Qian et Fan, 1981:446.
寄 主：
分 佈：新疆(新源)。

Pierretia (Ascelotella) calcifera (Böttcher) 杯細麻蠅 (Fan, 1992:680; Xue et al., 1996, 2:1630)
Sarcophaga calcifera Böttcher, 1912:169.
=*Ascelotella formosana* Enderlein, 1928:
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；琉球、菲律賓、印度、斯里蘭卡、尼日利亞、扎伊爾、烏干達。

Pierretia (Pseudothyrsocnema) caudagalli (Böttcher) 雞尾細麻蠅 (ASZI, 1987, 2:671; Chao et Liang, 1984:176; Chao et Shi, 1981(3):51; Fan, 1992:686; He et al., 1991:64; Sun et al., 1980(4):22; Xue et al., 1996, 2:1631; Yu, 1983:44; Yu, 1995, 17(3):139; Zhang, 1987[ed.] 2:69; Zhang et Fan, 1992:610)
Sarcophaga caudagalli Böttcher, 1912:167.
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Sesamia inferens (Walker) 大螟
Simyra albovenosa Goeze 稻毛蟲
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡。

Pierretia (Arachnidomyia) clathrata (Meigen) 格細麻蠅 (Fan, 1992:678; Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1631; Zhang et Zhao, 1992:1168)
Sarcophaga clathrata Meigen, 1826:25.
=*Sarcophaga clavulus* Pandellé, 1896:
=*Sarcophaga nigrans* Pandellé, 1896:
=*Arhopocnemis boettcheri* Enderlein, 1928:
別 名：*棋斑細麻蠅*。
寄 主：
分 佈：四川、北京、天津、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯遠東、加那利群島(西班牙)、南歐、中歐(德國)。

Pierretia (Pseudothyrsocnema) crinitula (Quo) 小灰細麻蠅 (Fan, 1992:686; Xue et al., 1996, 2:1631)
Sarcophaga crinitula Quo, 1952:73.
=*Thyrsocnema* (*Pseudothyrsocnema*) *caudagalli*, Rohdendorf, 1937: (part); Fan, 1965: (part) (*nec* Böttcher, 1912)
=*Thyrsocnema* (*Pseudothyrsocnema*) *crinitula*, Shinonaga et Lopes, 1975:
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇、上海；朝鮮、日本。

Pierretia (Bellieriomima) diminuta (Thomas) 微刺細麻蠅 (Fan, 1992:684; Xue et a., 1996, 2:1631; Zhang et Zhao, 1992:1168)
Sarcophaga diminuta Thomas, 1949:170-171.
寄 主：
分 佈：四川(重慶)、陝西、河北、北京、黑龍江。

Pierretia fani Li et Ye 范氏細麻蠅 (Fan, 1992:682; Li et al., 1985:296; Xue et al., 1996,2:1631)
Pierretia fani Li et Ye, 1985:296-297.
寄 主：
分 佈：雲南(麗江)。

Pierretia fieldi (Kano) 擬臺南細麻蠅 (Hsue, 1980:191)
寄 主：
分 佈：遼寧。

Pierretia (Nudicerca) furutonensis (Kano et Okazaki) 古利根細麻蠅 (Fan, 1992:686; Xue et al., 1996, 2:1631)
Sarcaphaga furutonensis Kano et Okazaki, 1956:76.
寄 主：
分 佈：上海、遼寧；日本(本州)。

Pierretia (Pachystyleta) genuforceps (Thomas) 藤葉細麻蠅 (Fan, 1992:684; Xue et al., 1996, 2:1631; Zhang et Zhao, 1992:1168)

Sarcophaga genuforceps Thomas, 1949:172-173.

寄 主：

分 佈：四川(重慶)、浙江、河南。

Pierretia (Bellieriomima) globovesica Ye 球膜細麻蠅 (Fan, 1992:684; Xue et al., 1996, 2:1631; Ye, 1980:411)

Pierretia globovesica Ye, 1980:411-412.

寄 主：

分 佈：四川(米易)；越南。

Pierretia (Thomasomyia) graciliforceps (Thomas) 瘦葉細麻蠅 (Fan, 1992:684; Xue et al., 1996, 2:1631; Zhang et Zhao, 1992:1168)

Sarcophaga graciliforceps Thomas, 1949:103-105.

寄 主：

分 佈：湖南、四川(重慶歌樂山)、浙江、江蘇、湖北、河南、北京。

Pierretia (Bellieriomima) josephi (Böttcher) 臺南細麻蠅 (Fan, 1992:682; Xue et al., 1996, 2:1631; Zhang et Fan, 1992:610)

Sarcophaga josephi Böttcher, 1912:168.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、河南、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、東南亞。

Pierretia (Thyrsocnema) kentejana Rohdendorf 肯特細麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:229; Fan, 1992:682; Xue et al., 1996, 2:1631; Zhang et Zhao, 1992:1167)

Thyrsocnema kentejana Rohdendorf, 1937:174-175.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、河北、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯、羅馬尼亞(北部山區)。

Pierretia lageniharpes Xue et Feng 葫突細麻蠅 (Xue et Feng, 1989:485)

Pierretia lageniharpes Xue et Feng, 1989:485.

寄 主：

分 佈：四川。

Pierretia (Pseudothyrsocnema) lhasae Fan 拉薩細麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:230; Fan, 1992:686; Xue et al., 1996, 2:1634)

Pierretia (*Pseudothyrsocnema*) *lhasae* Fan, 1964:307.

寄 主：

分 佈：西藏(拉薩)。

Pierretia (Bellieriomima) lingulata (Ye) 端舌細麻蠅 (Fan, 1992:684; Xue et al., 1996, 2:1634)

Bellieriomima lingulata Ye, 1980:285-286.

寄 主：
分 佈：四川(南坪)、甘肅。

Pierretia (Arachnidomyia) nemoralis (Kramer) 林細麻蠅 (Fan, 1992:678; Xue et al., 1996, 2:1634)
Sarcophaga nemoralis Kramer, 1908:152.
寄 主：
分 佈：黑龍江；烏克蘭、俄羅斯、中歐(德國)、北歐。

Pierretia (Arachnidomyia) olsoufjevi (Rohdendorf) 歐蘇細麻蠅 (Fan, 1992:678; Xue et al., 1996, 2:1634; Zhang, 1980:143)
Thyrsocnema olsoufjevi Rohdendorf, 1937:161.
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古、遼寧吉林；俄羅斯、塔吉克斯坦、烏克蘭。

Pierretia (Arachnidomyia) otiophalla Fan et Chen 耳陽細麻蠅 (Fan, 1992:680; Xue et al., 1996, 2:1634)
Pierretia (*Arachnidomyia*) *otiophalla* Fan et Chen, 1982:241.
寄 主：
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Pierretia (Prosballia) prosbaliina (Baranov) 披陽細麻蠅 (Fan, 1992:686; Xue et al., 1996, 2:1634)
Sarcophaga prosbaliina Baranov, 1931:112.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Pierretia (Bellieriomima) pterygota (Thomas) 翼陽細麻蠅 (Fan, 1992:681; Xue et al.., 1996, 2:1634)
Sarcophaga pterygota Thomas, 1949:165-166.
=*Sarcophaga affinis* Quo, 1952: (*nec* Fallén, 1816)
=*Sarcophaga subulata,* Kano et Okazaki, 1956: (*nec* Pandellé, 1896)
=*Pierretia* (*Bellieriomima*) *subulata pterygota,* Fan, 1965:
寄 主：
分 佈：廣西、四川(重慶)、浙江、江蘇、上海；日本。

Pierretia (s. str.) **recirvata** Chen et Yao 擬單疣細麻蠅 (Fan, 1992:174; Xue et al., 1996, 2:1634)
Pierretia (s. str.) *recirvata* Chen et Yao, 1986:295-297.
寄 主：
分 佈：新疆(烏魯木齊)。

Pierretia (Phallantha) sichotealini (Rohdendorf) 錫霍細麻蠅 (Fan, 1992:677; Xue et al.., 1996, 2:1634; Zhang et Fan, 1992:610; Zhang et Zhao, 1992:168)
Phallantha sichotealini Rohdendorf, 1938:102.
=*Sarcophaga jezensis* Hori, 1954:
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、江蘇、上海、湖北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮南部、日本、俄羅斯(遠東地區：錫霍特阿林)。

Pierretia (Bellieriomima) situliformis Zhong, Wu et Fan 戽斗細麻蠅 (Fan, 1992:682; Xue et al., 1996, 2:1638; Wu, 1988:575)

Pierretia situliformis Zhong, Wu et Fan, 1982:245-252.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)、尼泊爾。

Pierretia (Athyrsia) sororula (Rohdendorf) 多突細麻蠅 (Fan, 1992:674; Xue et al., 1996, 2:1638; Zhang, 1980:143)

Thyrsocnema sororcula Rohdendorf, 1937:183.

寄 主：

分 佈：新疆；烏茲別克斯坦(塔什干)、西伯利亞西部。

Pierretia spatuliformis Ye 勺形細麻蠅 (Ye, 1980:412)

Pierretia spatuliformis Ye, 1980:412-413.

寄 主：

分 佈：海南(西瑁島)。

Pierretia (Bellieriomima) stackelbergi (Rohdendorf) 烏蘇里細麻蠅 (Fan, 1992:683; Xue et al., 1996, 2:1638)

Athyrsomima stackelbergi Rohdendorf, 1937:187, 189.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(西伯利亞東部烏蘇里邊區)。

Pierretia subulata pterygota (Thomas) 翼陽細麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:610)

寄 主：

分 佈：廣西、四川、浙江、江蘇；日本。

Pierretia (Bellieriomima) tenuicoris (Rohdendorf) 細角細麻蠅 (Fan, 1992:680; Xue et al., 1996, 2:1638)

Thyrsocnema tenuicornis Rohdendorf, 1937:165.

寄 主：

分 佈：山東、甘肅、內蒙古。

Pierretia (Arachnidomyia) tsintaoensis Yeh 青島細麻蠅 (Fan, 1992:678; Xue et al., 1996, 2:1638)

Pierretia (Arachnidomyia) tsintaoensis Yeh, 1964:300.

寄 主：

分 佈：山東(青島)。

Pierretia (Pseudothyrsocnema) ugamskii (Rohdendorf) 上海細麻蠅 (ASZI, 1987, 2:670; Chao et Liang, 1984: 176; Fan, 1992:680; He et al., 1991:64; Xue, 1995:535; Xue et al., 1996, 2:1638)

Thyrsocnema ugamskii Rohdendorf, 1937:171.

=*Sarcophaga shanghaiensis* Quo, 1952:

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲，湖北)。

分 佈：浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(烏蘇里邊區)。

Pierretia (s. str.) **villeneuvei** Böttcher 單疣細麻蠅 (Fan, 1992:674; Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1638)

Sarcophaga villeneuvei Böttcher, 1912:347.

寄 主：

分 佈：新疆、吉林、黑龍江；俄羅斯、歐洲(德國柏林)。

Pierretia (Bellieriomima) zhouquensis (Ye et Liu) 舟曲細麻蠅 (Fan, 1992:680; Xue et al., 1996, 2:1638)

Pierretia (*Bellieriomima*) *zhouquensis* Ye et Liu, 1981:231.

寄 主：

分 佈：甘肅(舟曲)。

Pollenia pseudoruids Rognes 僞粗野粉蠅 (Fan, 1992:524)

Pollenia pseudoruids Rognes, 1985:493.

寄 主：蚯蚓。

分 佈：新疆；印度(克什米爾)、巴基斯坦、北非、全北區、蘇聯(歐洲部分、中亞)、北歐、北美、新西蘭。

Pollenomyia sinensis Séguy 中華粉腹麗蠅 (Fan, 1992:519)

Pollenomyia sinensis Séguy, 1935:149.

寄 主：陸生薄殼蝸牛。

分 佈：北京、遼寧；日本、蘇聯(遠東濱海邊)。

Protocalliphora azurea (Fallén) 青原麗蠅 (Fan, 1992:550)

Musca azurea Fallén, 1816:245.

寄 主：麻雀(*Passer montanus saturatue* Stejn. 的雛體
紫椋鳥巢穴。

分 佈：雲南、貴州、四川、浙江：河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯北非、土耳其、歐洲。

Protomiltogramma fasciata (Meigen) 橫帶盾斑蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1556)

Miltogramma fasciata Meigen, 1824:227.

=*Sphecapata erythrochaeta* Bezzi, 1895:

寄 主：

分 佈：中國；日本、蒙古、蘇聯、亞洲西部、歐洲(法國)、非洲。

Protomiltogramma jaxarttiana (Rohdendorf) 擬橫帶盾斑蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1555)

Thereomoyia jaxortiana Rohdendorf, 1927:314. (as ssp. of *fasciata* Meigen)

寄 主：

分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯。

Protomiltogramma yunnanense (Fan) 滇南盾斑蜂麻蠅 (Fan, 1992:595; Xue et al., 1996, 2:1555)

Pterella yunnanensis Fan, 1981:314.

寄 主：幼蟲爲泥蜂巢內的捕食者。

分 佈：雲南。

Protomiltogramma yunnanicum (Chao et Zhang) 雲南盾斑蜂麻蠅 (Fan, 1992:595; Xue et al., 1996, 2:1555)

Thereomyia yunnanica Chao et Zhang, 1988:279.

寄 主：幼蟲爲泥蜂巢內的捕食者

分 佈：雲南。

Pseudosarcophaga affinis (Fallén) 鄰近僞麻蠅 (ASZI, 1987 2:678; He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。

分 佈：北京、新疆；蘇聯(遠東地區)、中亞、歐洲、北美。

Pterella grisea (Meigen) 灰小翅蜂麻蠅 (Fan, 1992:594; Xue et al., 1996, 2:1556)

Miltogramma grisea Meigen, 1824:230.

=*Miltogramma intricata* Meigen, 1824:

=*Setulia cerceridis* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Setulia incompta* Robineau-Desvoidy, 1863:

寄 主：幼蟲在 *Cerceris* 屬的泥蜂巢內。

分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯(西伯利亞、吉爾吉斯斯坦、歐洲部分)、阿爾巴尼亞、歐洲中北部。

Pterella yunnanensis Fan 滇小翅蜂麻蠅 (Fan, 1981:314)

Pterella yunnansis Fan, 1981:314.

寄 主：

分 佈：雲南(金平)。

Ptersarcophaga emeishanensis Ye et Ni 峨嵋翼麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1639)

Ptersarcophaga emeishanensis Ye et Ni, 1981:229.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Ravinia stiata (Fabricius) 紅尾拉麻蠅 (ASZI, 1987, 2:664; Chao et Zhang, 1982:227; Xue et al., 1996, 2:1583; Zhang et Zhao, 1992:1166, 1996: 245)

Musca stiata Fabricius, 1794:315.

=*Sarcophaga haematodes* Meigen, 1826:

=*Myophora haemisphaeerica* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Myophora limpidipennis* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Myophora horticola* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Myophora campestris* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Pieerretia parva* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Ravinia sulcata* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Ravinia hepes* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Sarcophaga nova* Siebke, 1877:

=*Sarcophaga aozia* Séguy, 1935:

=*Gesneriodes disjuncta* Séguy, 1938:

寄 主：*Chrysochraon dispar diapar* Germ. 綠洲蝗

人糞便中。
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、印度、尼泊爾、巴基斯坦、克什米爾、阿富汗、伊朗、亞洲(西南部)、葉門、沙特阿拉伯、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、北非、歐洲

Robinauella (Digitiventra) anchoriformis (Fan) 錨形叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1640; Ye, 1983:215)
Paraasarcophaga anchoriformis Fan, 1964:309.
寄 主：
分 佈：浙江(天目山)、安徽、河北、北京、新疆、遼寧。

Robinauella (s. str.) **daurica** (Grunin) 達烏利叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1641; Ye, 1983:215)
Parasarcophaga (*Robineauella*) *daurica* Grunin, 1964:77.
寄 主：
分 佈：陝西、山西、河北、甘肅、寧夏、內蒙古(昭盟)、遼寧、吉林；俄羅斯(遠東地區)。

Robinauella (s. str.) **grunini** (Rohdendorf) 闊葉叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1641; Ye, 1983:216)
Parasarcophaga (*Robineauuella*) *grunini* Rohdendorf, 1938:104.
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(遠東錫霍特山)。

Robinauella (s. str.) **huangshanensis** (Fan) 黃山叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1641; Ye, 1983:216)
Parasarcophaga huangshanensis Fan, 1964:312.
寄 主：
分 佈：四川、浙江、安徽(黃山)、陝西。

Robinauella (s. str.) **nigribasicosta** Ye 暗鱗叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1641; Ye, 1983:216)
Robinauella (s. str.) *nigribasicosta* Ye, 1982:107-111.
寄 主：
分 佈：四川(馬爾康)。

Robinauella (Digitiventra) pseudoscoparia (Kramer) 僞叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1641; Ye, 1983:215)
Sarcophaga pseudoscoparia Kramer, 1911:
=*Sarcophaga neglecta* Kramer, 1905:
寄 主：*Lymantria monacha* Linnaeus 僧尼舞毒蛾(歐洲)。
分 佈：河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲(德國)。

Robinauella (s. str.) **scoparia** (Pandellé) 巨叉麻蠅 (Xue et al., 1996, 2"1641; Ye, 1983:216)
Sarcophaga scoparia Pandellé, 1896:189.
寄 主：

分 佈：新疆、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯(庫頁島、遠東部分、西伯利亞、中亞細亞、歐洲部分)、土耳其、歐洲(法國)、北美洲。

Sarcophaga carnaria Linnaeus 常麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1643)

Musca carnaria Linnaeus, 1758:596.
=*Musca variegta* Scopoli, 1763:
=*Musca colossus* Scopoli, 1763:
=*Musca vivipara* De Geer, 1776:
=*Sarcophaga atropos* Meigen, 1826:
=*Myophora ssoror* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora brunnifacies* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora fuliginosa* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora intermedia* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora nigra* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora livida* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora livens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora villana* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora squamosa* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora florae* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora striata* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora squamigera* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora grisea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora agricola* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora obscuricuda* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora aurifacies* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora compar* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora aprilis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora conica* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora vernalis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora specialis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora squalens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora affinis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora ssubnitens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora rubescens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora atrata* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myophora laticrus* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorella arvensis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorella florum* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorella squalida* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorella morio* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorella atrata* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Sarcophaga quadrata* Bouché, 1834:
=*Sarcophaga lasiostyla* Macquart, 1835:
=*Pierretia limpida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Pierretia squalens* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Pierretia melanura* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga aurata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga propinqua* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga albida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga erratica* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga pratensis* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Sarcophaga tenebricosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga caesia* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga maeta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga florida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga ciliatula* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga agilis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga clarripennis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga auriflua* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga geoffroyi* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga cursoria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga herbaria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga velox* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga vagane* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga afra* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga tristis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga praecox* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga boisduvali* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga ramburii* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga mitis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga tesselata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga lussoria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga virgo* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga ambulatoria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga hilaris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga modesta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga ruricola* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga humilis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga hyalipennis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga sordida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga nigrita* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga fallax* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga lugubris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora funebris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora paludosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora praticola* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora obscura* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora vaga* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora fuvescens* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora misera* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora pascuorum* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora angustata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora chrysifacies* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora frontalis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora pallidipes* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora obscurella* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora dumoti* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora herbaria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora pabulina* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora claripennis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora nebulosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora germana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora fugax* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora festiva* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Myophora tetreella* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora macquarti* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora errans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora agraria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora lusoria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora vagans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora collinaris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora monticola* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora riparia* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora curssitana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora Montana* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora temeraria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora silvatica* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora integra* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora fuscifacies* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Myophora nites* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phorella pauperata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phorella fulvipalpis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phorella labialis* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phorella muscaria* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bercaea morio* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bercaea laeta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bercaea sponsa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bercaea apricata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bercaea anceps* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sarcophaga kryshtali* Verves, 1973:
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、丹麥、歐洲。

Sarcophaga peregrina Robineau-Desvoidy 小麻蠅 (Sun et Liu, 1958:241)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)。
分 佈：湖南。

Sarcophila mongolica Chao et Zhang 蒙古麻野蠅 (Fan, 1992:614; Xue et al., 1996, 2:1564)
Sarcophila mongolica Chao et Zhang, 1988:274.
寄 主：
分 佈：內蒙古(潮格旗狼山、二連浩特)。

Sarcophila rasnitzyni Verves 拉氏小野麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1564; Zhang, 1988:166)
Sarcophila rasnitzyni Verves, 1985:301.
=*Sarcophila latifrons*, Rohdendorf et Verves, 1977: (*nec* Fallén, 1817)
寄 主：楊毒蛾(幼蟲)。
分 佈：北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯(西伯利亞東部)、中亞。

Sarcorohdendorfia antilops (Bottcher) 羚足鬃麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1646; Zhang, 1997:1521)
Sarcophaga antilops Bottcher, 1913:380.
寄 主：

分 佈：臺灣(臺南)、海南、雲南、四川、浙江、湖北、河南、遼寧、黑龍江；俄羅斯(遠東區)、朝鮮、日本、印度、錫金、印尼、所羅門群島。

Sarcorohdendorfia gracilior (Chen) 瘦鈎鬃麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1646; Zhang, 1997:1522)

Tricholioproctia (*Hamimeembrana*) *gracilior* Chen, 1975:115.

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江(天目山)；尼泊爾。

Sarcorohdendorfia inextricata (Walker) 擬羚足鬃麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1646)

Sarcorohdendorfia inextricata (Walker, 1860:132.)

寄 主：

分 佈：雲南；印尼(蘇拉威西望加錫)。

Sarcorohdendorfia mimobasalis (Ma) 銀翅鬃麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1646)

Tricholioproctia mimobasalis Ma, 1964:57.

=*Tricholioproctia flavinervis* Kano, Field et Shinonaga, 1967:

寄 主：

分 佈：遼寧(鞍山)。

Sarcorohdendorfia seniorwhitei Ho 金翅鬃麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1646)

Sarcorohdendorfia seniorwhitei Ho, 1938:117.

=*Sarcophaga flaviveervis* Senior-White, 1924:

=*Sarcophaga aurata* Walker, 1861:

寄 主：

分 佈：雲南；馬來西亞(馬六甲)、爪哇。

Sarcosolomonia aureomarginata Shinonaga et Tumrasvin 金緣所麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1649)

Sarcosolomonia aureomarginata Shinonaga et Tumrasvin, 1979:140.

寄 主：

分 佈：雲南；泰國。

Sarcosolomonia basiseta (Baranov) 基鬃所麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1650)

Sarcophaga basiseta Baranov, 1931:111.

寄 主：

分 佈：臺灣(大祖窟)、臺東、臺南、臺北。

Sarcosolomonia crinita (Parker) 恒春所麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1650)

Sarcophaga crinita Parker, 1917:92.

=*Sarcophaga kankauensis* Baranov, 1931: (港口).

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓、緬甸、印度。

Sarcosolomonia harinasutai Kano et Sooksri 僂葉所麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1650; Ye, 1980:435)

Sarcosolomonia harinasutai Kano et Sooksri, 1977:233.

寄 主：
分 佈：海南、雲南；泰國。

Sarcosolomonia hongheensis Li et Ye 紅河所麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1650)
Sarcosolomonia hongheensis Li et Ye, 1992:309-312.
寄 主：
分 佈：雲南(個舊)。

Sarcosolomonia nathani Lopes et Kano 六叉所麻蠅 (Li, 1987:194; Xue et al., 1996, 2:1650)
Sarcosolomonia nathani Lopes et Kano, 1969:184.
寄 主：
分 佈：雲南；印度、西孟加拉。

Sarcotachinella sinuata (Meigen) 股斑麻蠅 (ASZI, 1987, 2:664; Fan, 1992:645; Xue et al., 1996, 2:1651)
Sarcophaga sinuata Meigen, 1826:22.
寄 主：*Melanoplus differentialis* 赤腿蜢(若蟲、成蟲)(北美)
分 佈：陝西、青海、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、俄羅斯(遠東、西伯利亞、外高加索)、歐洲、北美。

Seniorwhitea krameri Böttcher 擬東方辛麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:231; Hun., 1992:1161; Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992:1169)
Seniorwhitea krameri Böttcher, 1912:
寄 主：滋生于牛肉、鱗翅目幼蟲、蝗類、天蛾科幼蟲屍體、軟體動物 (*Achatina fulipa*)、人糞和蠟蟬科 (Fulgoridae) 的蠟中。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、雲南、西藏(樟木)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Seniorwhitea phoenicoptera (Böttcher) 鳳喙辛麻蠅 (Fan, 1992:693; Xue et al., 1996, 2:1653)
Sarcophaga phoenicoptera Böttcher, 1913:326.
寄 主：
分 佈：臺灣(恒春港口)。

Seniorwhitea reciproca (Walker) 擬東方辛麻蠅 (Fan, 1992:692; Xue et al., 1996, 2:1653)
Sarcophaga reciproca Walker, 1856:22.
=*Sarcophaga sinica* Rohdendorf, 1930:
=*Sarcophaga procax* Rohdendorf, 1932:
寄 主：滋生于牛肉、鱗翅目幼蟲、蝗類、天蛾科幼蟲屍體、軟體動物 (*Achatina fulipa*)、人糞和蠟蟬科 (Fulgoridae) 的蠟中。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東；馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Senotainia (s. str.) **aegyptiaca** Rohdendorf 埃及賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559; Zhang, 1988: 166)
Senotainia (s. str.) *aegyptiaca* Rohd., 1935:85-86.
寄 主：

分 佈：內蒙古；埃及。

Senotainia albifrons (Rondani) 白額賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559; Zhang, 1980:214; Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphixapata albifrons Rondani, 1859:225.

寄 主：

分 佈：陝西、新疆、內蒙古；朝鮮、蒙古、蘇聯、阿富汗、亞洲中部、北非及東非、歐洲(意大利)。

Senotainia barchanica Rohdendorf 巴爾賽麻蠅 (Zhang, 1980:214)

寄 主：

分 佈：河北。

Senotainia conica (Fallén) 錐賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559)

Tachina conica Fallén, 1810:270.

=*Megaera atrox* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Megaera crudelis* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Megaera inimica* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Miltogramma quadrinotata* Macquart, 1835:

=*Miltogramma fasciolella* Zetterstedt, 1844:

=*Megaera fulvipalpis* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Megaera cinereella* Robineau-Desvoidy, 1863:

寄 主：

分 佈：河北、內蒙古；蒙古、蘇聯、歐洲(瑞典)。

Senotainia (Sphixapata) crabronum Kram 賽蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1178)

Senotainia (*Sphixapata*) *crabronum* Kram, 1920:

寄 主：

分 佈：四川；歐洲北部。

Senotainia deserta Rohdendorf 沙漠賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559)

Senotainia deserta Rohdendorf, 1935:85.

寄 主：

分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯。

Senotainia gobica Rohdendorf 戈壁賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559)

Senotainia gobica Rohdendorf, 1935:86.

寄 主：

分 佈：中國(中蒙邊境)；蒙古。

Senotainia imberbis (Zetterstedt) 泥蜂賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559)

Tachina imberbis Zetterstedt, 1838:636.

=*Miltogramma rotundiventris* Zetterstedt, 1844:

=*Ptychoneura crabronum* Kramer, 1920:

寄 主：

分 佈：四川；蘇聯(遠東地區、西伯利亞、歐洲部分中部)、歐洲(瑞典)。

Senotainia neimengguensis Chao et Zhang 內蒙古賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559)

=*Senotainia mongolica* Chao et Zhang, 1988:279.
Senotainia neimengguensis Chao et Zhang, *In* Xue et al., 1996, 2:1559. (nom. nov.)
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Senotainia (Sphixapata) sibirica Rohdendorf 西伯利亞賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1559; Zhang, 1988:166; Zhang et Fan, 1992:613; Zhang et Zhao, 1992:1177)

Senotainia (*Sphixapata*) *sibirica* Rohdendorf, 1935:80. (as ssp of *albifrons* Rondani)
寄 主：
分 佈：湖南、雲南、四川、陝西、內蒙古、黑龍江；蘇聯、亞洲中部、歐洲、北非。

Senotainia sinensis Séguy 中華賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1560)

Senotainia sinensis Séguy, 1935:131.
寄 主：
分 佈：中國(江蘇)。

Senotainia sinerea Chao et Zhang 灰頭賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1560)

Senotainia sinerea Chao et Zhang, 1988:280.
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Senotainia tricuspis (Meigen) 三尖賽麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1560; Zhang, 1980:214)

Miltogramma tricuspis Meigen, 1838:234.
=*Miltogramma puncticornis* Zetterstedt, 1859:
=*Myiapis angellozi* Séguy, 1929:
=*Senotainia borealis* Rohdendorf, 1935:
別 名：*三斑賽蜂麻蠅*。
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯、歐洲(西班牙)、北非。

Senotainia (s. str.) **turkmenica** Rohdendorf 土庫曼賽蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1560; Zhang, 1988:166)

Senotainia (s. str.) *turkmenica* Rohdendorf, 1935:89.
寄 主：
分 佈：內蒙古；土庫曼斯坦。

Servaisia cothurnata (Hsue) 靴錨折麻蠅 (Fan, 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1579)

Blaesoxipha (*Servaisia*) *cothurnata* Hsue, 1978:185.
寄 主：
分 佈：山西、河北、遼寧。

Servaisia erythrura (Meigen) 寬陽折麻蠅 (Fan, 1992:635)

Sarcophaga erythrura Meigen, 1806:30.

寄 主：*Chorthippus apricarius* Linnaeus 雛蝗
Chorthippus biguttulus Linnaeus 蝗
Chorthippus longicornis Latr. 蝗
Omocestus viridulus Linnaeus 牧草蝗
Chrysochraon dispar Germ. 蝗。
分 佈：山西、新疆、內蒙古、遼寧；蒙古、蘇聯、歐洲。

Servaisia jakovlevi Rohdendorf 膨端折麻蠅 (Fan, 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1581)
Servaisia jakovlevi Rohdendorf, 1937:79.
寄 主：
分 佈：東北西部；蒙古、西伯利亞東部。

Servaisia mixta (Rohdendorf) 虎齒折麻蠅 (Fan, 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1581)
Blaesoxipha mixta Rohdendorf, 1928:42.
寄 主：
分 佈：遼寧；蘇聯。

Servaisia nigridorsalis (Chao et Zhang) 黑背鏎折麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1581)
Blaesoxipha (*Servaisia*) *nigridorsalis* Chao et Zhang, 1988:76.
寄 主：
分 佈：新疆。

Servaisia rossica (Villeneuve) 毛股鏎折麻蠅 (Fan, 1992:635; Xue et al., 1996, 2:1581)
Blaesoxipha rossica Villeneuve, 1911:611.
寄 主：*Gomphocerus sibiricus* (Linnaeus) 西伯利亞大足蝗(成蟲)。
分 佈：山西、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；蒙古、俄羅斯、歐洲。

Servaisia silantjevi (Rohdendorf) 寬陽鏎折麻蠅 (Xue et al., 11996, 2:1581)
Blaessoxipha (*Servaisia*) *silantjevi* Rohdendorf, 1937:80.
=*Sarcophaga erythrura* Meigen, 1826:
=*Sarcophaga lusatica* Kramer, 1905:
=*Blaesixipha croatica* Baranov, 1942:
寄 主：*Chorthippus apricarius* Linnaeus 蝗
Chorthippus biguttulus Linnaeus 蝗
Chorthippus longicornis Latr. 蝗
Omocesttus viridulus Linnaeus 牧草蝗
Chrysochraon disper Germ. 蝗若蟲。
分 佈：山西、新疆、內蒙古、遼寧；蒙古、俄羅斯、歐洲。

Servaisia subamericana (Rohdendorf) 鈎陽折麻蠅 (Fan, 1992:635; Xue et al., 1996, 2:1581)
Blaesoxipha (*Servaisia*) *subamericana* Rohdendorf, 1932:183.
=*Blaesoxipha* (*Servaisia*) *potanini*, Rohdendorf, 1937: (nec 1928)
寄 主：*Eirenephilus longipennis* (Shiraki) 蝗、長翅燕蝗(斑腿蝗科 Catantopidae)

分 佈：山西、新疆；蒙古、俄羅斯(遠東、西伯利亞)、哈薩克斯坦、格魯吉亞、美國。

Setulia grisea Meigen 灰賽突麻蠅 (Zhang, 1980:214)

寄 主：

分 佈：內蒙古。

Sinonipponia concreata (Séguy) 剛刺麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1655)

Sarcophaga concreata Séguy, 1934:27.

寄 主：

分 佈：臺灣、上海(徐家匯)；尼泊爾。

Sinonipponia hainanensis (Ho) 海南刺麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1655)

Sarcophaga hainanensis Ho, 1936:210.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、海南、雲南。

Sinonipponia hervebazini (Séguy) 立刺麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1655; Zhang et Fan, 1992:611; Zhang et Zhao, 1992:1173)

Sarcophaga hervebazini Séguy, 1934:26.

=*Sarcophaga erecta* Ho, 1934:

寄 主：

分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、甘肅、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯。

Sinonipponia musashinensis (Kano et Okazaki) 武藏野刺麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1655)

Sarcophaga musashinensis Kano et Okazaki. 1956:77-79.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本(東京武藏野)。

Sphenometopia (Arabiopsis) altajica Rohdendorf 阿爾泰楔蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphenometopia (*Arabiopsis*) *altajica* Rohd., 1971:

寄 主：

分 佈：新疆；亞洲中部。

Sphenometopia czernyi Strobl 捷楔麻蠅 (Zhang, 1980:143)

寄 主：

分 佈：新疆。

Sphenometopia jacobsoni Rohdendorf 雅柯楔麻蠅 (Zhang, 1980:143; Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphenometopia jacobsoni Rohdendorf, 1967:

寄 主：

分 佈：新疆；塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Sphenometopia (A.) koulingiana (Séguy) 牯嶺楔蜂麻蠅 (Chao et Zhang, 1982:233; Zhang et Zhao, 1992:1178)

Sphenometopa (*A.*) *koulingiana* (Séguy, 1941:)

寄 主：

分 佈：江西、雲南、西藏(德母)、河南、山東、河北、北京、遼寧。

Sphenometopia kurventzovi Rohdendorf 庫氏楔蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphenometopia kurventzovi Rohd., 1967:

寄 主：

分 佈：新疆；亞洲北部及中部、歐洲中部及南部。

Sphenometopia luridimacula Chan et Zhang 淡斑楔蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphenometopia luridimacula Chan et Zhang, 1988:

寄 主：

分 佈：新疆。

Sphenometopia mesomelaenae Chao et Zhang 黑條楔蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1178)

Sphenometopa mesomelaenae Chao et Zhang, 1988:

寄 主：

分 佈：四川。

Sphenometopia mongolia (Fan) 蒙古楔蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:249)

Sphenometopia mongolia (Fan, 1965:)

寄 主：

分 佈：北京、新疆、內蒙古。

Stomorhina lunata (Fabricius) 月紋口鼻蠅 (Fan, 1992:558)

Musca lunata Fabricius, 1805:292.

寄 主：蝗科卵塊中。

分 佈：臺灣、雲南、西藏；寮國、馬來西亞、印度、尼泊爾、巴基斯坦、古北區、非洲區

Synorbitomyia linearis (Villeneuve) 臺灣合眶蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1547)

Hoplocephala linearis Villeneuve, 1929:61.

寄 主：幼蟲胎生。

分 佈：臺灣；琉球群島。

Takanoa hakusana (Hori) 斜鉤蜎麻蠅 (Hsue, 1980:191; Xue et al., 1996, 2:1655)

Sarcophaga hakusana Hori, 1954:49.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林；朝鮮、日本。

Taxigramma (Paragusia) elegantulum Zetterstedt 華麗聚蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1548)

Tachina elegantula Zetterstedt, 1844:1024.

=*Paragusia frivaldzkii* Schiner, 1862:
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯、土耳其、伊朗、歐洲(瑞典)。

Taxigramma (s. str.) **heteoneurum** (Meigen) 異聚蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1548; Zhang, 1980:214)
Miltogramma heteroneura Meigen, 1830:367.
=*Taxigramma pipiens* Perris, 1852:
=*Elpigia pellucida* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Elpigia punctata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Elpigia minuta* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯、印度、阿富汗、伊朗、歐洲(瑞典)、北非、北美洲。

Taxigramma karakumicum Rohdendorf 開拉聚麻蠅 (Zhang, 1980:214)
寄 主：
分 佈：新疆。

Taxigramma (Eutaxigramma) multipunctatum Rondani 多斑聚蜂麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1548; Zhang, 1988:166)
Heteropterina multipunctata Rondani, 1859:211.
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯、伊朗、埃及、波斯北部、土爾其斯坦、歐洲南部(意大利)。

Thereomyia yunnanica Chao et Zhang 雲南斑盾蜂麻蠅 (Zhang et Zhao, 1992:1177)
Thereomyia yunnanica Chao et Zhang, 1988:
寄 主：
分 佈：雲南。

Tricholioproctia antilope (Bött.) 羚足鬃麻蠅 (Zhang et Fan, 1992:610)
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、海南、雲南、四川、浙江、遼寧、黑龍江；蘇聯、日本、印度、錫金、印尼、所羅門群島。

Tuberomembrana xizangensis Fan 西藏疣麻蠅 (Fan, 1981:314; Wu, 1988:575; Xue et al., 1996, 2:1656)
Tuberomembrana xizangensis Fan, 1981:314-315.
寄 主：
分 佈：西藏(林芝朗縣)。

Wohlfahrtia atra Aldrich 黑污麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1565; Zhang et Zhao, 1992:1174)
Wohlfahrtia atra Aldrich, 1926:10-11.
寄 主：
分 佈：四川、青海。

Wohlfahrtia balassogloi (Portschinsky) 巴彥污蠅 (ASZI, 1987, 2:677; Fan, 1992:622; Xue et al., 1996, 2:1565)

Sarcophila balassogloi Portschinsky, 1882:142.

寄 主：*Locusta migratoria migratoria* Linnaeus 亞洲飛蝗

Calliptamus italicus italicus (Linnaeus) 意大利蝗。

分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯(西伯利亞、亞洲中部、外高加索、歐洲部分南部)、印度西北部、伊朗。

Wohlfahrtia bella (Macq.) 毛足污麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1565; Zhang et Zhao, 1996:247)

Agria bella Macq., 1839:113.

=*Agria argentea* Macquart *in* Webb et Berthelot, 1839:

=*Sarcophaga tetrippunctata* Dufour, 1850:

=*Sarcophaga maxima* Portschinsky, 1875:

=*Theeria persica* Bigot, 1880:

=*Sarcophaga hispanica* Strobl, 1906:

寄 主：

分 佈：西藏、青海、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯(西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲部南部)、阿富汗、伊朗、地中海、亞洲西南、西班牙、葡萄牙(馬德拉群島)、法國、蘇丹、乍得、毛里塔尼亞。

Wohlfahrtia brevicornis Chao et Zhang 短角污麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:248)

Wohlfahrtia brevicornis Chao et Zhang, 1996:

寄 主：

分 佈：青海。

Wohlfahrtia cheni Rohdendrof 陳氏污蠅 (Xur et al., 1996, 2:1567)

Wohlfahrtia cheni Rohdendrof, 1956:215.

寄 主：

分 佈：甘肅、新疆、內蒙古；蒙古(北戈壁)、東西伯利亞、吉爾吉斯斯坦。

Wohlfahrtia fedtschenkoi Rohdendorf 阿拉善污麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:248)

Wohlfahrtia fedtschenkoi Rohdedndorf, 1956:222.

寄 主：

分 佈：甘肅、新疆、內蒙古；土庫曼斯坦、哈薩克斯坦。

Wohlfahrtia hirtiparafacialis Chao et Zhang 毛顏污麻蠅 (Zhang et Zhao, 1996:248)

Wohlfahrtia hirtiparafacialis Chao et Zhang, 1996:

寄 主：

分 佈：青海。

Wohlfahrtia intermedia (Portschinsky) 介污蠅 (Xue et al., 1996, 2:1567)

Sarcophila intermedia Portschinsky, 1887:16.

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古；蘇聯(西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲部分南部)

Wohlfahrtia magnifica (Schiner) 黑鬚污麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1567; Zhang et Zhao, 1996:247)

Sarcophila magnifica Schiner, 1862:567.
=*Sarcophila wohlfahrti* Portschinsky, 1875:
寄 主：幼蟲寄生在牛、山羊、綿羊、駱駝、馬、騾等牲畜體，貓、犬、刺猬以及一些鳥類，有時人也受到危害。在內蒙古和西北草上，牛、綿羊、山羊和駱駝受害相當普遍。
分 佈：北京、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；蒙古、蘇聯(西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲部分中部和南部)、歐洲中部和南部(奧地利)、北非。

Wholfahrtia meigeni (Schiner) 亞西污蠅 (Xue et al., 1996, 2:1567)

Sarcophila meigeni Schiner, 1862:567.
=*Sarcopphaga ruralis* Meigen, 1826:
=*Agria hungarica* Brauer et Bergenstamm, 1889 :
寄 主：
分 佈：內蒙古、黑龍江；蘇聯(遠東、西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲部分)、歐洲(奧地利)、美國(西北部)。

Wholfahrtia pavlovskyi Rohdendorf 鈍葉污蠅 (Xue et al., 1996, 2:1567)

Wholfahrtia pavlovskyi Rohdendorf, 1956:212.
寄 主：
分 佈：青海、內蒙古；蒙古、西伯利亞、吉爾吉斯斯坦。

Wohlfahrtia stackelbergi Rohdendorf 斯氏污麻蠅 (Xue et al., 1996, 2:1568; Zhang et Zhao, 1996:248)

Wohlfahrtia stackelbergi Rohd., 1956:
寄 主：
分 佈：新疆；東帕米爾。

Wohlfahrtioides mongolicus Chao et Zhang 斯氏污蠅 (Xue et al., 1996, 2:1568)

寄 主：
分 佈：內蒙古(潮格旗狼山)。

Tachinidae 寄蠅科

(Chen, 1989:105-116; Liang, 1991:171-174; Liu et Zhao et al., 1998: xii+1-378; Wu et al., 1989:159-163; Zhao, 1964, 13(6):877-884; 1985, (1):25-34; Zhao et Liang, 1984: Zhao et Shi, 1980, 17(3):132-134; 1982, (2):16-19)

Acemyia rufitibia (von Roseer) 紅脛角刺寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:258; Liu et Zhao et al., 1998:48; Xue et al., 1996, 1:1756; Zhao et Zhou, 1992:1288)

Tachina rufitibia von Roseer, 1840:57.
=*Agculocera cinerea* Mik., 1866:308.
=*Acentua abguistina* Brauerr et Bergenstamm, 1891:308.
=*Acemyia csikii* Kertész, *In* Horvath, 1901:198.
寄 主：
分 佈：西藏(察雅、江達)、山西；薩哈林、西伯利亞、外高加索、瑞士、德國、意大利南部。

Actia crassicornis (Meigen) 黑角阿克寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:290; Xue et al., 1996, 2:2049)

Tachina crassicornis Meigen, 1824:351.
=*Thryptocera bicolor* Maequart, 1834:312.
=*Thryptocera flavipalpis* Macquart, 1848:135.
=*Thryptocera nigripalpis* Robineau-Desvoidy, 1851:182.
=*Thryptocera claripennis* Robineau-Desvoidy, 1863:716.
=*Thryptocera scutellaris* Rondani, 1865:195.
寄 主：
分 佈：山西、北京、吉林；蒙古、西伯利亞、外高加索、意大利、法國、英國、瑞士。

Actia exoleta Meigen 埃阿克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2052)

Actia exoleta Meigen, 1824:353.
寄 主：
分 佈：山西；法國。

Actia jocularis Mesnil 長頰阿克寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:292; Xue et al., 1996, 2:2049)

Actia jocularis Mesnil, 1957:47.
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣東、浙江、山西；日本。

Actia nigroscutellata Lundbeck 黑盾阿克寄蠅 (ASZI, 1987, 2:678; ASZI et al., 1978:211; Chao et Liang, 1984:52; Chao et Shi, 1981(3):51; Fan, 1992:723; He et al., 1991:64; Shi, 1981(4):33; Xie, 1993:21; Xue et al., 1996, 2:2052; Zhang, 1987[ed.] 2:70)

Actia nigroscutellata Lundbeck, 1827:462.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
國外：*Elachista megerleella* Staint
Evetria resinilla Linnaeus 紅松卷葉蛾
Loaspyresie cosmophorana Tr.
Loaspyresie servillana Dup.
Olethreutes dalecarliana Guen.
Olethreutes rosemaculana Herr.-Sch.
Semasia ustomaculana Gurtis
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江；聖彼得堡、歐洲北部(英國除外)、丹麥、瑞典。

Actia nudibasis Stein 黃角阿克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2052)

Actia nudibasis Stein, 1924:135.
寄 主：落葉松捲蛾
赤松梢斑螟。
分 佈：黑龍江；日本、庫頁島、西伯利亞、聖彼得堡、歐洲英國、瑞典。

Actia pilipennis (Fallén) 短顏阿克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2052)

Tachina pilipennis Fallén, 1810:273.

寄 主：據記載：櫟綠捲葉蛾

Tortrix pronubana

Tortrix bergmanniana

乳黃捲葉蛾

Ancyllis mitterbacheriana

Ancyllis tineana

Olethreutes schulziana

葡萄長鬚捲葉蛾

Acalla logiana

Acalla hastiana

Acalla adspersana

Capua aangustiorana

Eucosma sordidana

Platyptilia rhoddodactyla

分 佈：北京、黑龍江；日本、蒙古、西伯利亞、法國、英格蘭、瑞典。

Actia silacea Meigen 黃色毛脈寄蠅 (Chao, 1962:38)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

國外：*Erastria fasciana* 夜蛾

分 佈：華北、東北。

Actinochaetopteryx japonica Mesnil 日本棘翅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2148)

Actinochaetopteryx japonica Mesnil, 1970:117.

寄 主：

分 佈：臺灣；日本。

Admontia blanda (Fallén) 裸額毛顏寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:52; Xue et al., 1996, 2:1740; Zhao et Zhou, 1992:1280)

Tachina blanda Fallén, 1820:15.

=*Tachina pulchella* Meigen, 1824:106.

別 名：*柔毛頻寄蠅*。

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、山西、青海、新疆、吉林、黑龍江；蒙古、庫頁島、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、蘇格蘭、斯堪的納維亞半島。

Admontia cepelaki (Mesnil) 黑色毛額寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1740; Zhao et Zhou, 1992:1280)

Trichoparia cepelaki Mesnil, 1961:674.

寄 主：

分 佈：四川、新疆；蒙古、西伯利亞、法國、奧地利。

Admontia continuans Strobl 亮黑毛顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1740)

Admontia continuans Strobl, 1909:137.

寄 主：

分 佈：吉林、黑龍江；法國、奧地利。

Admontia gracilipes (Mesnil) 長角毛顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1740; Zhao et Zhou, 1992:1280)
Trichoparia gracilipes Mesnil, 1990:101.
寄 主：
分 佈：雲南、四川；緬甸。

Admontia grandicornis (Zetterstedt) 巨角毛顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1740; Zhao et Zhou, 1992:1280)
Tachina grandicornis Zetterstedt, 1849:3237.
寄 主：
分 佈：雲南；西伯利亞、歐洲北部達斯堪納維亞半島、英國、阿爾卑斯山。

Alloprosopaea algerica Mesnil 阿爾及利亞阿洛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1708)
Alloprosopaea algerica Mesnil, 1961:657.
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、亞洲中部。

Alsomyia olfaciens (Pandellé) 歐亞爾索寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:188)
Exorista olfaciens Pandellé, 1896:20.
寄 主：櫟斜紋夜蛾。
分 佈：江蘇、山西；法國。

Amelibaea tultshensis Brauer et Bergenstamm 圖爾恰阿梅寄蠅 (Zhao et Zhou, 1996:255)
Amelibaea tultshensis Brauer et Bergenstamm, 1891:319.
寄 主：
分 佈：新疆；以色列、捷克、意大利。

Anaeudora apicalis (Matsumura) 密毛安寄蠅 (Hun., 1992:1197; Sun et al., 1992:635; Zhao et Zhou, 1992:1317)
Anaeudora apicalis (Matsumura, 1916:)
別 名：*棒鬚安寄蠅*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、陝西；印尼、印度。

Anaeudora japonica (Baranov) 日本安寄蠅 (Zhao et Zhou, 1992:1317)
Anaeudora japonica (Baranov, 1935:)
寄 主：
分 佈：福建、雲南、四川、陝西、遼寧、吉林；日本、蘇聯(遠東)。

Anaeudora patellipalpis Mesnil 棘須安寄蠅 (Hun., 1992:1197; Sun et al., 1992:635; Zhao et Zhou, 1992: 1317)
Anaeudora patellipalpis Mesnil, 1953:
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、陝西；蘇聯(遠東)、馬來西亞、泰國、緬甸。

Anaeudora sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:70)

寄 主：稻苞蟲。

分 佈：江西。

Anthomyiopsis plagioderae Mesnil 柳藍葉甲花寄蠅 (ASZI, 1987, 2:679; Xue et al., 1996, 2:2038)

Anthomyiopsis plagioderae Mesnil, 1972:1109.

寄 主：*Plagiodera versicolora* Laie 柳藍葉甲。

分 佈：江蘇、山東；意大利、德國。

Aphria longilingua Rondani 長舌埃蜉寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:304)

Aphria longilingua Rondani, 11861:58.

寄 主：

分 佈：山西；蒙古、日本、俄羅斯濱海、西伯利亞、外高加索、法國、瑞士。

Aphria longirostris (Meigen) 長喙埃蜉寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2092)

Tachina longirostris Meigen, 1824:315.

寄 主：

分 佈：內蒙古；日本、蒙古、西伯利亞、外高加索、意大利、德國。

Aphria potans (Wiedemann) 坡坦埃蜉寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:305; Xue et al., 1996, 2:2092)

Tachina potans Wiedemann, 1830:299.

=*Aphria klappeerichi* Mesnil, 1967:49.

寄 主：

分 佈：福建、江蘇、山西、北京、遼寧、吉林、黑龍江。

Aphria xyphias Pandellé 亮埃蜉寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:306; Xue et al., 1996, 2:2092)

Aphria xyphias Pandellé, 1896:68.

寄 主：

分 佈：山西、內蒙古；蒙古、西伯利亞、外高加索、法國、奧地利。

Aplomyia confinis (Fallén) 毛短尾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:679; Chao et Liang, 1984:140; Chao et Zhang, 1982: 275; Fan, 1992:783; Liu, Zhao et al., 1998:191; Shi, 1981(4):39; Xue et al., 1996, 2:1876; Yunn., 1987:1247)

Tachina confinis Fallén, 1820:32.

=*Phryxe zonata* Robineau-Desvoidy, 1830:159.

=*Phryxe servillei* Robineau-Desvoidy, 1830:159.

=*Aplomyia nitens* Robineau-Desvoidy, 1830:185.

=*Tachina bicingulata* Zetterstedt, 1844:1133.

=*Exorista aenescans* Macquart, 1849:490.

=*Exorista longicornis* Macquart, 1849:411.

=*Exorista longicornis* Perries, 1952:

=*Tachina bizonata* Zetterstedt, 1859:6119.

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟

Lycaena sp. 灰蝶。

國外： *Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶

Callophrys rubi Linnaeus 灰蝶
Cyanis argiolus Linnaeus
Lycaena corydon Poda
Lycaena bellargus Rott.
Rhyparia purpurata Linnaeus
Tephroclystia sp.
Thecla ilicis Esp.
Thecla w-album Kn.
Zephyrus quercus Linnaeus

分 佈：雲南、西藏(樟木、察雅、昌都)、四川、陝西、山西、北京、青海、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、日本、千島、西伯利亞南部、中亞、外高加索、列寧格勒、聖彼得堡、以色列、非洲、歐洲加那利群島、法國、北達英格蘭、瑞典、菲律賓、爪哇。

Aplomyia distincta Baranov (Xue et al., 1996, 2:1876)
Aplomyia distincta Baranov
寄 主：
分 佈：臺灣、海南。

Aplomyia laeviventris Wulp 裸短尾寄蠅 (Yunn., 1987:1246)
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、江蘇、上海；菲律賓、印尼、非洲。

Aplomyia latimana Villeeneuve 寬跗短尾寄蠅 (Sun et al., 1992:633)
寄 主：
分 佈：貴州；非洲。

Aplomyia metallica (Wiedemann) 金光短尾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:275; Hun., 1992:1175; Sun et al., 1992:633; Xue et al., 1996, 2:1876; Zhao et Zhou, 1992:1303)
Tachina metallica Wiedemann, 1824:46.
=*Tachina nigriventris* Wiedemann, 1824:
=*Tachina notata* Wiedemann, 1930:
=*Tachina socia* Wiedemann, 1930:
=*Parexorista laeviventris* Wulp, 1893:
=*Tricholyga impexa* Villeneuve, 1916:
別 名：*裸短尾寄蠅*。
寄 主：*Hemithea costipunctata* Moore 橡膠花尺蠖。
據記載：灰蝶科(Lycanidae) *Euchryso* sp.
Hemithea costipunctata
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(樟木)、四川、江蘇、上海；日本、菲律賓、印尼、巴布亞新幾內亞、印度、阿拉伯、以色列、非洲。

Aplomyia seyrigi Nesnil 紅盾短尾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1878)

Aplomyia seyrigi Nesnil, *in* Lindner, 1954:330.

寄 主：

分 佈：廣東、海南、廣西；馬達加斯加。

Appendicia mira Zimin 褐斑贅脈寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:246; Xue et al., 1996, 2:2069)

Appendicia mira Zimin, 1957:530.

寄 主：

分 佈：西藏(聶拉木)、吉林。

Appendicia truncata (Zetterstedt) 長贅脈寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2069)

Tachina truncata Zetterstedt, 1838:642.

寄 主：

分 佈：河北；蘇聯、英國、德國、瑞典。

Argyrophylax nigrotibialis Baranoff 黑脛銀寄蠅 (ASZI, 1987, 2:680; Chao et Liang, 1984:93; Chou et al., 1994:328; Fan, 1992:751; He et al., 1991:64)

Argyrophylax nigrotibialis Baranoff, 1935:552.

=*Argyrophylax simulator* Mesnil, 1953:

寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲

Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶。

分 佈：臺灣、廣東、廣西；日本、馬來西亞、印度、尼泊爾。

Argyrophylax phoeda Townsend 黃脛銀寄蠅 (Chao et Liang, 1984:93; Fan, 1992:751; He et al., 1991:64; Hun., 1992:1190; Sun et al., 1992:633; Zhang, 1987[ed.] 2:70)

Argyrophylax phoeda Townsend, 1927:63.

寄 主：*Parnara guttata* Bremer et Grey 稻苞蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江、安徽、陝西；馬來西亞、印度、印尼。

Arrhinomyia innoxia Meigen 短頰粗芒寄蠅 (Yunn., 1987:1206)

寄 主：鞘翅目。

分 佈：雲南、新疆、內蒙古；蘇聯、中歐、法國、意大利、瑞士、英國。

Athrycia curvinervis (Zetterstedt) 曲脈短芒寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:334; Xue et al., 1996, 2:2131; Zhao et Zhou, 1992:1337; 1996:264)

Tachina curvinervis Zetterstedt, 1844:1018.

=*Tachina ruficornis* Zetterstedt, 1844:1019.

寄 主：據載：*Mamestra contigua* Vill.

Mamestra persicariae Linnaeus

分 佈：西藏、四川、山西、新疆；西伯利亞、日本、聖彼得堡、歐羅巴島(印度洋)、英格蘭、瑞典。

Athrycia impressa (Wulp) 伊姆短芒寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2131; Zhao et Zhou, 1992:1336)

Plagia impressa Wulp, 1869:139.

寄 主：據記載：*Anarta myrtilli* Linnaeus
Rhyparia purpurata Linnaeus 黃燈蛾
分 佈：四川、北京、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯、歐洲。

Athrycia trepida (Meigen) 黃鬚短芒寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:333; Xue et al., 1996, 2:2131; Zhao et Zhou, 1992:1337)
Tachina trepida Meigen, 1824:300.
=*Athrycia erythrocera* Robineau-Desvoidy, 1830:111.
=*Tachina ssubcincta* Zetterstedt, 1844:1028.
=*Athrycia flavipalpis* Robineau-Desvoidy, 1863:832.
=*Athrycia vulgaris* Robineau-Desvoidy, 1863:834.
=*Blepharigena rufipalpis* Rondani, 1865:211.
寄 主：據記載：*Agrotis c-nigrum* Linnaeus
Epineeuronia popularis Fabricius
Orthosia helvola Linnaeus
Taeniocampa miniosa Fabricius
Taeniocampa incerta Hufn.
Taeniocampa gracilis Fabricius
分 佈：西藏、山西、黑龍江；蒙古、日本、蘇聯、英國、北歐。

Athrycia trepida flavipalpis Robineau-Ddesvoidy 黃鬚短芒寄蠅 (Chao et Shi, 1982:237)
寄 主：
分 佈：西藏(芒康、貢覺)；歐洲。

Atractocerops parvus (Aldrich) 小黑尾寄蠅 (Yunn., 1987:1240)
寄 主：
分 佈：雲南。

Aulacephala hervei Bequaert 赫氏狂寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1954)
Aulacephala hervei Bequaert, 1922:305.
寄 主：
分 佈：上海、北京；日本。

Austrophorocera grandis (Macquart) 大型奧蜉寄蠅 (Hun., 1992:1167; Liu, Zhao et al., 1998:104; Sun et al, 1992:621; Xue et al., 1996, 2:1697; Zhao et Zhou, 1992:1278)
Phorocera grandis Macquart, 1851:171.
=*Phorocera magna* Baranov, 1934:46.
=*Phorocera maxima* Baranov, 1936:105.
寄 主：刺蛾科昆蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、河南、山東、山西、遼寧；越南、寮國、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Austrophorocera hirsuta (Mesnil) 毛瓣奧蜉寄蠅 (Fan, 1992:735; Hun., 1992:1167; Liu, Zhao et al., 1998:105; Sun et al., 1992:621; Xue et al., 1996, 2:1699; Zhao et Zhou, 1992:1278)
Spoggosia hirsuta Mesnil, 1946:65.

寄 主：*Gastropacha populifolia* Esper　白楊枯葉蛾
Malacosoma neustria testacea Linnaeus　黃褐天幕毛蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、山東、山西、河北、遼寧；越南。

Bactromyia aurulenta (Meigen) 金色小寄蠅 (ASZI, 1987, 2:680; ASZI et al., 1978:207; Chao et Zhang, 1982:272; Fan, 1992:7776; Shi, 1981(4):35; Tian et al., 1993, 15(4):156; Xue et al., 1996, 2:1886; Zhao et Liang, 1984:128)
Tachina aurulenta Meigen, 1824:411.
=*Meigeniopsis dubiosa* Brauer et Bergenstamm, 1893:
別 名：*金光小寄蠅，金黃小寄蠅*。
寄 主：*Hyponomeuta malinella* Zeller　蘋果巢蛾
Clostera anastomosis Linnaeus　分月扇舟蛾(幼蟲、蛹)
苜蓿夜蛾。
國外：*Abrostola triplasia*　隱金夜蛾(蕁麻褐夜蛾)
Collix sparsata Tr.
Drepana cultraria Fabricius
Drepana falcataria
Hylophila prasinana
Libythea celtis
Mamestra pisi
Notodonta trepida
Pygaera anachoreta
Scolipteryx libatrix　棘翅夜蛾
Smerinthus populi
Taeniocampa gracilis
Tephroclystia actaeata Wald.
Thecla w-album
Vanessa levana
分 佈：西藏(吉隆)、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、庫頁島、外高加索、聖彼得堡、英國、瑞典。

Bactromyia sp. 天牛小寄蠅 (Chen et al., 1999, 15(3):122)
寄 主：*Bacchisa atritaris* (Pic)　茶紅頸天牛。
分 佈：湖南。

Baumhaueria goniaeformis (Meigen) 天幕毛蟲抱寄蠅 (ASZI, 1987, 2:681; ASZI et al., 1978:207; Chao et Liang, 1984:146; Fan, 1992:787; Hu et Li, 1977:163-169; Shi, 1981(4):36, 38; Xue et al., 1996, 2:1935)
Tachina goniaeformis Meigen, 1824:416.
=*Musca angusticornis* Ratzeburg, 1844:
=*Tachina nepia* Walker, 1849:
=*Baumhaueria cuculliae* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Baumhaueria saturniae* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Baumhaueria rectinervis* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：*Lymantria diapar* Linnaeus　舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus　天幕毛蟲

Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐天幕毛蟲
Cephalcia abietes Linnaeus 雲杉卷葉鋸蜂。
國外：*Cucullia scrophulariae* Cap.
Eriogaster lanestris Linnaeus 絨毛枯葉蛾
Saturnia pyri Schiff. 大天蠶蛾
分 佈：內蒙古、遼寧；外高加索、以色列、法國、比利時、德國、丹麥、瑞典。

Bessa fugax Randani 拂盆地寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:258)
寄 主：記載有：*Acalla cristata*
Acalla ferrugana
Ancylis mitterbacheriana
Asthenia pygmaeana
Boarmia punctularia
Cacoecia murinana
Cacoecia rosana
Clysia ambiguella
Cymatophora or
Deilinia pusaria
Depressaria applana
Hyponomeuta cognatella
Hyponomeuta evenymella
Hyponomeuta malinella
Hyponomeuta padella
Lymantria monacha
Minoa murinata
Ocneria detrita
Olethreutes sauciana
Opisthograptis luteolata
Pygaera pigra
Salebria marmorata
Semasia diniana
Semasia rufimitrana
Sparganothis pilleriana
Tortrix viridana
分 佈：西藏(察雅)；歐洲。

Bessa parallela (Meigen) 選擇盆地寄蠅 (Chao et Liang, 1984:55; Fan, 1992:725; Hun., 1992:1168; Liu, Zhao et al., 1998:110; Shi, 1981(4):33, 37; Sun et al., 1992:621; Xue et al., 1996, 2:1706; Zhao et Zhou, 1992:1179)
Tachina parallela Meigen, 1824:377.
=*Elophoria flaviquamis* Robineau-Desvoidy, 1830:157.
=*Bessa selecta fugax* Rondani, 1861 of Mesnil, 1860:
=*Frontina fugax* Rondani, 1861:40.
=*Hubertia elegans* Robineau-Desvoidy, 1863:169.
=*Thalpia mera* Robineau-Desvoidy, 1863:170.
=*Thalpia caesia* Robineau-Desvoidy, 1863:171.
=*Thalpia humilis* Robineau-Desvoidy, 1863:171.

寄　主：*Mythimna separata* Walker　粘蟲(四川)

Naxa seriaria Motschulsky　女貞尺蠖(丁香尺蠖)(北京百花山)

Ocneria furva Leech　側柏毒蛾

Zeiraphera diniana Guenée　松線小捲蛾

Pristiphora erichsonii (Hartig)　落葉松葉蜂

Pristiphora conjugata Dahlbom　楊黑點葉蜂。

國外：寄生巢蛾、卷蛾、螟蛾等科害蟲。

Acalla cristtana Fabricius　桑斜紋卷葉蛾

Acalla ferrugana Tr.　樺梢卷葉蛾

Ancylis mitterbacheriana Schiff.

Asthenia pygmaeana Hühn.

Boarmia punctularia Hübn.

Cacoecia murinana Hühn.

Cacoecia rosana Linnaeus　薔薇卷葉蛾

Capua reticulana Hühn.　桑斜紋卷葉蛾

Cilix galuceta Sc.

Clysia ambiguella Hühn.　葡萄果蠹蛾

Cymatophora or Fabricius

Deilinia pusaria Linnaeus

Depressaria applana Fabricius

Hyponomeuta cognatella Hühn.　衛矛巢蛾

Hyponomeuta evonymella Linnaeus　稠李巢蛾

Hyponomeuta malinella Linnaeus　蘋巢蛾

Hyponomella padella Linnaeus　蘋果巢蛾

Lymantria monacha Linnaeus　模舞毒蛾(僧尼舞毒蛾)

Minoa murinata Sc.

Ocneria detrita Linnaeus　小舞毒蛾

Olethreutes sauciana Hühn.

Opisthograptis luteolata Linnaeus

Psecadia decemgutella Hübn.

Pygaera pigra Hübn.

Salebria marmorata Alph.　雲紋螟

Semasia diniana Gn.

Semasia rufimitrana H. S.

Sparganothis pilleriana Schiff.　葡萄長須捲葉蛾

Tortrix viridana Linnaeus　櫟綠捲葉蛾

醋栗黃葉蜂

醋栗白足葉蜂

薔薇櫛角葉蜂

榿木蠟葉蜂

分 佈：湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山西、河北、北京、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、俄羅斯、西伯利亞、外高加索、法國、意大利、德國、英格蘭、蘇格蘭。

Bessa remota (Aldrich) 黃鬚盆地寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1708)

Ptychomyia remota Aldrich, 1925:13.

寄 主：

分 佈：臺灣、浙江；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、斐濟(引進立足)。

Bessa selecta Meigen 選擇盆地寄蠅 (Chao, 1962:40)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

國外：See *B. selecta fugax* Rondani

分 佈：西南、東北。

Bessa selecta fugax Rondani 選擇盆地寄蠅 (ASZI, 2:681; ASZI, et al., 1978:216; He et al., 1991:64; Yunn., 1987:1203)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

Naxa seriaria 女貞尺蠖(丁香尺蠖)。

國外：

Acalla cristana Fabricius

Acalla ferrugana Tr. 樺梢卷葉蛾

Ancylis mitterbacheriana Schiff.

Asthenia pygmaeana Hübn.

Boarmia punctularia Hübn.

Cacoecia murinana Hübn.

Cacoecia rosana Linnaeus 薔薇卷葉蛾

Capua reticulana Hübn. 桑斜紋卷葉蛾

Cilix glauceta Sc.

Clysia ambiguella Hübn. 葡萄果蠹蛾

Cymatophora or Fabricius

Deilinia pusaria Linnaeus

Depressaria applana Fabricius

Dineura stilata

Empria candidata

Empria pulverata

Hemichroa crocea

Hyponomeuta cognatella Hübner 衛矛巢蛾

Hyponomeuta evonymella Linnaeus 稠李巢蛾

Hyponomeuta malinella Linnaeus 蘋果巢蛾

Hyponomeuta padella Linnaeus 食果巢蛾

Lymantria monacha Linnaeus 模毒蛾

Minoa murinata Sc.

Monardis plana

Nematinus luteus

Ocneria detrita Linnaeus 小舞毒蛾
Olethreutes sauciana Hübn.
Opisthograptis luteolata Linnaeus
Platycampus luridiventris
Pristiphora abbreviata
Pristiphora abietina
Pristiphora alnivora
Pristiphora erichsomi
Pristiphora geniculata
Pristiphora laricis
Pristiphora moesta
Pristiphora testacea
Pristiphora wesmaeli
稠李葉蜂
青楊毛葉蜂
Psecadia decemgutella Hübn.
Pteronidea curtispina
Pteronidea myosotidis
Pteronidea pavida
Pteronidea salicis
Pygaera pigra Hübner
Salebria marmorata Alph. 雲紋螟
Semasia diniana Gn.
Semasia rufimitrana H. S.
Sparganothis pilleriana Schiff. 葡萄長須卷葉蛾
Tortrix viridana Linnaeus 櫟綠卷蛾
醋栗黃葉蜂
醋栗白足葉蜂
薔薇櫛角葉蜂
榿木蠟葉蜂

分 佈：廣西、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、亞洲、歐洲。

Biomeigenia auripollinosa Chao et Liu 黃粉突額寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:62; Liu et al., 1985:170; Xue et al., 1996. 2:1735)

Biomeigenia auripollinosa Chao et Liu, 1985:170-177..

寄 主：

分 佈：山西。

Biomeigenia flave Chao 黃足突額寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:63; Xue et al., 1996. 2:1735; Zhao et Zhou, 1992:1282)

Biomeigenia flave Chao, 1964:298.

寄 主：

分 佈：雲南、山西、遼寧。

Biomeigenia gynandromima Mesnil 黑足突額寄蠅 (Xue et al., 1996. 2:1735)

Biomeigenia gynandromima Mesnil, 1965:105.

寄 主：

分 佈：遼寧、吉林；俄羅斯(遠東地區)。

Bithia demotica (Egger) 德莫比西寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2089; Zhao et Zhou, 1996:264)

Tachina demotica Egger, 1861:211.

寄 主：

分 佈：新疆、西伯利亞(赤塔)、烏克蘭、捷克斯洛伐克、歐洲意大利、向北達瑞士、奧地利。

Bithia latigena (Herting) 寬額比西寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2089; Zhao et Zhou, 1996:264)

Tachina latigena Herting, 1968:59.

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞。

Blepharella lateralis Macquart 拉特睫寄蠅 (He et al., 1991:64; Xue et al., 1996, 2:1911; Yunn., 1987:1238)

Blepharella lateralis Macquart, 1851:177.

寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟

Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、西藏；越南、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、蘇羅門群島、澳洲。

Blepharella tenuparafacialis Chao et Shi 狹顏睫毛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:272; Chao et Zhou, 1988:522)

Blepharella tenuparafacialis Chao et Shi, 1982:272.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、西藏(墨脫)、河南。

Blepharipa albocincta Mesnil 白帶飾腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1901)

Blepharipa albocincta Mesnil, 1970:94.

寄 主：

分 佈：江西、雲南、上海；印度。

Blepharipa carbonata Mesnil 炭色飾腹寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:271)

寄 主：

分 佈：西藏(樟木)；日本。

Blepharipa chaetoparafacialis Chao 毛鬢飾腹寄蠅 (Chao, 1982:270; Chao et Zhou, 1988:521; 1997:1538; Hun., 1992:1193; Sun et al., 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1901; Yunn., 1987:1232; Zhao et Zhou, 1992:1291)

Blepharipa chaetoparafascialis Chao, 1982:270.

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲

Phalera assimilis Bremer et Grey 櫟掌舟蛾

分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、湖北、陝西。

Blepharipa fusiformis (Walker) 巨體飾腹寄蠅 (Yunn., 1987:1232)

Tachina fusiformis Walker, 1849:1161.

別 名：*暗黑飾腹寄蠅*。

寄 主：

分 佈：江西、雲南、四川、上海、山西、河北、北京、遼寧；緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

Blepharipa jacobsoni Townsend 雅科飾腹寄蠅 (Shi, 1995:537)

Blepharipa jacobsoni Townsend, 1927:

寄 主：

分 佈：江西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、山西、河北、北京、遼寧；蘇聯(遠東地區)、日本、緬甸、印度、尼泊爾。

Blepharipa latigena (Mesnil) 寬頰飾腹寄蠅 (Chao et Zhang, 1981:271; Xue et al., 1996, 2:11901)

Crossocosmia latigena Mesnil, 1970:92.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(樟木)、浙江；日本。

Blepharipa orbitalis (Townsend) 眼眶飾腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1901; Yunn, 1987:1232)

Sumatrosturmia orbitalis Townsend, 1927:70.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川；馬來西亞(沙巴)、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Blepharipa schineri (Mesnil) 梳脛飾腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:682; Chao et Liang, 1984:113; Chao et Zhou, 1997:1538; Fan, 1992:764; Liu et Yang, 1992:286; Shi, 1981(4):36; Shi, 1995:537; Xue et al., 1996, 2:1901)

Blepharipoda schineri Mesnil, 1939:32.

=*Masicera flavoscutellata* Zetterstedt, 1862:

寄 主：*Dendrolimus supurans* (Butler) 落葉松毛蟲

Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾

Lymantria viola Swinhoe 珊毒蛾(橄欖 *Canarium album* Raeusch)

Cephalcia abietes Linnaeus 雲杉捲葉鋸蜂

分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、歐洲。

Blepharipa sugens (Wiedemann) 蘇金飾腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1901)

Tachina sugens Wiedemann, 1830:306.

=*Tachina cilipes* Macquart, 1843:

=*Massicera tenuisetosa* Macquart, 1848:

=*Nemoraea aamplificans* Walcer, 1859:

=*Eoparachaeta sturmioides* Townsend, 1927:

=*Eoparachaeta orientalis* Townsend, 1927:

寄 主：

分 佈：廣西；菲律賓、馬來西亞、爪哇、新幾內亞島。

Blepharipa tibialis (Chao) 柞蠶飾腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:682; Chao et Liang, 1984:113; Fan, 1992:765; Shi, 1981(4):38; Tsou et al., 1981:1-8; Xue et al., 1996, 2:1901)

Crossocosmia (*Hertingia*) *tibialis* Chao, 1963:38-39.

寄 主：*Antheraea pernyi* Guér 柞蠶(多寄生)
Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲(黃褐天幕毛蟲,梅毛蟲)
紅尾毒蛾。

分 佈：遼寧(鳳城)、吉林、黑龍江。

Blepharipa wainwrighti Baranov 萬氏飾腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1901)

Blepharipa wainwrighti Baranov, 1932:100.

寄 主：

分 佈：雲南；緬甸、印度。

Blepharipa zebina (Walker) 蠶飾腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:682; Chao et Liang, 1984:111; Chao et Zhang, 1982:270; Chao et Zhou, 1988:521; 1997:1538; Chen, 1989:113; Cheng, 1981, 8(1):24-25; Fan, 1992:763; Hun., 1992:1193; Liu, Zhao et al., 1998:207; Shi, 1981(4):36, 37; 1995:537; Sun et al., 1992:634; Tsai et al., 1979:49; Wang et Zhou, 1995, 17(4):147-152; Wu et al., 1989:160-161; Xue et al., 1996, 2:1902; Yunn., 1987: 1232; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhao et Zhou, 1992:1291)

Tachina zebina Walker, 1849:772.
=*Crossocosmia India* Brauer et Bergenstamm, 1893:121.
=*Blepharipoda grandis* Bigot, 1890:
=*Blepharipoda orientalis* Townsend, 1927:

寄 主：*Dysodia magnifica* Whalley 橙黃後窗網蛾
Andraca bipunctata Walker 茶蠶
Antheraea mylitta Drur. 大蠶蛾
Antheraea pernyi Guerinp-Mèneville 柞蠶
Antheraea yamamai Guenée 天蠶蛾
Bombyx mori (Linnaeus) 家蠶
Cephonodes hylas Linnaeus 咖啡透翅天蛾
Bombyx mandarina Moore 野蠶
Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾
Dendrolimus kikuchii Walker 思茅松毛蟲
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus sibiricus Tschetwerikow 西伯利亞松毛蟲
Dendrolimus spectabilis Butler 赤松毛蟲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲
Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Lu 油松毛蟲
Ivela ochropoda Eversmann 黃足榆毒蛾
Stilpnotia ochropoda Evers. 榆毒蛾
板栗天蛾
蝙蝠蛾(幼蟲)。

地老虎
國外：*Andraca bipunctata* 茶蠶
Antheraea mylitta 日本柞蠶
Antheraea yamamai 日本天蠶
Antheraea
Archeoattacus edwardsii
Bombyx mori 家蠶
Cephonodes hylas 咖啡透翅天蛾(大透翅天蛾)
Diacrisia obliqua
Euproctis erecta
Euproctis sp.
Eupterote undata
Lymantria ampla
Lymantria fuliginosa
Lymantria serva
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Trabana vishnu Lefebvre 栗黃枯葉蛾(蓖麻黃枯葉蛾)
Papilio demoleus Linnaeus 橘黃鳳蝶
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(遠東)、日本、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Blepharipa sp. 稻眼蝶飾腹寄蠅 (Zhang, 1987[ed.] 2:70)
寄 主：稻眼蝶。
分 佈：江西。

Blondelia breviceps Shima 短尾卷蛾寄蠅 (Hun., 1992:1172; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 1:1749)
Blondelia breviceps Shima, 1984:544-547.
寄 主：
分 佈：湖南；日本。

Blondelia hyphantriae Townsend 絲卷蛾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:264; Chao et Zhou, 1988:520; Shi, 1995:538)
Blondelia hyphantriae Townsend, 1830:
寄 主：
分 佈：福建、西藏(墨脫)、浙江；美國。

Blondelia inclusa (Hartig) 松梢小捲蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:682; ASZI et al., 1978:219; Chao et Liang, 1984: 80; Fan, 1992:742; Shi, 1981(4):37; Xiao et al., 1991:96; Xue et al., 1996, 1:1749; Yunn., 1987:1219; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
Tachina inclusa Hartig, 1838:285.
=*Lophyromyia claausa* Brauer et Bergenstamm, 1889:
=*Schaumia desvoidyi* Townsend, 1919:
寄 主：*Rhyacionia pinicolana* (Deubleday) 松梢小捲蛾
Gilpinia virens (Klug) 淡綠吉松葉蜂(幼蟲-蛹)。

國外：*Diprion frutetorum* Fabricius
Diprion pini Linnaeus 普通鋸角葉蜂
Diprion laricis Jur.
Diprion pini Linnaeus
Diprion pallidus Kl.
Diprion polytomum Hart.
Gilpinia hercyniae Hert.
Neodiprion sertifer Geoffr. 松鋸角葉蜂
分 佈：雲南、黑龍江；歐洲中北部(德國、波蘭)。

Blondelia nigripes (Fallén) 黑須捲蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:683 Chao et Liang, 1984:77; Chao et Zhang, 1982: 264; Fan, 1992:741; He et al., 1991:64; Liu, Zhao et al., 1998:84; Xue et al., 1996, 1:1749; Yunn., 1987:1218; Zhao et Zhou, 1992:1286)
Tachina nigripes Fallén, 1810:283.
=*Tachina agilis* Meigen, 1824:307.
=*Tachina offusca* Meigen, 1824:308.
=*Tachina bibens* Meigen, 1824:310.
=*Tachina opaca* Meigen, 1824:313.
=*Blondelia nitida* Robineau-Desvoidy, 1830:122.
=*Tachina inflexa* Bouché, 1834:58.
=*Tachina pinivorae* Ratzeburg, 1844:173.
=*Masicera nitens* Macquart, 1850:284.
=*Tachina ignota* Perris, 1852:206.
=*Tachina testaceolateralis* Macquart, 1854:395.
=*Tachina gracilistylum* Macquart, 1854:396.
=*Cerinasia virilis* Rondani, 1861:26.
=*Tachina geometrae* Brischke, 1885:19.
=*Tachina omnivora* Brischke, 1885:19.
=*Dexodes machairopsis* Brauer et Bergenstamm, 1889:87.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(黑龍江)
Zeiraphera diniana Guenée 松線小捲蛾。
國外：Tenthredinidae 葉蜂科
Aglaostigma fulvipes Scop.
Athalia rosae Linnaeus 油菜葉蜂
Empria candidata Fall.
Empria pulcerata Retz.
Dolerus pratensis Linnaeus
Macrophya albicincta Sch.
Pachynematus diaphanus Ev.
Tenthredo rubricoxis Ens.
鱗翅目：*Abraxas grossulariata* Linnaeus 醋栗尺蠖
Abrostola tripatila Hufn.
Acronycta rumicis Linnaeus 梨劍紋夜蛾
Agrotis candelarum Stgr.
Agrotis c-nigrum Linnaeus 八字地老虎
Ammoconia caecimacula Schiff.
Anarta myrtilli Linnaeus

Aporia crataegi Linnaeus 山楂蝶(梅白蝶)
Arctia caja Linnaeus 豹燈蛾
Barathra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾
Boarmia punctulata Schiff.
Brephos parthenias Linnaeus 樺小眼尺蠖
Cacoccia rosana Linnaeus 薔薇卷葉蛾
Calocampa exoleta Linnaeus
Calophasia lunula Hufn.
Calymnia trapezina Linnaeus 肉食黃夜蛾
Charaeas graminis Linnaeus
Choristoneura murinana Hb. 紫色卷蛾
Cucullia argentica (Hufn.) 碧銀冬夜蛾
Cucullia artemisiae Hufn.
Cucullia asteris Schiff. 菊冬夜蛾
Cucullia formosa Rogenhof.
Cucullia lactucae Schiff.
Cucullia lucifuga Schiff.
Cucullia lychnitis Ramb.
Cucullia rerbasci Linnaeus
Cucullia verbasei Linnaeus 具條冬夜蛾
Deilephila euphorbiae Linnaeus
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Dianthoecia capsincola Hb.
Dryobota protea Borkh.
Ematurga atomaria Linnaeus
Ennomos quercinaria Hufn.
Eupithecia innotata Hufn.
Eupithecia virgaureata Dbl.
Euproctis phaeorrhaea Don.
Heliothis scutosa Schiff.
Hibernia aefoliaria Linnaeus
Hibernia marginaria Fabricius
Himera pennaria Linnaeus
Hyponomeuta evobymellus Linnaeus 稠李巢蛾
Hyponomeuta padellus Linnaeus 蘋(食果)巢蛾
Larentia badiata Hb.
Larentia clavaria Haw.
Larentia juniperata Linnaeus
Leucania pallens Linnaeus
Lygris populata Linnaeus 楊黃波尺蠖
Lymentria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Macrophya albicincta Sch.
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Mamestra oleracea Linnaeus 菜園夜蛾

Mamestra trifolii Rott.
Nemoria pulmentaria Guen.
Olethreutes variegana Hb.
Orthosia helvola Linnaeus
Papilio machaon Linnaeus 茴香金鳳蝶
Parasemia plantaginis (Linnaeus) 車前燈蛾
Phragmatobis fuliginosa (Linnaeus) 亞麻燈蛾
Plusia gamma Linnaeus Y 紋夜蛾
Porthetria dispar Linnaeus
Pygaera anastomosis Linnaeus
Salebria matmorta Alph. 雲紋螟
Smerinthus populi Linnaeus
Taeniocampa miniosa Schiff.
Thaumetopoea pinivorana Tr.
Thaumetopoea pityocampa Schiff. 松帶蛾
Thaumetopoea processionea Linnaeus 歐洲帶蛾
Theria rubricapraria Schiff.
Tortrix viridana Linnaeus 櫟綠卷蛾
Vanessa io Linnaeus 孔雀蛺蝶
Vanessa polychloros Linnaeus 雜色蛺蝶
Vanessa urticae Linnaeus 蕁麻蛺蝶
Venilia mcaularia Linnaeus
Zeiraphera griaeana Hb.

分 佈：雲南、西藏(昌都、江達、察雅、察隅)、四川、山西、河北、北京、青海、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲北達英格蘭、斯堪的納維亞北部、德國、波蘭、意大利、法國。

Bothria clarinigra Chao et Liu 亮黑凹面寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:228)

Bothria clarinigra Chao et Liu
寄 主：
分 佈：山西。

Bothria frontosa (Meigen) 寬額凹面寄蠅 (ASZI, 1987, 2:684; ASZI et al., 1978:209; Chao et Liang, 1984: 141; Chen, 1989:113; Fan, 1992:784; Liu, Zhao et al., 1998:230; Shi, 1981(4):36; Xue et al., 1996, 2:1928)

Tachina frontosa Meigen, 1824:388.
=*Bothria pascuorum* Rondani, 1859:168.
=*Chariclea coxalis* Robineau-Desvoidy, 1863:558.
=*Bothria obliquata* (Fallén) of Bezzi, *In* Becker et al., 1907:314.
寄 主：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
Dendrolimus supurans (Butler) 落葉松毛蟲。
國外：*Mesogona acetosellae*
Vanessa urticae Linnaeus 蕁麻蛺蝶

分 佈：江蘇、山西、河北、北京、遼寧；蒙古、日本、西伯利亞南部、外高加索、意大利、法國、比利時、瑞典。

Buquetia musca Robineau-Desvoidy 毛顏鳳蝶寄蠅 (ASZI, 1987, 2:684; Chao et Liang, 1984:144; Fan, 1992:786; Shi, 1981(4):35; Xue et al., 1996, 2:1878)

Buquetia musca Robineau-Desvoidy, 1847:287.
=*Masicera setifacies* Rondani, 1861:
=*Tachina papilionis* Brischke, 1885:
=*Peteina laticeps* Pandellé, 1896:
寄 主：*Papilio machaon* Linnaeus 茴香鳳蝶(國內外)。
分 佈：遼寧；西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、以色列、意大利、法國、德國、波蘭。

Cacelia matsukarehae 鈎葉狹頰寄蠅 (Chen, 1989:122)

Cacelia matsukarehae
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
分 佈：陝西、山東、遼寧、黑龍江。

Calozenillia jilinensis Sun 吉林擬彩寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1926)

Calozenillia jilinensis Sun, 1993:415-416.
寄 主：
分 佈：吉林。

Calozenillia tamara (Portschinsky) 塔瑪擬彩寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1926)

Exorista tamara Portschinsky, 1884:132.
寄 主：
分 佈：四川；日本。

Calozenillia tibialis Sun 黃脛擬彩寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:227; Xue et al., 1996, 2:1926)

Calozenillia tibialis Sun, 1993:417.
寄 主：
分 佈：山西。

Campylochaeta fuscinervis Stein 褐脈噪寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2121)

Campylochaeta fuscinervis Stein, 1924:105.
寄 主：
分 佈：北京；波蘭、德國、奧地利。

Campylochaeta malaisei Mesnil 馬來噪寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2121; Yunn., 1987:1253; Zhao et Zhou, 1992:1335)

Campylochaeta malaisei Mesnil, 1953:146:
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸。

Caracia mucronifera Rondani 劍頭臘寄蠅 (Hun., 1992:1174)

寄 主：
分 佈：湖南；外高加索、希臘、以色列、西班牙、法國、意大利。

Carcelia ambigua Villeneuve 隱斑狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:685; Chao et Liang, 1984:100; Fan, 1992:757; Shi, 1981(4):37)
Carcelia ambigua Villeneuve, 1931:74.
寄 主：*Bhima idiota* Graes 白楊枯葉蛾
分 佈：廣東、廣西、雲南、浙江、北京、遼寧、黑龍江；歐洲。

Carcelia amphion Robineau-Desvoidy 灰腹狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:685; Chao et Liang, 1984:98; Shi, 1981(4):37 38; Yunn., 1987:1225)
寄 主：*Euproctis flava* (Bremer) 折帶黃毒蛾
Orgyia gonostigma Fabricius 赤紋毒蛾
Pantana phyllostachysae Chao 剛竹毒蛾
Stilpnotia ochropoda Evers. 榆毒蛾
國外：*Dasychira fascelina* Linnaeus
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋紅尾毒蛾
Nygmia phaeorrhoea Linnaeus 棕尾毒蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Orgyia gonostigma Fabricius 赤紋毒蛾
Porthesia similis Fuess. 桑毒蛾
Spilosoma sp.
Xanthia citrago Linnaeus
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、北京、遼寧、黑龍江；歐洲。

Carcelia atricosta Herting 黑鱗狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1182; Liu, Zhao et al., 1998:154; Sun et al., 1992:628; Xue et al., 1996, 2:1789; Zhao et Zhou, 1992:1296)
Carcelia atricosta Herting, 1961:7.
寄 主：
分 佈：湖南、雲南、山西、北京；日本、意大利、法國、德國、英格蘭、瑞典、挪威。

Carcelia bombycivora Robineau-Desvoidy 灰粉狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:685; ASZI et al., 1978:202; Chao et Liang, 1984:96; Chao et Zhang, 1982:267; Fan, 1992:754; He et al., 1991:64; Hun., 1992:1182; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
Carcelia bombycivora Robineau-Desvoidy, 1830:181.
別 名：*尖音狹頰寄蠅*。
寄 主：*Calpe capucina* Esper 羽壺夜蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)
Spilosoma lubricipeda Linnaeus 黃腹麻燈蛾
Parnara guttata guttata Bremer et Grey 稻苞蟲
塵白燈蛾
Pantana phyllostachysae Chao 剛竹毒蛾

國外：*Acronycta aceris* Linnaeus　楓劍紋夜蛾
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus　黃褐天幕毛蟲
亞麻燈蛾
黃腹燈蛾
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、西藏(察隅)、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、北京、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本、歐洲。

Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy 尖音狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:160; Sun et al., 1992: 628; Xue et al., 1996, 2:1793)
Carcelia bombylans Robineau-Desvoidy, 1830:177.
=*Exorista gnava* (Meigen) of Rondani, 1859:135.
=*Exorista vigilans* Rondani, 1859:135.
=*Carcelia canora* Robineau-Desvoidy, 1863:235 .
寄 主：*Spilosoma lubricipeda* Linnaeus　黃腹燈蛾。
據記載：*Malacosoma neustria* Linnaeus　黃褐天幕毛蟲
分 佈：廣東、雲南、浙江、江蘇、湖北、山西、北京、內蒙古、黑龍江；日本、千島群島、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、法國、英格蘭、德國。

Carcelia brevicaudata Chao et Zhou 短尾狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1183)
Carcelia brevicaudata Chao et Zhou, 1992:1183.
寄 主：
分 佈：湖南。

Carcelia blepharipoides Chao et Liang 擬態狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1789; Zhao et Zhou, 1992:1296)
Carcelia blepharipoides Chao et Liang, 1986:136-137.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Carcelia brevipilosa Chao et Liang 短毛狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1793)
Carcelia brevipilosa Chao et Liang, 1986:139-140.
寄 主：
分 佈：廣東、海南、雲南。

Carcelia candidae Shima 舞毒蛾狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:153; Xue et al., 1996, 2:1789; Xue et al., 1996, 2:1804;)
Carcelia candidae Shima, 1981:377-384.
=*Carcelia beijingensis* Chao et Liang, 1986:134.
=*Carcelia lymantriae* Chao eet Liang, 1986:135.
寄 主：楊毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾。
分 佈：山西、北京、遼寧、黑龍江；日本。

Carcelia canutipulvera Chao et Liang 灰粉狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1793)

Carcelia canutipulvera Chao et Liang, 1986:140-141, 147-148.
寄 主：樗蠶。
分 佈：貴州、北京。

Carcelia ceylanica (Brauer et Bergenstamm) 斯里蘭卡狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1793)
Eufischeria ceylanica Brauer et Bergenstamm, 1891:375.
寄 主：
分 佈：臺灣、四川、上海、北京；印度、斯里蘭卡。

Carcelia clava Chao et Liang 棒角狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:149; Xue et al., 1996, 2:1793)
Carcelia clava Chao et Liang, 1986:133-134.
寄 主：
分 佈：山西、北京。

Carcelia clevipalpis Chao et Liang 棒須狹頰寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:521; Cui, 1992:292; Xue et al., 1996, 2:1793; Zhao et Zhou, 1992:1298)
Carcelia clevipalpis Chao et Liang, 1986:127-128.
寄 主：*Loxostege sticticalis* (Linnaeus) 草地螟(*黃綠條螟，甜菜網螟*)。
分 佈：西藏(墨脫)、四川。

Carcelia confundens (Rondani) 紊狹頰寄蠅 (Fan, 1992:754; Hun., 1992:1183; Liu, Zhao et al., 1998:146; Sun et al., 1992:629; Xue et al., 1996, 2:1793)
Exorista confundens Rondani, 1859:138.
=*Exorista leucophaea* (Meigen) of Schiner, 1862:
=*Eucarcelia villeneuvei* Mesnil, 1963:3.
=*Carcelia leucophaea* Rondani, 1984:
寄 主：*Bupalus piniarius* Linnaeus 松尺蠖
Ostrinia furnacalis (Guenée) 玉米螟。
分 佈：湖南、浙江、山東、山西、北京、內蒙古、黑龍江；日本、歐洲南部。

Carcelia dubia Braayer-Bergenstamm 杜比狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1793; Zhao et Zhou, 1992:1293)
Carcelia dubia Braayer-Bergenstamm, 1891:322.
寄 主：松毛蟲。
據記載：*Arctia hebe* Linnaeus 燈蛾
Arctia villica Linnaeus
Euchelia jacobaea Linnaeus
Habryntis scita Hb.
分 佈：雲南、四川、北京、遼寧；土耳其、土耳其、西班牙、意大利；法國、瑞士德國、奧地利、南斯拉夫。

Carcelia evolans Wiedemann 善飛狹頰寄蠅 (ASZI et al., 1978:201; Cui, 1992:292; Shi, 1981(4):34, 35, 36)
寄 主：*Helicoverpa armegera* (Hübner) 棉鈴蟲
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 草地螟(*黃綠條螟，甜菜網螟*)

Cephalcia abietes Linnaeus 雲杉卷葉鋸蜂。
國外記載：
Bumbotelia jacosathrix
Chloridea sp.
Diacrisia obligua Walker
Euproctis minor
Eupterote sp.
Macroglossum sp.
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、山東、北京、黑龍江；日本(奄美大島)、爪哇、印度、非洲。

Carcelia excisa (Fallén) 隔離狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:685; ASZI et al., 1978:201; Chao, 1962:40; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Chao et Liang, 1984; 95; Chao et Zhang, 1982:266; 1988:520; Fan, 1992:753; He et al., 1991:64; Hun., 1992:1183; Liu, Zhao et al., 1998:144; Shi, 1981(4):33; 36; Sun et al., 1992:629; Xue et al., 1996, 2:1793; Yunn., 1987:1221; Zhao et Zhou, 1992:1294)
Tachina excisa Fallén, 1820:32.
=*Carcelia aurifrons* Robineau-Desvoidy, 1830:182.
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Leucoma candida Staudinger 柳毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Cephalcia abietes Linnaeus 雲杉卷葉鋸蜂
國外：寄生多種夜蛾科、舟蛾科、毒蛾科、燈蛾科、天蛾科等鱗翅目害蟲。
Abrostola triplasia Linnaeus 蕁麻褐夜蛾
Arctia caja Linnaeus 豹燈蛾
Arctia hebe Linnaeus
Arctia villica Linnaeus
Bupalus piniarius Linnaeus 松尺蠖
Callimorpha dominula Linnaeus
Cuculia scrophulariae Cep.
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋紅尾毒蛾(茸毒蛾)
Drepama harpogula Esp.
Endromis versicolora Linnaeus 樺蛾
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 僧尼舞毒蛾(模毒蛾)
Malacosoma castrensis Linnaeus
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Nygmia phacorrhoea Don. 棕尾毒蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Phalera bucephala Linnaeus 圓黃掌舟蛾
Phragmatobia fulginosa Linnaeus 亞麻燈蛾

Pterostoma palpina Linnaeus
Pygera curtula Linnaeus
Sphinx ligustri Linnaeus　丁香天蛾
Thalpocheres pannonica Fr.
Thaumetopoca proccssionca Linnaeus　歐洲帶蛾
大天蠶蛾
茸毒蛾
模舞毒蛾
雪毒蛾。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本(奄美大島)、亞洲、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、歐洲。

Carcelia falx Chao et Liang 鐮葉狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1798)
Carcelia falx Chao et Liang, 1986:143-144.
寄 主：
分 佈：海南。

Carcelia flava Chao et Liang 黃腹狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:11798; Zhao et Zhou, 1992:1298)
Carcelia flava Chao et Liang, 1986:129-130.
寄 主：
分 佈：雲南。

Carcelia flavimaculata Sun et Chao 黃斑狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1184; Sun et al., 1992:629)
Carcelia flavimaculata Sun et Chao, *In* Sun et al., 1992:629-630.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、西藏、四川、湖北。

Carcelia frontalis Baranov 平額狹頰寄蠅 (Hun, 1992:1184; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798)
Carcelia frontalis Baranov, 1931:43.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、雲南、浙江、江蘇、安徽、北京。

Carcelia gnava (Meigen) 格納狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:685; Chao et Liang, 1984:101; Fan, 1992:757; Hun., 1992:1184; Liu, Zhao et al., 1998:152; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Yunn., 1987:1225)
Tachina gnava Meigen, 1824:330.
=*Tachina exoavata* Zetterstedt, 1844:1131.
=*Carcelia cantans* Rhbineau-Desvoidy, 1863:223.
=*Carcelia orgyae* Rhbineau-Desvoidy, 1863:237.
寄 主：*Aromia moschata* Linnaeus　柞蠶。
國外：*Arctia caja*　豹燈蛾
蘋毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus　模舞毒蛾

Eneromis versicolora Linnaeus 樺蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Nygmia phaeorrhoea D. 棕尾毒蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Phragmatobia fulginosa Linnseus 亞麻燈蛾
Stilpnotia ochropoda Evers. 楊毒蛾
Stilpnotia salicis 雪毒蛾
分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本、庫頁島、西伯利亞南部、外高加索、聖彼得堡、法國、英格蘭、瑞典。

Carcelia hainanensis Chao et Liang 海南狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1798)
Carcelia hainanensis Chao et Liang, 1986:137-138.
寄 主：
分 佈：海南。

Carcelia hamata Chao et Liang 鈎葉狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1185; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Zhao et Zhou, 1992:1298)
Carcelia hamata Chao et Liang, 1986:142-143.
寄 主：*Stilpnotia ochropoda* Eversmann 榆毒蛾。
分 佈：湖南、雲南、四川。

Carcelia hirsuta Baranov 多毛狹頰寄蠅 (Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Zhao et Zhou, 1992:1298)
Carcelia hirsuta Baranov, 1931:38.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南；日本。

Carcelia hirtspila Chao et Shi 毛斑狹頰寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:266; Hun., 1992:1185; Liu, Zhao et al., 1998:148; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Zhao et Zhou, 1992:1295)
Carcelia hirtspila Chao et Shi, 1982:267.
寄 主：
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、浙江、陝西、山西。

Carcelia interfrontalis Chao et Liang 粉額狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1798)
Carcelia interfrontalis Chao et Liang, 1986:125.
寄 主：
分 佈：廣東、廣西。

Carcelia iridipennis (Wulp) 拱瓣狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1185; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Zhao et Zhou, 11992: 1293)
Parexorista iridipennis Wulp, 1893:176.
=*Parexorista modicella* Wulp, 1893:
寄 主：木麻毒蛾
檬果毒蛾。

分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、湖北；馬來西亞、泰國、斯里蘭卡、印尼。

Carcelia kockiana Townsend 善飛狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:686; Chao et Liang, 1984:94; Fan, 1992:751; He, et al., 1991:65; Hun., 1992:1185; Sun et al., 1992:630; Xue et al., 1996, 2:1798; Yunn., 1987:1222; Zhao et Zhou, 1992:1293)

Carcelia kockiana Townsend, 1927:65.

=*Carcelia evolaus* Wiedemann

寄 主：*Creatonotus gangio* Linnaeus 黑條燈蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Osternia firmacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Stilpnotia ochropoda Evers. 榆毒蛾
稻黃毒蛾
雀紋天蛾
波紋夜蛾(Thyatiridae)。
國外：*Bombotelia jacosathrix*
Busseola fusca Full. 玉米蛀莖褐夜蛾
Chloridea sp.
Clostera anastomosis tristis Staudinger
Cryptothelea junodi Heyl.
Diacerisia obligua Walker 人紋燈蛾
Euproctis minor 稻黃毛白毒蛾
Eupterote sp.
Hyblaea puera Walker
Macroglossum sp.
Pelopidas mathias oberthueri Evans
Perinephela lancealis Denis et Schillfermüller
Tirathaba rufivena 椰紅脈穗螟

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、北京、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲。

Carcelia laticauda Liang et Chao 寬尾狹頰寄蠅 (Liang et Chao, 1994:484)

Carcelia laticauda Liang et Chao, 1994:484-485.

寄 主：

分 佈：廣東(電飛縣)。

Carcelia latifacialia Chao et Liang 寬堤狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1804; Zhao et Zhou, 1992:1295)

Carcelia latifacilia Chao et Liang, 1986:128-129.

寄 主：

分 佈：雲南。

Carcelia latistylata (Baranov) 寬葉狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1804; Zhao et Zhou, 1992:1293)

Parexorista latistylata Baranov, 1934:405.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、四川；斯里蘭卡。

Carcelia laxifrons Villeneuve 寬額狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1186; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1804; Zhao et Zhou, 1992: 1293)
Carcelia laxifrons Villeneuve, 1912:90.
寄 主：據記載：*Ctenocampa procession* Linnaeus
Dasychira pudinunda (Linnaeus) 茸毒蛾
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) 黃毒蛾
Parexorista cheloniae Rond.
分 佈：湖南、四川、遼寧；蒙古、日本、西伯利亞、外高加索、歐洲(向北達瑞典南部)。

Carcelia lena (Richter) 長肛狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1804; Zhao et Zhou, 1992:1295)
Eucarcelia lena Richter, 1980:526.
寄 主：
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、四川、北京；蒙古。

Carcelia leucophaea Rondani 素狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:686; Chao et Liang, 1984:97)
寄 主：*Bupalus piniarius* Linnaeus 松尺蠖
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟。
分 佈：山東、北京；歐洲南部。

Carcelia longichaeta Chao et Shi 長毛狹頰寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:267; Xue et al., 1996, 2:1804)
Carcelia longichaeta Chao et Shi, 1982:227.
寄 主：
分 佈：西藏(樟木)。

Carcelia lucorum Meigen 蘆寇蛾狹頰寄蠅 (Shi, 1981(4):38; Yunn., 1987:1226; Xue et al., 1996, 2:1804; Zhao et Zhou, 1992:1296)
Tachina lucorum Meigen, 1824:328.
寄 主：*Arctia caja* Linnaeus 豹燈蛾
Arctia purpurea Linnaeus 燈蛾
Arctia hebe Linnaeus 燈蛾
Ascotis selenaria dianeria Hübner 棉大造橋蟲
杠柳螟蛾。
國外：*Arctia caja* Linnaeus
Ammoconia caecimacula Fabricius
Arctia hebe Linnaeus
Arctia ppurpurea Linnaeus
Arctia villica Linnaeus
Maacrothylacia rubi Linnaeus
Phragmatobia fuliginosa Linnaeus

Orthosia pistacina Fabricius
Stilpnotia salicis Linnaeus
Cimbex femorata Linnaeus
Hadena secalis Linnaeus
Rhyparia purpurta Linnaeus
Melacosoma neustria Linnaeus
Melacosoma castrensis Linnaeus
Lymantria dispar Linnaeus
Euproctis chrysorrhoea Linnaeus
Phalera bucephala Linnaeus
Spilosoma lubricipeda Linnaeus
Spilosoma mendica Linnaeus
Euchelia jacobaea Linnaeus
Aretiaa docta Walker
Arachnis picta Pack.
Archips argyrospila Walker

分 佈：福建、廣西、雲南、四川、北京、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、日本、阿爾泰、塔什干、外高加索、列寧格勒、以色列、歐洲(向北達英格蘭南部、德國北部)。

Carcelia lymantriae Chao et Liang 楊毒蛾狹頰寄蠅 (Fan, 1992:757)

Carcelia lymantriae Chao et Liang, 1986:135-136.

寄 主：*Leucoma salicis* 楊毒蛾
一種螟蛾。

分 佈：廣西、四川、北京、內蒙古。

Carcelia maculata Chao et Liang 雙斑狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1804)

Carcelia maculata Chao et Liang, 1986:123-124, 144-145.

寄 主：

分 佈：北京。

Carcelia matsukarehae (Shima) 松毛蟲狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:686; Chen, 1989:112; Fan, 1992:756; He et al., 1988:22; He et al., 1991:65; Hun., 1992:1186; Sun et al., 1992:631; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Wang et Zhou, 1995, 17(4):147-152; Weng et al., 1996, 18(1):1-6; Xue et al., 1996, 2:1804; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

Carceliopsis matsukarehae Shima, 1969:233.

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲
Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲、蛹)
Euproctis cryptosticta Collenette 篦麻黃毒蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Gilpinia funingensis 撫寧吉松葉蜂(幼蟲)

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、俄羅斯遠東地區、歐洲。

Carcelia nigrantennata Chao et Liang 黑角狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)

寄 主：褐腹黃尾白毒蛾。

分 佈：江西、廣西、貴州、雲南、浙江。

Carcelia nigrapes Mesnil 巨狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)

Carcelia nigrapes Mesnil, 1944:29.

寄 主：

分 佈：江西。

Carcelia octava Baranov 奧克狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1186; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1810)

Carcelia octava Baranov, 1931:35.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、浙江、北京。

Carcelia orientalis (Shima) 東方狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:142; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1810)

Eucarcelia orientalis Shima, 1968:531.

寄 主：

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、雲南、浙江、江蘇、山西、北京；日本。

Carcelia pallidipes Uéda 黃足狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)

Carcelia pallidipes Uéda, 1960:112.

寄 主：

分 佈：北京；日本。

Carcelia palpalis Chao et Liang 腫鬚狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)

Carcelia palpalis Chao et Liang, 1986:122-123.

寄 主：

分 佈：海南、廣東。

Carcelia pilosa Chao et Liang 綿毛狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1187; Sun et al., 1992:631)

寄 主：

分 佈：海南、廣東、湖南、北京。

Carcelia pollinosa Mesnil 細腹狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)

Carcelia pollinosa Mesnil, 1941:98.

寄 主：

分 佈：北京；日本、歐洲。

Carcelia prima Baranov 角野螟狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:143)

Senometopla prima Baranov, 1931:31.
寄 主：*Meroctena tullalis* (Walker) 短梳角野螟。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、上海、山西、北京；印度、印尼。

Carcelia puberula Mesnil 普狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:158; Xue et al., 1996, 2:1810)
Carcelia puberula Mesnil, 1941:98.
=*Carcelia lucorum* (Brauer et Bergeenstamm) of Villeneuve, 1912:90, 91.
寄 主：據記載：*Lymantria monacha* Linnaeus 模毒蛾
Ctenocampa processionea Linnaeus
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋毒蛾
分 佈：山西、北京；日本、法國、歐洲北部到瑞典南部。

Carcelia rasa (Macquart) 灰腹狹頰寄蠅 (Fan, 1992:754; Hun., 1992:1187; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1810; Zhao et Zhou, 1992:1296)
Exorista rasa Macquart, 1849:368.
=*Carcelia susurrans* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Carcelia amphion* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Sisyropa angusta* Brauer et Bergenstamm, 1891:
寄 主：*Euproctis chrysorrhoea* Linnaeus 黃毒蛾
Stilpnotia ochropoda (Eversmann) 榆毒蛾
Orgyia gonostigma Fabricius 角斑毒蛾(赤紋毒蛾)。
國外：*Dasychira fascelina* Linnaeus 霜茸毒蛾
Dasychira pudibunda Linnaeus 茸毒蛾(蘋紅尾毒蛾)
Euproctis chryssorrhoea Linnaeus 黃毒蛾
Nygmia phaerrhoca Linnaeus 棕尾毒蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Orgyia gonostigma Linnaeus 角斑古毒蛾
Porthesia similis (Fuessly) 桑毒蛾(盜毒蛾)
Spilosoma sp.
Xanthia citrago Linnaeus
盜毒蛾
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、北京、遼寧、黑龍江；日本、西伯利亞、阿爾泰、外高加索、以色列、歐洲北至德國北部。

Carcelia rasella Baranov 松毛蟲狹頰寄蠅 (ASZI et al., 1978:202; Chao, 1964:880; Chao et Liang, 1984:100; Cui, 1992:292; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Liu, Zhao et al., 1998:155; Wu et al., 1989:162; Xue et al., 1996, 2:1819; Yunn., 1987:1224; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
Carcelia rasella Baranov, 1931:44.
=*Exorista lucorum* (Meigen), 1859:135.
=*Carcelia mollis* Herting, 1961:7.
別 名：*拉賽狹頰寄蠅*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
赤松毛蟲

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu　油松毛蟲(蛹)
Dendrolimus superans (Butler)　落葉松毛蟲(幼蟲、蛹)
Euproctis cryptosticta Collenette　篦麻黃毒蛾
Loxostege sticticalis (Linnaeus)　草地螟(黃綠條螟，甜菜網螟)
天蛾。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、意大利、法國、德國、奧地利。

Carcelia rondeniella Baranov 龍達狹頰寄蠅 (Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1819)

Catacarcelia rondeniella Baranov, 1934:392.

寄 主：

分 佈：臺灣、海南、貴州、雲南；日本。

Carcelia sexta Baranov 塞克斯狹頰寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:520; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1819)

Carcelia sexta Baranov, 1931:34.

寄 主：

分 佈：臺灣、貴州、西藏(波密)、北京。

Carcelia sumatrana Twonsend 黃腹狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:687; Chao et Liang, 1984:99; Chao et Zhang, 1982:267; Chao et Zhou, 1988:520; Fan, 1992:755; Hun., 1992:1187; Liu, Zhao et al., 1998:157; Shi, 1981(4):38; Sun et al., 1992:631; Xue et al., 1996, 2:1819; Yunn., 1987:1224; Zhao et Zhou, 1992:1292)

Carcelia sumatrana Twonsend, 1927:65.

別 名：*蘇門答臘狹頰寄蠅*。

寄 主：*Pantana phyllostachysae* Chao　剛竹毒蛾
Spilarctia obliqua Walker　人紋燈蛾
葡萄黑燈蛾
塵白燈蛾。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、山西、北京、遼寧；日本、馬來西亞、斯里蘭卡、印尼。

Carcelia sumatransis (Townsend) 短爪狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:156; Sun et al., 1992:632; Xue et al., 1996, 2:1819; Zhao et Zhou, 1992:1295)

Carceliops sumatransis Townsend, 1927:66.

寄 主：

分 佈：福建、廣東、海南、雲南、四川、浙江、湖北、山西；日本、馬來西亞、印尼。

Carcelia sussurans Rondani 三鬃狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1819; Yunn., 1987:1223)

Exorista sussurans Rondani, 1859:129.

寄 主：據記載：*Lymantria dispar* Linnaeus
Acronycta psi

Zygaera purpuralis
分 佈：廣東、雲南、遼寧；歐洲。

Carcelia tibialis Robineau-Desvoidy 鬃脛狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1188; Liu, Zhao et al., 1998:150; Sun et al., 1992:632; Xue et al., 1996, 2:1819; Yunn., 1987:1223; Zhao et Zhou, 1992:1292)
Carcelia tibialis Robineau-Desvoidy, 1863:291.
=*Exorista patellipalpis* Pandellé, 1896:19.
=*Pelmatomyia palpalis* Villeneuve, 1907:254.
寄 主：據記載：*Arctia caja* Linnaeus 豹燈蛾
分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、山東、山西、北京、遼寧；日本、薩哈林、千島、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、列寧格勒、歐洲(向北達英格蘭南部、波蘭北部)。

Carcelia transbaicalica Richter 楊毒蛾狹頰寄蠅 (ASZI, 1987, 2:687; Chao et Liang, 1984:103; Xue et al., 1996, 2:1819)
Carcelia transbaicalica Richter, 1980:522.
寄 主：*Leucoma salicis* 楊毒蛾。
分 佈：廣西、四川、北京、內蒙古、黑龍江；蒙古、歐洲。

Carcelia vibrissata Chao et Zhou 鬃堤狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1188)
Carcelia vibrissata Chao et Zhou, 1992:1188.
寄 主：
分 佈：湖南。

Carcelia villicauda Chao et Liang 絨尾狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1819; Zhao et Zhou, 1992:1296)
Carcelia villicauda Chao et Liang, 1986:131-133.
寄 主：
分 佈：廣東、海南、雲南、西藏。

Carcelia villimacula Chao et Liang 綿毛狹頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1810)
Carcelia villimacula Chao et Liang, 1986:126-127. (new name for *C. pilosa* Chao et Liang, 1986, preoccupied by *C. pilosa* Bananov, 1931)
寄 主：
分 佈：海南、廣東、北京。

Carcelia yongshunensis Sun et Chao 永順狹頰寄蠅 (Hun., 1992:1188)
Carcelia yongshunensis Sun et Chao, *In* Sun et al., 1992:632.
寄 主：
分 佈：湖南。

Carcelia xanthohirta Chao et Liang 黃毛狹頰寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:147; Xue et al., 1996, 2:1819)
Carcelia xanthohirta Chao et Liang, 1986:130-131..
寄 主：
分 佈：四川、山西。

Carcelia sp. (Chien et al., 1984:186)

Carcelia sp. Chien et al., 1984:186.
寄 主：*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。
分 佈：臺灣。

Carcelia sp. 狹額寄蠅 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

寄 主：*Neodiprion zhejiangensis* 浙江黑松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：浙江。

Carcelia sp. 茶毛蟲寄蠅 (Dai, 1992:42)

Carcelia sp. Dai, 1992:42.
寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶毛蟲。
分 佈：貴州。

Catagonia aberrans (Rondani) 畸變卡他寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1867)

Exorista aberrns Rondani, 1859:147.
≐*Catagonia nemestrina* Brauer et Bergenstamm, 1891:
寄 主：
分 佈：雲南、遼寧；捷克和斯洛伐克、意大利、奧地利、德國。

Cavillatrix luteipes Shima et Chao 黃足諧寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2087)

Cavillatrix luteipes Shima et Chao, 1992:642-644.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Ceracis freyi (Herting) 弗雷臘寄蠅 (Xue et al., 1996, 1:1756)

Myiothyria freyi Herting, 1958:4.
寄 主：
分 佈：湖南、浙江。

Ceracia mucronifera Rondani 劍頭臘寄蠅 (Sun et al., 1992:623)

寄 主：
分 佈：湖南；蘇聯、以色列、意大利、法國、西班牙、摩洛哥、加那利群島。

Ceranthia selecta (Pandellé) 賽萊擬長喙寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2054; Zhao et Zhou, 1992:1288)

Thryptocera selecta Pandellé, 1894:112.
寄 主：
分 佈：雲南；法國、瑞士。

Ceromasia rubrifrons (Macquart) 紅額蠟黃寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:220; Xue et al., 1996, 2:1919)

Phorocera rubrifrons Macquart, 1834:279.
=*Masicera florum* Macquart, 1850:460
=*Masicera multisetosa* Macquart, 1850:464.

=*Masicera cespitum* Macquart, 1850:473.
=*Masicera cylindrical* Macquart, 1850:475.
=*Edesia discreta* Robineau-Desvoidy, 1863:599.
=*Loevia maga* Robineau-Desvoidy, 1863:896.
=*Loevia cinerella* Robineau-Desvoidy, 1863:897.
=*Tachina rurila* (Meigen) of Pandellé, 1896:54.
寄 主：據記載：*Zygaena purpuralis*
Zygaena trifolii
Zygaena angelicae
Zygaena fausta
Zygaena carniolica
Hipocrita jacobaeae (Linnaeus) 紅棒球蝶燈蛾
Carcharodus aalceae 錦葵弄蝶
Lymantria monacha (Linnaeus) 模毒蛾
Mellitaea athaliae
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶
分 佈：山西、北京、黑龍江；日本、蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、法國、比利時、德國。

Ceromyia flaviseta (Villeneuve) 紅毛脈寄蠅 (He et al., 1991:65; Xue et al., 1996, 2:2052; Yunn., 1987:1194; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhao et Zhou, 1992:1288)
Actia flaviseta Villeneuve, 1921:54.
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：福建、江西、雲南、浙江；蘇聯、德國、瑞士。

Ceromyia silacea (Meigen) 黃毛脈寄蠅 (ASZI, 1987, 2:687; ASZI et al., 1978:212; Chao et Liang, 1984:54; Fan, 1992:724; He et al., 1991:65; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Shi, 1981(4):33, 34; Xue et al., 1996, 2:2052; Yunn., 1987:1194; Zhao et Zhou, 1992:1288)
Ceromyia silacea (Meigen, 1824:355.)
=*Thryptocera siebechi* Sintenis, 1897:
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉
Protodeltote distinguenda (Staudinger) 稻條紋螟蛉
Mythimna copta 白脈粘蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Mythimna loreyi (Duponchel) 勞氏粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
國外： *Eratria fasciana* Linnaeus 夜蛾
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、北京、遼寧、黑龍江；日本、俄羅斯濱海、西伯利亞、外高加索、列寧格勒、歐洲北達英格蘭北部、德國北部、波蘭北部。

Cestonionerva petiolata Villeneuve 細芒裸堤寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1862)
Cestonionerva petiolata Villeneuve, *in* Benker, 1910:144.
寄 主：

分 佈：內蒙古；突尼斯。

Chaetogena acuminata Rondani 櫓肛鬃堤寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1697)

Chaetogena acuminata Rondani, 1859:180.

寄 主：

分 佈：四川、內蒙古；日本、西伯利亞、中亞、地中海沿岸。

Chaetogena fascciata Egger 緣刺鬃堤寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1697)

Chaetogena fascciata Egger, 1956:388.

寄 主：

分 佈：遼寧；西伯利亞及南部、外高加索、歐洲南部、南斯拉夫、奧地利。

Chaetogena gynaephorae Chao et Shi 草毒蛾鬃堤寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1697; Zhao et Zhou, 1992:1278)

Chaetogena gynaephorae Chao et Shi, 1987:203-204, 206.

寄 主：*Gynaepora aalpherakii* (Gr-Gr.) 黃斑草毒蛾(草原毛蟲)。

分 佈：青海。

Chaetogena media Rondani 中形鬃堤寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:106; Xue et al., 1996, 2:1697)

Chaetogena media Rondani, 1859:181.

寄 主：

分 佈：西藏、山西、北京；地中海沿岸、意大利。

Chaetogena tuomuerensis Chao et Shi 托峰鬃堤寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1697)

Chaetogena tuomuerensis Chao et Shi, 1987:204-206.

寄 主：

分 佈：新疆。

Chaetovoria antennata Villeneuve 寬角鬃顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2132; Zhao et Zhou, 1996:265)

Chaetovoria antennata Villeneuve. 1920:118.

寄 主：

分 佈：新疆；意大利、法國、瑞典、挪威。

Chaetexorista atripalpis Shima 黑須刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:688; Chao et Liang, 1984:58; Chen, 1989:114; Fan, 1992:727; Xue et al., 1996, 2:1691; Yunn., 1987:1204)

Chaetexorista ateripalpis Shima, 1973:147.

寄 主：*Dendrolimus spectabilis* Butler 赤松毛蟲
Dendrolimus tubulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲。

分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林；日本。

Chaetexorista eutachinoides Baranov 健壯刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:688; ASZI et al., 1978:217; Chao et Liang, 1984:60; Chao et Zhang, 1982:260; Chao et Zhou, 1988:516; Fan, 1992:728; Hun., 1992:1166; Liu, Zhao et al., 1998:115; Shi, 1981(4):37; Sun et al., 1992:620; Xue et al., 1996, 2:1691; Yunn., 1987:1205)

Chaetexorista eutachinoides Baranov, 1932:92.

=*Megacarcelia pavlovskyi* Stackelberg, 1943:163.

寄 主：*Cnidocampa flavescens* (Walker) 黃刺蛾
Latoia consocia 褐邊綠刺蛾。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、山西、天津、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、尼泊爾。

Chaetexorista javana Brauer et Bergenstamm 爪哇刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:689; Chao et Zhou, 1997:1532; Chen, 1989:114; Fan, 1992:728; Hun., 1992:1166; Sun et al., 1992:621; Xue et al., 1996, 2:1691; Zhao et Liang, 1984:60; Yunn., 1987:1205; Zhao et Zhou, 1992:1279)
Chaetexorista javana Brauer-Bergenstamm, 1894:616.
寄 主：*Cnidocampa flavescens* (Walker) 黃刺蛾
Latoia consocia (Walker) 褐邊綠刺蛾
Latoia sinica (Moore) 中國綠刺蛾
Dendrolimus spp. 松毛蟲
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、河北、北京、天津、遼寧、吉林、黑龍江；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼(爪哇)。

Chaetexorista klapperichi Mesnil 蘋綠刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:689; ASZI et al., 1978:216; Chao et Liang, 1984:59; Fan, 1992:727; Liu, Zhao et al., 1998:118; Xue et al., 1996, 2:1691)
Chaetexorista klapperichi Mesnil, 1960:645.
寄 主：*Euhodope pirivorella* Matsumura 梨大食心蟲
Letoia consocia (Walker) 黃緣綠刺蛾
Letoia sinica (Moore) 中國綠刺蛾
Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾。
分 佈：福建、四川、浙江、上海、山西、河北、天津、北京、新疆、遼寧、吉林、黑龍江。

Chaetexorista klapperichi fronta Chao 中國綠刺蛾寄蠅 (Shi, 1981(4):37)
寄 主：*Latoia sinica* (Moore) 中國綠刺蛾。
分 佈：福建、四川、上海、天津、北京、新疆、遼寧、黑龍江。

Chaetexorista microchaeta Chao 簇毛刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:689; Chao et Liang, 1984:59; Fan, 1992:727; Xue et al., 1996, 2:1691)
Chaetexorista microchaeta Chao, 1965:103.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲
Latoia sp. 青刺蛾
分 佈：江西、四川、山東、河北、北京、遼寧。

Chaetexorista palpis Chao 棒須刺蛾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:690; Chao et Liang, 1984:58; Chen, 1999, 15(3):122; Fan, 1992:727; Shi, 1981(4):37; Xue et al., 1996, 2:1694; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
Chaetexorista palpis Chao, 1965:102.

寄 主：*Cnidocampa flavescens* (Walker) 黃刺蛾
Latoia consocia (Walker)　黃緣綠刺蛾
Dendrolimus punctatus (Walker)　馬尾松毛蟲。
分 佈：江西、湖南、浙江、山東、河北、北京。

Chaetexorista setosa Chao 長鬃刺蛾寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1533; Hun., 1992:1166; Xue et al., 1996, 2:1694; Yunn., 1987:1205)
Chaetexorista setosa Chao, 1965:103.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、北京、新疆。

Chaetotachina rustica Meigen 中細針寄蠅 (He et al., 1991:65)
寄 主：鱗翅目幼蟲。
分 佈：湖南。

Chetogena approxomata Villeuouve 擬魯紅鬃寄蠅 (He et al., 1991:65)
寄 主：稻田昆蟲。
分 佈：四川。

Chetogena grandis Macquart 大形鬃堤寄蠅 (Yunn., 1987:1202)
寄 主：
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、浙江、河南、山東；大洋洲東北部。

Chetogena gynacphorae Chao et Shi 草毒蛾鬃堤寄蠅 (ASZI, 1987, 2:690; Chao et Liang, 1984:71; Chao et Shi, 1987, 5:203-204; Fan, 1992:736)
Chetogena gynacphorae Chao et Shi, 1987:203.
寄 主：*Gynacphora alpherakii* (Gr.-Gr.)　黃斑草毒蛾(草原毛蟲)。
分 佈：青海。

Chetogena hirsuta Mesnil 毛瓣鬃堤寄蠅 (ASZI, 1987, 2:691; Chao et Liang, 1984:70; Chao et Zhang, 1982:261)
寄 主：*Gastropacha populifolia* Esper　白楊枯葉蛾
Malacosoma neustria Linnaeus　天幕毛蟲。
分 佈：臺灣、廣西、雲南、西藏(樟木)、河北、遼寧；越南。

Chetogena tuomuerensis Chao et Shi 托峰鬃堤寄蠅 (Zhao et Shi, 1987, 5:204-205)
Chetogena tuomuerensis Chao et Shi, 1987, 5:204-205.
寄 主：
分 佈：新疆。

Chrysocosmius auratus (Fallén) 歐亞金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:67; Xue et al., 1996, 2:2111; Zhao et Zhou, 1992:1332)
Tachina auratus Fallén, 1820:25.
寄 主：

分 佈：臺灣、雲南；蒙古、日本、蘇聯、意大利、瑞士、奧地利。

Chrysocosmius bidentatus Chao et Zhou 雙齒金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:69; Xue et al., 1996, 2:2111)

Chrysocosmius bidentatus Chao et Zhou, 1989:69-70.

寄 主：

分 佈：河北(小五台)、黑龍江(密山)。

Chrysocosmius euholopticus Chao et Zhou 亞合眼金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:70; Xue et al., 1996, 2:2111; Zhao et Zhou, 1992:1331)

Chrysocosmius euholopticus Chao et Zhou, 1989:70-72.

寄 主：

分 佈：四川。

Chrysocosmius ignorabilis Zimin 伊格金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:66; Xue et al., 1996, 2:2111)

Chrysocosmius ignorabilis Zimin, 1958 :48.

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、塔吉克斯坦。

Chrysocosmius monosetus Chao et Zhou 單鬃金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:68; Xue et al., 1996, 2:2111; Zhao et Zhou, 1992:1330)

Chrysocosmius monosetus Chao et Zhou, 1989:68-69.

寄 主：

分 佈：雲南(德欽梅里雪山)。

Chrysocosmius ocellosetus Chao et Zhou 巨眼鬃金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:67; Xue et al., 1996, 2:2116; Zhao et Zhou, 1992:1331)

Chrysocosmius ocellosetus Chao et Zhou, 1989:67-68.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、青海。

Chrysocosmius strictus (Aldrich) 狹額金綠寄蠅 (Chao et Zhou, 1989:67; Xue et al., 1996, 2:2116; Zhao et Zhou, 1992:1330)

Eucomus strictus Aldrich, 1926:22.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Chrysomikia grahami (Villeneuve) 黃頭金光寄蠅 (Yunn., 1987 1987:1268; Xue et al., 1996, 2:1997; Zhao et Zhou, 1992:1317)

Eudoromyia grahami Villeneuve, 1936:3.

寄 主：

分 佈：雲南、四川。

Chrysomikia viridiscapitis Chao et Zhou 綠頭金光寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5:212-213; Xue et al., 1996, 2:19 Yunn., 1987:1268; Zhao et Zhou, 1992:1317)

Chrysomikia viridiscapitis Chao et Zhou, 1987, 5:204-205.

寄 主：
分 佈：雲南。

Chrysosomopsis stricta Aldrich 長鬃金綠寄蠅 (Chao et Shi, 1982:243; Yunn., 1987:1271)
別 名：*長鬃銅綠寄蠅*。
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(江達)、四川。

Clemelis pullata (Meigen) 黑袍捲須寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:275; Xue et al., 1996, 2:1929; Zhao et Zhou, 1992:1290)
Tachina pullata Meigen, 1824:361.
=*Zenillia ciligera* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Tachina virissata* Zetterstedt, 1838:
=*Tachina mundula* Zetterstedt, 1844:
=*Phorocera aurulenta* Perris, 1852:
=*Phorocera lata* Perris, 1852:
=*Tachina dalecarlica* Zetterstedt, 1859:
=*Phorocara polleniiella* Rondani, 1859:
=*Zenillia lubrica* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Clemelis aurea* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Tritochaeta prosopoides* Brauer et Bergenstamm, 1889:
=*Zenillia libatrix* (Panzer) of Pandellé, 1895:
=*Cllemelis obliimata* Mesnil, 1954:
寄 主：據記載：*Loxostege sticticalis* Linnaeus 甜菜網野螟
Ostrinia nubilalis Hb. 玉米螟
Pandemis heparana 蘋褐捲蛾
Pyrausta albofascialis
分 佈：西藏(江達)、內蒙古、黑龍江；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、聖彼得堡、以色列、歐洲向北達英格蘭、瑞典南部、列寧格勒。

Cnephaotachina danilevskyi (Portshinsky) 丹氏暗寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2006; Zhao et Zhou, 1996:261)
Echinomyia danilevskyi Portshinsky, 1882:8.
=*Cnephaotachina crepusculi* Brauer et Bergenstamm, 1894:
=*Mikia magnifica* (Mik) of Baranov, 1929:
寄 主：
分 佈：新疆；中亞、哈薩克斯坦、外高加索、土耳其、希臘、馬其頓(巴爾幹半島中部)、南斯拉夫、法國。

Compsilura concinnata (Meigen) 康刺腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:691; ASZI et al., 1978:218; Chao et Liang, 1984:80; Chao et Zhang, 1982:263; Chao et Zhou, 1988:518; Chen, 1989:114; Fan, 1992:743; He et al., 1988:22; Hun., 1992: 1172; Liu, Zhao et al., 1998:78; Shi, 1981(4):35, 36; Sun et al., 1992:624; Xue et al., 1996, 1:1751; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yunn., 1987:1213; Zhao et Zhou, 1992:1285)
Tachina concinnata Meigen, 1824:412.
=*Tachina taeniata* Meigen, 1824:389.
=*Tachina muda* Meigen, 1824:395.
=*Phorocera aantiopis* Robineau-Desvoidy, 1830:134.
=*Phorocera noctuarum* Robineau-Desvoidy, 1830:134.
=*Phorocera prorsae* Robineau-Desvoidy, 1830:134.

=*Phorocera caiae* Robineau-Desvoidy, 1830:135.
=*Phorocera iovora* Robineau-Desvoidy, 1830:135.
=*Phorocera pygerae* Robineau-Desvoidy, 1830:135.
=*Phorocera bombycivora* Robineau-Desvoidy, 1830:136.
=*Tachina acronyctae* Bouché, 1834:57.
=*Doria meditabunda* Meigen, 1838:263.
=*Phorocera orthalidis* Robineau-Desvoidy, 1850:175
=*Phorocera orgyae* Robineau-Desvoidy, 1850:176.
=*Phorocera bercei* Robineau-Desvoidy, 1850:177.
=*Phorocera cuculliae* Robineau-Desvoidy, 1850:177.
=*Phorocera guerini* Robineau-Desvoidy, 1850:178.
=*Phorocera pieridis* Robineau-Desvoidy, 1850:179.
=*Phorocera pusilla* Robineau-Desvoidy, 1850:181.
=*Phorocera flavifrons* Robineau-Desvoidy, 1851:152.
=*Phorocera hadeenae* Robineau-Desvoidy, 1851:153.
=*Machaeraea seriventris* Rondani, 1859:159.

寄 主：食性非常廣泛

Amauromematus concinnata Linnaeus 葉蜂
Amauromematus fallax Linnaeus 柳葉蜂
梨捲葉鋸蜂
Artona funeralis Butler 竹斑蛾
Cimbex sp. 錐角葉蜂
Dendrolimus laricis Tschetwerikow 落葉松毛蟲(落葉松枯葉蛾)
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)
Euproctis chrysorrhoca Linnaeus 棕尾毒蛾
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
Nematus ventralis Say 柳葉蜂
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋毒蛾
國外非常廣泛，已有 104 種：
Abraxas grossulariata 醋栗尺蛾
Acherontia atropos 人面天蛾
Acronycta aceris
Acronycta alni
Acronycta auricoma
Acronycta megacephala
Acronycta psi
Acronycta rumicis
Aglaope infausta
Amphipyra tragopogonis
Anrta myrtilli
Aporia crataegi Linnaeus 山楂粉蝶
Araschnia leuana 赤斑蛺蝶
Arctia caja Linnaeus 豹燈蛾
Arsilonche alhovenosa
Bisto hirtaria C. 褐條毛尺蠖

Brephos parthenias Linnaeus 樺小眼尺蠖
Brotolomia meticulosa
Carcharodus alceae 錦葵弄蝶
Catocala promissa Esp. 櫟勛綬夜蛾
Cerura bifida H. 楊燕尾舟蛾
Cerura vinula 銀色舟蛾
Chaerocampa elpenor
Cimbex sp.
Colocasia coryli
Craniophora ligustri 女貞劍紋夜蛾
Croesus septentrionalis Linnaeus 北方樺葉蜂
Cucullia argentea
Cucullia gnaphalii
Cucullia lactucae
Cucullia verbasci 具條冬夜蛾
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋紅尾毒蛾
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Dianthoecia capsincola
Dilina tiliae
Diloba coeruleocephala Linnaeus 刺芹夜蛾
Diphthera alpium O. 苔蛾
Dipterygia scabriuscula
Eriogaster lanestria Linnaeus 絨毛枯葉蛾
Euproctis chrysorrhoea Linnaeus 棕尾毒蛾
Gonepteryx rbamni 黑星黃粉蝶
Graëllsia isabellae
Hibernia leucophacaria
Himera pennaria
Hipocrita jacobacae
Hydroecia micacea H. 沼澤夜蛾
Hyphantris cunea D. 美國白蛾
Hyponomcuta padella 蘋巢蛾
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Libythea celtis 朴喙蝶
Limenitis sibylla
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria moncha Linnaeus 僧尼舞毒蛾
Macrothylacia rubi Linnaeus 樹莓枯葉蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Mamestra brassicae 甘藍夜蛾
Mamestra oleraceae Linnaeus 菜園夜蛾
Mamestra pisi
Melitaca athalia

Neurotoma flaviventris R. 梨卷葉鋸蜂
Nonagria dissoluta
Nonagria typhae
Ochrostigma velitaris
Oeonistis quadra
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Pamphila silvius
Papilio alexanor
Papilio podalirius Linnaeus 杏鳳蝶
Phalera bucephala 櫟銀紋舟蛾
Pieris brassicae 大菜粉蝶
Pieris rapae 菜粉蝶
Plusia gamma Linnaeus Y 紋夜蛾
Poecilocampa populi 楊枯葉蛾
Polia flauicincta
Polygonia c-album 狸白蛺蝶
Porthesia similis Fabricius 桑毒蛾
Poccilocampa populi 楊枯葉蛾
Priophrus padi Linnaeus 稠李葉蜂
Pygaera anachoreta Fabricius 楊舟蛾
Pyrameis atalanta Linnaeus 海軍蛺蝶
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾
Scoliopteryx libatrix 棘翅夜蛾
Semiothisa liturata
Smerinthus ocellatus 藍目灰天蛾
Smerinthus populi
Sphinx ligustri 丁香天蛾
Spilosoma lubricipeda Linnaeus 黃腹斑燈蛾
Spilosoma menthastri 星白燈蛾
Stauropus fagi
Stilpnotia salicis Linnaeus 楊毒蛾
Taeniocampa gothica
Taeniocmapa stabilis
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pityocampa
Thaumetopoea processionea Linnaeus 歐洲帶蛾
Thaumetopoea wilkinsoni
Timandra amata Linnaeus 紅條尺蠖
Trachea atriplicis 白戟銅翅夜蛾
Trichiocampus viminalis Fabricius 青楊毛葉蜂
Triphosa dubitata 暗波紋尺蠖
Vanessa antiopa 長吻蛺蝶

Vanessa jo 孔雀蛺蝶
Vanessa urticae 蕁麻蛺蝶
Xanthia citrago
Zygaena occitanica
膜翅目：*Cimbex* sp.
Croesus septentrionalis Linnaeus 北方樺葉蜂
Neurotoma flaviventris R. 梨卷葉蜂
Priophora padi Linnaeus 稠李葉蜂
Trichiocampus viminalis Fabricius 青楊毛葉蜂

分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、山西、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、中亞、外高加索、以色列、馬來西亞、印尼、埃塞俄比亞、巴布亞新幾內亞、澳洲、印度、歐洲北部、英格蘭、瑞典、德國、法國、北美(引進)。

Compsiluroides communis Mesnil 普通擬刺腹寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:519; Xue et al., 1996, 2:1737; Yunn., 1987:1217; Zhao et Zhou, 1992:1286)

Compsiluroides communis Mesnil, 1953:105.
寄 主：
分 佈：湖南、雲南、西藏(波密)、四川；緬甸。

Compsiluroides flavipalpis Mesnil 黃須擬刺腹寄蠅 (Yunn., 1987:1217; Xue et al., 1996, 2:1737; Zhao et Zhou, 1992:1286)

Compsiluroides flavipalpis Mesnil, 1957:22.
寄 主：國外：*Lapsna apogonoides* Max.
Pachyprotasis sp.
分 佈：雲南、四川；日本。

Compsiluroides proboscis Chao et Sun 長喙擬刺腹寄蠅 (Hun., 1992:1171; Sun et al., 1992:624)

Compsiluroides proboscis Chao et Sun, 1992；1171.
寄 主：
分 佈：湖南。

Crosskeya chrysos Shima et Chao 金色柯羅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1933)

Crosskeya chrysos Shima et Chao, 1988:353.
寄 主：
分 佈：雲南。

Crosskeya gigas Shima et Chao 巨柯羅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1933)

Crosskeya gigas Shima et Chao, 1988:349.
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

Crosskeya nigrotibialis Shima et Chao 黑脛柯羅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1933; Zhao et Zhou, 1992:1305)

Crosskeya nigrotibialis Shima et Chao, 1988:351.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Crossocosmia schineri Walker 梳脛飾腹寄蠅 (ASZI et al., 1978:203; Chao, 1963:37; Chao, 1964:883)
寄 主：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
Lymentria dispae Linnaeus 舞毒蛾。
國外記載有：
Lymentria dispae Linnaeus 舞毒蛾
樺蛾
Lophyrus sp.
分 佈：貴州、湖南、浙江、江蘇、陝西、吉林、黑龍江；歐洲(英國除外)。

Crossocosmia (Hertingia) tibialis Chao 柞蠶飾腹寄蠅 (ASZI et al., 1978:203; Chao, 1963:38; Wu et al., 1977: 382-396)
Crossocosmia (*Hertingia*) *tibialis* Chao, 1963:38.
寄 主：*Antheraea pernyi* Guérin-Méneville 柞蠶
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Lymentria dispae Linnaeus 舞毒蛾
彎尾毒蛾。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江。

Crossocosmia zebina Walker 蠶飾腹寄蠅 (ASZI et al., 1978:205; Chao, 1964:882; Cheng, 1981, 8(1):24-25; He et al., 1988:22; Wang et Liu, 1993, 9(3):143144)
寄 主：*Dendrolimus spectabilis* (Butler) 赤松毛蟲
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
Bombyx mori 家蠶(廣東)
Antheraea pernyi Guérin-Ménevillenn 柞蠶(貴州)
Andraca bipunctata 茶蠶
國外記載有：
Bombyx mori 家蠶
Andraca bipunctata 二點茶蠶
Cephonodes hylas 咖啡透翅天蛾
Papilio demoleus 柑橘鳳蝶
Lymentria dispae Linnaeus 舞毒蛾
Antheraea yamamai
Antheraea mylitta
Eupterote sp.
Trabana vishnu
分 佈：臺灣、全國、北京；日本。

Ctenophorcera pavida Meigen 藍黑櫛寄蠅 (ASZI et al., 1978:203; Chao, 1962:42; Shi, 1981(4):33)

寄 主：異常複雜

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Stilpnotia salicia 楊毒蛾

杠柳螟蛾

Latoia consocia (Walker) 褐邊綠刺蛾。

國外：

Vanessaa io 孔雀蛺蝶

Libythea celtis 朴喙蝶

Chaerocampa elpenor

Thaumatopoea processionea 歐洲帶蛾

Orgyia antiqua 古毒蛾

Orgyia ericae

Dasychira sellenitica

Nygmia phaeorrhea 棕尾毒蛾

Stilpnotia salicis 柳毒蛾

Lymantria dispar 舞毒蛾

Lymantria monacha 僧尼舞毒蛾

Malacosoma neustria 天幕毛蟲

Malacosoma neustria testacea 黃褐天幕毛蟲

Eriogaster lanestris 絨我枯葉蛾

Eriogaster catax

Dendrolimus pini 歐洲松毛蟲

Bombyx mori 家蠶

Attacus cynthia 小柏天蠶

Attacus lunula

Acronicta tridens 三齒劍紋夜蛾

Agrotis segetum 黃地老虎

Agrotis pronuba

Agrotis xanthographa

Agrotis stigmatica

Agrotis crassa

Amathes rhomboidea

Leucania unipuncta 粘蟲

Charaeas gaminis

Mamestra oleraceae 菜園夜蛾

Diloba coeruleocephala 刺芹夜蛾

Dryobota protea

Euplexia lucipara

Senta maritima

Acosmetia caliginosa

Taeniocampa miniosa

Taeniocampa gracilis

Panolis flammea 松夜蛾

Calymnia trapezina 肉食黃夜蛾
Calocampa solidaginis
Cucullia verbasei
Cucullia asteris
Heliothis dipsacea 鼠尾草夜
Plusia gamma Y 紋夜蛾
Larentia montanata
Abraxas grossulariata 醋栗尺蠖
Ennomos quercinaria
Gonodontis bidentata
Crocallis susciaria
Alsophila aescularia
Arctia caja 甘藍褐燈蛾
Pcmpguma baeticum
Hyphantria cunea 美國白蛾
Nola sp.
Zygaena lonicerae
Zygaena filipendulae 珍珠梅斑蛾
Loxostege stricticalis 草地螟
Acalla hastiana
Acalla ferrugana 樺梢卷葉蛾
Sparganothis pilleriana 葡萄長鬚卷葉蛾
Tortrix viridana 櫟綠卷葉蛾
Allantus cingillum

分 佈：福建、雲南、四川、浙江、陝西、河北。

Cuphocera frater Chao et Shi 紅尾缺須寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:248; Chao et Zhou, 1988:517)

Cuphocera frater Chao et Shi, 1982:248.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫、昌都、類烏齊)。

Cuphocera kuanyan Chao 寬顏缺須寄蠅 (Chao, 1979:156; Yunn., 1987:1259)

Cuphocera kuanyan Chao, 1979:156-157.

寄 主：

分 佈：廣東、雲南。

Cuphocera varia (Fabricius) 粘蟲缺鬚寄蠅 (ASZI, 1987, 2:691; Chao, 1962:36;1964:883; Chao et Liang, 1984:158; Chao et Shi, 1981(3):51; Chen, 1989:115; Chen et al., 1993:147; Fan, 1992:796; He et al., 1991:65; Hun., 1992:1197; Lu et Lan, 1983:247; Shi, 1981(4):33; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1992:635; Yu, 1983:46; Yunn., 1987:1259; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zong et al., 1984:248)

Peletieria varia Fabricius, 1794:327.
=*Jurinia angustiventris* Macquart, 1849:
=*Cyphocera pyrrogaster* Rondani, 1859:
=*Acuphocera sumatrensis* Townsend, 1926:

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎

Dendrolimus spectabilis Butler　赤松毛蟲
Mythimna separata (Walker)　粘蟲(幼蟲、蛹，重要天敵)
Mythimna loreyi (Duponchel)　勞氏粘蟲
國外：*Mythimna loreyi* (Duponckel)　勞氏粘蟲
重寄生蜂：*Brachymeria lasus* Walker　廣闊小蜂
蠅蛹錘角蜂
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；東洋區、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、昆士蘭、非洲、蘇聯、泰國、印度、尼泊爾、從地中海盆地到奧地利中部、歐洲。

Cylindromyia brassicaria (Fabricius) 斑鬚蜻筒腹寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:350)
Musca brasssicaria Fabricius, 1775:778.
=*Musca cylindrical* DeGeer, 1776:30.
=*Partheniaa boscii* Robineau-Desvoidy, 1830:231.
=*Phania sapporensis* Matsumura, 1916:400.
寄 主：
分 佈：山西。

Cylindromyia intermedia (Meigen) 中介筒腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2175)
Ocyptera intermedia Meigen, 1824:212.
=*Ocyptera cylindrica* (Fabricius) of Meigen, 1824:
=*Ocyptera excisa* Loew, 1845:
=*Ocyptera californica* Bigot, 1878:
=*Ocyptera boscii* Bezzi, 1907:
=*Ocyptera reinigi* Enderlein, 1934:
寄 主：
分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、烏克蘭、巴勒斯坦、法國、瑞士、歐洲北部。

Cylindromyia pandulata (Matsumura) 曲筒腹寄蠅 (Sun et al., 1992:637)
寄 主：
分 佈：湖南、貴州；日本。

Cyrtophleba ruricola (Meigen) 茹芮瑟寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2127)
Tachina ruricola Meigen, 1824:299.
=*Plagia ericetorum* Perris, 1852:
=*Cyrtophleba villosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Cyrtophleba buccata* Brauer et Bergenstamm, 1894:
=*Cyrtophleba asiatica* Mesnil, 1974:
寄 主：據記載：果紅裙扁身夜蛾
Apopestes spectrum
Euclidi glyphica
Caradrina taraxaci

Mamestr sereena
Euclidimerami
分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞南部、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英國、波蘭、瑞典。

Demoticus plebejus (Fallén) 普通迪寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2093)
Tachina plebejus Fallén, 1810:269.
寄 主：
分 佈：新疆；西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、英國、瑞士、德國、瑞典。

Dexia sacua Faccin 笨長足寄蠅 (Li, 1987:103)
寄 主：*Mimela testaceipes* Motschulsky 柳杉葉龜。
分 佈：遼寧。

Dolichocolon klapperichi Mesnil 粘蟲長芒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:692; Chao et Liang, 1984:110; Fan, 1992:763; He et al., 1991:65; Yunn., 1987:1230; Zhao et Zhou, 1992:1292)
Dolichocolon klapperichi Mesnil, 1968:176.
寄 主：*Andraca bipunctata* Walker 茶蠶
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、陝西、吉林；巴布亞新幾內亞、非洲、歐洲。

Dolichocolon paradoxum Braier-Bergenstamn 粘蟲長芒寄蠅 (Shi, 1981(4):33; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(蛹)。
分 佈：江西。

Dexiomimops fuscata Shima et Chao 暗色鄰長足寄蠅 (Xue et al., 1996, 12:2153)
Dexiomimops fuscata Shima et Chao, 1992:640-641.
寄 主：
分 佈：雲南。

Drino adiscalis (Chao et Shi) 裸腰贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1830)
Lydella adiscalis Chao et Shi, 1982:281.
寄 主：
分 佈：西藏。

Drino angustivitta Liang et Chao 狹帶贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1830)
Drino angustivitta Liang et Chao, *in* Xue et al., 1996, 2:1830-1832.
寄 主：
分 佈：海南。

Drino anricapita 金頭贅寄蠅 (Zhang et Zhou, 1996, 18(40:183)
寄 主：*Diprion jinyuanensis* 靖遠松葉蜂(幼蟲-蛹)。

分 佈：

Drino argenticeps (Macquart) 銀顏贅寄蠅 (Sun et al., 1992:626; Xue et al., 1996, 2:1830; Yunn.1987:1236)

Massicera argenticeps Macqurat, 1851:166.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東、貴州、雲南、四川；日本、馬來西亞、泰國、印度。

Drino atra Liang et Chao 暗黑贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1832)

Drino atra Liang et Chao, *In* Xue et al., 1996, 2:1832-1833.

寄 主：

分 佈：廣東、海南、廣西。

Drino auricapita Chao et Liang 金頭贅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:172; Xue et al., 1996, 2:1833)

Drino auricapita Chao et Liang, 1996:1833-1834.

寄 主：*Neodiprion sertifer* 松葉蜂

Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂。

分 佈：四川(西昌)、山西。

Drino auripollinis Chao et Liang 金粉贅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:171; Xue et al., 1996, 2:1835)

Drino auripollinis Chao et Liang, 1996:1835.

寄 主：

分 佈：湖南、貴州、雲南(瀘水)、山西。

Drion bancrofti (Crosskey) 班氏贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1835)

Patexorista bancrofti Crosskey, 1967:85.

寄 主：

分 佈：海南。

Drion bisetosa (Baranov) 雙頂鬃贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1838)

Sturmia bisetosa Baranov, 1932:75.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣東；馬來西亞。

Drino bohemica Mesnil 博赫贅寄蠅 (Xiao et al., 1991:96; Yunn., 1987:1237; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

別 名：*波希米亞贅寄蠅*。

寄 主：*Gilpinia virens* (Klug) 淡綠吉松葉蜂(幼蟲-蛹)。

分 佈：雲南。

Drino chatterjeeana Baranov 多脛毛贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:693; He et al., 1991:65; Yunn., 1987:1235)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

Mycalesis francisca perdiccas Hew. 稻黑眼蝶。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、安徽、北京；印度。

Drino ciliata (Wulp) 睫毛贅寄蠅 (Hun., 1992:1177; Xue et al., 1996, 2:1838)

Meigenia ciliata Wulp, 1881:38.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；斯里蘭卡、印尼、新幾內亞、澳洲、埃塞俄比亞區(非洲)、南非。

Drino curvipalpis (Wulp) 軟毛斑贅寄蠅 (Fan, 1992:769; Xue et al., 1996, 2:1838)

Crossocosomia curvipalpis Wulp, 1893:162.

=*Sturmia unisetosa* Baranov, 1932:

寄 主：*Phytometra gamma* Linnaeus 銀紋夜蛾。

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、河南、黑龍江；馬來西亞、泰國、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼(爪哇)、新幾內亞島、所羅門群島、澳洲。

Drino denssichaeta Chao et Liang 密毛贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1838)

Drino denssichaeta Chao et Liang, *In* Xue et al., 1996, 2:1838.

寄 主：

分 佈：雲南(瀘水)。

Drino discreta sinensis Mesn. 中華得剁寄蠅 (Chao, 1962:41)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：西南、華中。

Drino facialis (Twonsend) 狹顏贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:693; Chao et Liang, 1984: ; Chao et Zhang, 1982: 271; Chao et Zhou, 1988:522; 119; Fan, 1992:767; Hun., 1992:1177; Liu, Zhao et al., 1998:170; Xue et al., 1996, 2:1838; Yunn., 1987:1236; Zhao et Zhou, 1992:1301)

Sturmiodoria facialis Twonsend, 1928:392.

=*Sturmia latistylata* Baranov, 1932:79.

=*Drino albifacies* Townsend, *in* Mesnil, 1951:163.

寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶黃毒蛾。

分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、山西、北京；菲律賓、馬來亞、泰國、扎伊爾、印度、斯里蘭卡、印尼。

Drino flava Chao et Liang 黃腹贅寄蠅 (Hun., 1992:1177; Liu, Zhao et al., 1998:169; Sun et al., 1992:627; Xue et al., 19 2:1840)

Drino flava Chao et Liang, 1992:617; 1992:1177.

寄 主：

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、山西。

Drino hainanica Liang et Chao 海南贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1840)

Drino hainanica Liang et Chao, *in* Xue et al., 1996, 2:1840.

寄 主：

分 佈：海南(通什)、廣東。

Drino hersei Liang et Chao 天蛾贅寄蠅 (Hun., 1992:1178; Xue et al., 1996, 2:1840; Liu, Zhao et al., 1998:164)

Drino hersei Liang et Chao, 1992:1178-1179.
寄 主：*Acosmerycoides leucocraspis leucocraspis* (Hampson) 灰天蛾
Herse convolvuli (Linnaeus) 白薯天蛾。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、四川、山西、北京。

Drino hunanensis Chao et Liang 湖南贅寄蠅 (Sun et al., 1992:627)
寄 主：
分 佈：湖南。

Drino immersa (Walker) 截尾贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1840)
Masicera immersa Walker, 1859:124.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、海南；印尼、新幾內亞島。

Drino inconspicua (Meigen) 平庸贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:693; ASZI et al., 1978:206; Chao, 1964:882; Chao et Liang, 1984:120; Chao et Shi, 1981(3):50; Chao et Zhou, 1988:522; Chen, 1989:113; Fan, 1992:768; He et al., 1991:65; Hu et al., 1979:414; Hun., 1992:1179; Lu et Lan, 1983:247; Shi, 1981(4):33, 35, 36; Sun et al., 1992:627; Xue et al., 1996, 2:1845; Yu, 1983:45; Yu, 1995, 17(3):139; Yunn., 1987:1237; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183; Zhao et Zhou, 1992:1301)
Tachina inconspicua Meigen, 1830:369.
=*Tachina flavoscutellata* Zetterstedt, 1844:
=*Masicera curssitans* Rondani, 1861:
=*Sturmia lophyri* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Drino inusta* Mesnil, 1949:
=*Drino discreta* Mesnil, Chao, 1962: Misidentified
寄 主：*Antheraea pernyi* Guerin-Meneville 柞蠶
Dasychira baibaran Matsumura 茶黑毒蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus spectanilis (Butler) 赤松毛蟲
Dendrolimus supurans (Butler) 落葉松毛蟲
Ectropis grisescens Warren 茶尺蠖
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Dasychira axutha (Collenette) 松茸毒蛾
Dasychira baibaran Matsumura 茶黑毒蛾
Mythimna loreyi (Duponchel) 勞氏粘蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
Diprion frutetorum 松葉蜂
Gilpinia massoniana 馬尾松吉松葉蜂(幼蟲-蛹)
Neodiprion xianyunicus 祥雲新松葉蜂。
據記載：葉蜂
Diprion frutetorum
Diprion laricis
Diprion pallidus
Diprion pini 松葉蜂(普通鋸角葉蜂)

Diprion rufus
Gilpinia polytoma 雲杉葉蜂
Neodiprion sertifer 松銹鋸角葉蜂
鱗翅目：*Bupalus piniarius* 松尺蠖
Dendrolimus pini 歐洲松毛蟲
Helicoverpa obsoleta Hübner 棉鈴蟲
Laphygma exigua 甜菜夜蛾
Mythimna loreyi 勞氏粘蟲
Lymantria dispar 舞毒蛾
Lymantria monacha 模毒蛾
Ponolis flammea 松夜蛾
Spodoptera mauritia 白菜褐夜蛾
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、樟木、察隅)、四川、浙江、湖北、河北、北京、遼寧、黑龍江；西伯利亞南部、中亞、外高加索、歐洲北至瑞典和列寧格勒、印度。

Drino inconspicuoides (Baranov) 擬平庸贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1845)

Sturmia inconspicuoides Baranov, 1932:80.
寄 主：
分 佈：臺灣、海南。

Drino laetifica Mesnil 鈎突贅寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1537; Xue et al., 1996, 2:1845)

Drino laetifica Mesnil, 1950:158.
寄 主：
分 佈：廣東、四川；斯里蘭卡。

Drino laticornis Chao et Liang 寬角贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1845)

Drino laticornis Chao et Liang, 1996, 2:1845-1847.
寄 主：
分 佈：北京(青龍橋)。

Drino latiforceps Baranov 密毛贅寄蠅 (Yunn., 1987:1236; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

寄 主：*Neodiprion huizeensis* 會澤新松葉蜂(幼蟲-蛹)
分 佈：臺灣、海南、雲南。

Drino longicapilla Chao et Liang 長發贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1847)

Drino longicapilla Chao et Liang, *In* Xue et al., 1996, 2:1847.
寄 主：
分 佈：雲南(雲龍)。

Drino longicornis Chao et Liang 長角贅寄蠅 (Hun., 1992:1179; Sun et al., 1992:627; Xue et al., 1996, 2:1849)

Drino longicornis Chao et Liang, 1992:1179-1180.

寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南。

Drino longiforceps Chao et Liang 長尾贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1849)
Drino longiforceps Chao et Liang, *In* Xue et al., 1996, 2:1847-1849.
寄 主：松毛蟲。
分 佈：廣西、雲南(維西)、吉林。

Drino longihirta Chao et Liang 長毛贅寄蠅 (Hun.1992:1180; Liu, Zhao et al., 1998:168; Sun et al., 1992:627; Xue et al., 1996, 2:1849)
Drino longihirta Chao et Liang, 1992:1180.
寄 主：
分 佈：湖南、雲南、四川、山西、北京、吉林、黑龍江。

Drino longiseta Chao et Liang 長鬃贅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:165; Xue et al., 1996, 2:1849)
Drino longiseta Chao et Liang, 1996, *In* Xue et al., 1996, 2:1849-1850.
寄 主：
分 佈：雲南(金平)、山西。

Drino lota Meigen 蓮花贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1850; Zhao et Zhou, 1992:1302)
Drino lota Meigen, 1824:326.
寄 主：據記載：*Acronycta psi* Linnaeus 賽劍紋夜蛾
Acronycta tridens Schiff. 蘋三齒劍紋夜蛾
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶
分 佈：雲南；日本、西伯利亞、聖彼得堡、列寧格勒、北達愛爾蘭、蘇格蘭、挪威、瑞典南部。

Drino lucagus (Walker) 大毛斑贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1850)
Tachina lucagus Walker, 1849:768.
寄 主：
分 佈：廣東、海南、雲南；馬來西亞、泰國、巴基斯坦、新幾內亞島、澳洲。

Drino lugens Mesnil 憂郁贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:694; Chao et Liang, 1984:118; Fan, 1992:767)
Drino lugens Mesnil, 1944:16.
寄 主：灰天蛾。
分 佈：福建、廣西、四川、北京；印尼(爪哇)。

Drino minuta Liang et Chao 小型贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1850)
Drino minuta Liang et Chao, 1996, *In* Xue et al., 1996, 2:1850-1852.
寄 主：
分 佈：廣東(湛江)。

Drino parafacialis Chao et Liang 鄰狹顏贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1852)
Drino parafacialis Chao et Liang, *In* Xue et al., 1996, 2:1852-1853.

寄 主：
分 佈：四川、浙江(天目山)。

Drino picta (Baranov) 繡帶贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:694; Zhao et Zhou, 1992:1302)
Drino picta (Baranov, 1934:)
別 名：*黑條異叢毛寄蠅*。
寄 主：袋蛾。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、江蘇、安徽、北京；菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Drino pollinosa Chao et Liang 厚粉贅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:166; Xue et al., 1996, 2:1853)
Drino pollinosa Chao et Liang, 1996, *In* Xue et al., 1996, 2:1853-1856.
寄 主：
分 佈：山西、北京(三堡)、內蒙古。

Drino pruinosa Chao et Liang 黃粉贅寄蠅 (Sun et al., 1992:627)
寄 主：
分 佈：湖南、貴州。

Drino subanajama (Townsend) 蘇巴贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1856)
Prosturmia subanajama Townsend, 1927:69.
寄 主：松葉蜂(甘肅)
據記載：劍紋夜蛾
分 佈：海南、甘肅。

Drino unisetosa Baranoff 軟毛斑贅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:695; Chao et Liang, 1984:121; He et al., 1991:66; Shi, 1981(4):33, 38; Yunn., 1987:1236; Zhao et Zhou, 1992:1301)
Drino unisetosa Baranoff, 1932:
寄 主：*Chilo infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Phytometra gamma Linnaeus (=*Plusia agnata* Staudinger) 銀紋夜蛾
Mycalesis gotama 稻眼蝶。
分 佈：臺灣、江西、廣東、雲南、四川、河南、北京、黑龍江；印尼(爪哇)。

Drino wuzhi Liang et Chao 五指贅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1856)
Drino wuzhi Liang et Chao, *In* Xue et al., 1996, 2:1856.
寄 主：
分 佈：海南(五指山)。

Drinomyia bicoloripes Mesnil 雙色綴密寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:520)
Drinomyia bicoloripes Mesnil
寄 主：

分 佈：西藏(波密)、北京。

Drinomyia hokkaidensis (Baranov) 北海道追諾寄蠅 (Sun et al., 1992:624, Xue et al., 1996, 1:1745)

Vibrissina hokkoidensis Baranov, 1935:554.

寄 主：

分 佈：貴州、西藏、北京；朝鮮、日本、蘇聯(遠東)。

Echinemoraea echinata (Mesnil) 刺腹艾寄蠅 (Chao et Shi, 1985:163; Xue et al., 1996, 2:2028)

Nemoraea echinata Mesnil, 1953:154.

寄 主：

分 佈：四川(峨眉山)；緬甸、印度。

Elfriedella amoena Mesnil 長尾埃爾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2120; Yunn., 1987:1252; Zhao et Zhou, 1992:1334)

Elfriedella amoena Mesnil, 1957:69.

寄 主：

分 佈：雲南；日本。

Elodia ambulatoria (Meigen) 粉帶伊樂寄蠅 (Fan, 1992:774; Xue et al., 1996, 2:1939)

Tachina ambulatoria Meigen, 1824:407.

=*Tchina convexifrons* Zetterstedt, 1844:

=*Arrhinomyia cloacellae* Kramer, 1910:

寄 主：*Nephopteryx pirivorella* Matsumura 梨大食心蟲(梨雲翅斑螟)。

國外：*Scardia boleti*

Tinea cloacella 木塞谷蛾

Tinea parasitella

Tinea nigralbella

分 佈：河北、天津；蒙古、外高加索、聖彼得堡、巴勒斯坦、英國、瑞典。

Elodia convexifrons Zetterstedt 粉帶伊樂寄蠅 (ASZI, 1987, 2:695; Chao et Liang, 1984:126; Shi, 1981(4):35)

寄 主：*Nephopteryx pirivorella* Matsumura 梨大食心蟲(梨雲翅斑螟)。

國外：*Scardia boleti*

Tinea cloacella

Tinea ngralbella

Tinea parasitella

分 佈：河北、天津；歐洲。

Elodia morio (Fallén) 亮黑伊樂寄蠅 (ASZI, 1987, 2:695; Fan, 1992:775)

Tachina morio Fallén, 1820:18.

=*Elodia tragica* Meigen, 1824:

=*Roeselia atricula* Pandellé, 1896:

=*Elodia subfasciata* Aldrich, 1933:

寄 主：蘋果捲葉蛾

梨小食心蟲

Nephopteryx pirivorella Matsumura 梨大食心蟲(梨雲翅斑螟)。

國外：*Acrobasis consociella*
Acalla mocana
Cacoecia rosana
Carpocapsa pomonella
Cerostoma persicella
Cydia pomonella
Cydia servillana
Depressaria ocellana
Epiblema semifuscana
Epiblema sordidans
Eucosma serdidana
Laspeyresia servillana
Peronea hastiana
Peronea maccana
Polychrosis botrana
Semasis diniana
Semasis rufimitrana
Tachyptilia populella
Tinea lapella
Tortrix viridana
櫟峰斑螟
櫟綠捲蛾
落葉松線小捲蛾
蘋蠹蛾
山楊麥蛾
哈氏長翅捲蛾。

分 佈：河北、北京、天津、新疆、遼寧；日本、蒙古、西伯利亞、聖彼得堡、法國、德國北部、瑞典、摩洛哥。

Elodia tragica Meigen 亮黑伊樂寄蠅 (Chao et Liang, 1984:126; Shi, 1981(4):35)

寄 主：*Laspeyresia pomonella* Linnaeus 蘋果小捲蛾
Nphoteryx pirivorella Matsumura 梨大食心蟲。
國外：*Acalla macana*
Acrobasis consociella
Cacoecia rosana
Carpocapsa pomonella 蘋果小卷蛾
Cerostoma persicella
Cydia pomonella
Cydia servillana
Depressaria ocellana
Epiblema semifuscana
Epiblema sordidana
Euosma sordidana
Laspeyresia servillana

Peronea hastiana
Peronea maccana
Polychrosis botrana
Semasis dinians
Semasis rufimitrana
Tachyptilia populella
Tinea lapella
Tortrix viridana

分 佈：天津、北京、新疆、遼寧；摩洛哥、歐洲。

Eophyllophila elegans Townsend 華麗鷸寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:70; Xue et al., 1996, 2:1737; Yunn., 1987:1211; Zhao et Zhou, 1992:1284)

Eophyllophila elegans Townsend, 1926:19.

寄 主：

分 佈：雲南、山西、黑龍江；朝鮮、日本、越南、緬甸、印尼。

Eophyllophila filipes Townsend 非利鷸寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1533; Hun., 1992:1173; Liu, Zhao et al.., 1998:69; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 2:1737; Zhao et Zhou, 1992:1284)

Eophyllophila filipes Townsend, 1927:283.

別 名：*細足鷸寄蠅*。

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、山西；馬來西亞、印度、尼泊爾。

Epicampocera succincta (Meigen) 縊蛹毛蟲寄蠅 (Hun., 1992:1175; Sun et al., 1992:626; Xue et al., 1996, 2:1878)

Tachina succincta Meigen, 1824:335.

寄 主：國外：*Pieris rapae* Linnaeus　小菜粉蝶
Pieris napi Linnaeus
Boarmia selenaria Schiff.

分 佈： 湖南、四川、河北、吉林、黑龍江；日本、千島群島、外高加索愛爾蘭、蘇格蘭、挪威、芬蘭。

Eriothrix apennina (Rondani) 亞平寧緣刺寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:325)

Rhynchista apennina Rondani, 11862:164.
Olivieria latifrons Brauer, 1898:529.

寄 主：

分 佈：山西；哈薩克斯坦、外高加索、烏克蘭、巴勒斯坦、摩洛哥、意大利、法國、南斯拉夫。

Eriothrix furvus (Kolomiets) 褐色刺寄蠅 (Zhao et Zhou, 1996:264)

Eriothrix furvus (Kolomiets, 1967:253.)

寄 主：

分 佈：新疆；西伯利亞。

Eriothrix micronyx Stein 微毛緣刺寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:326)

Eriothrix micronyx Stein, 1924:1173.

Eriothrix zimini Klomiets, 1967:258.

寄 主：

分 佈：山西；西伯利亞、奧地利。

Eriothrix nitidus Kolomiets 亮緣刺寄蠅 (Chao et Shi, 1982:237; Liu, Zhao et al., 1998:324; Xue et al., 1996, 2:2123; Zhao et Zhou, 1992:1338; 1996:264)

Eriothrix nitidus Kolomiezs, 1967:256.

寄 主：

分 佈：西藏(類烏齊桑多)、山西、新疆；外貝加爾、西伯利亞、外高加索。

Eriothrix prolixa (Meigen) 曲條緣刺寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2123)

Tachina prolixa Meigen, 1842:363.

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、赤塔、西伯利亞、外高加索、法國、英國、瑞士、瑞典、挪威。

Eriothrix rufomaculata (De Geer) 紅斑緣刺寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:327; Xue et al., 1996, 2:2123)

Musca rufooomaculata De Geer, 1776:28.

寄 主：

分 佈：山西、內蒙古；西伯利亞、外高加索、巴勒斯坦、德國、英國、瑞典。

Ernestia flavovilosa (Zimin) 黃毛埃內寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2067)

Meriania flavovilosa Zimin, 1960:734.

寄 主：

分 佈：四川、浙江、上海。

Ernestia melanopyga (Zimin) 黑尾埃內寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:297)

Meriania melanopyga Zimin, 1960:730.

寄 主：

分 佈：山西；日本、國後島、蒙古、俄羅斯(遠東地區)。

Ernestia rudis (Fallén) 野黃埃內寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2067)

Tachina rudis Fallén, 1830:68.

寄 主：據記載：*Panolis griseovariegata*

Taeniocampa stabilis

八字地虎

Dendrolimus pini

模舞毒蛾

Gnopphria rubricollis

Polyloca flavicornis

櫟尖翅蛾

分 佈：內蒙古、黑龍江；日本、蒙古、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、塔吉克斯坦、歐洲北部到愛爾蘭、瑞士中部。

Ernestia sulciforceps (Zimin) 窄且埃內寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2067)
Meriania sulciforceps Zimin, 1960:732.
寄 主：
分 佈：遼寧、蘇聯。

Ernestia vagens (Mesnil) 裸顏埃內寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2067)
Tachina vagens Mesnil, 1824:248.
Ernestia lapponica Ringdahl, 1945:
寄 主：
分 佈：吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲中部和北部。

Erycia festinans (Meigen) 飛埃里寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:193; Xue et al., 1996, 2:1881)
Tachina festinans Meigen, 1824:324.
寄 主：
分 佈：山西、遼寧、吉林；西伯利亞、法國、瑞士、瑞典。

Erycilla cinerea Chao et Liang 灰粉蜆寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1921)
Erycilla cinerea Chao et Liang, 1982:79.
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Erycilla flavipruina Chao et Liang 黃粉蜆寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:222; Xue et al., 1996, 2:1921)
Erycilla flavipruina Chao et Liang, 1982:78-81.
寄 主：
分 佈：山西、北京、遼寧；日本、俄羅斯遠東地區、意大利、瑞士。

Erycilla rutila (Meigen) 金色蜆寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1921)
Tachina rutila Meigen, 1824:
Erycilla amoena Mesnil, 1957:
寄 主：
分 佈：北京、遼寧；日本、俄羅斯遠東地區、意大利、瑞士。

Erynnia ocypterata Fallén 星毛蟲伊寄蠅 (ASZI, 1987, 2:696)
寄 主：梨星毛蟲。
分 佈：遼寧；歐洲。

Erythrocera genalis (Aldrich) 窄頰赤寄蠅 (Hun., 1992:1192; Yunn., 1987:1241; Zhao et Zhou, 1992:1290)
Erythrocera genalis (Aldrich, 1928:)
寄 主：*Popillia japonica* Newman 日本弧麗金龜。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川；日本。

Erythrocera hunanensis Chao et Zhou 湖南赤寄蠅 (Hun., 1992:1192)

Erythrocera hunanensis Chao et Zhou, 1992:1192.

寄 主：

分 佈：湖南。

Ethilla aemula (Meigen) 角逐拱瓣寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:122; Xue et al., 1996, 1:1762)

Tachina aemula Meigen, 1824:332.
Tachina arvicola Meigen, 1824:338.
Exorista fractiseta Rondani, 1859:124.

寄 主：

分 佈：山西、河北、北京、新疆；烏茲別克斯坦、外高加索、捷克、意大利、法國、瑞士、奧地利、德國。

Eugymnopeza imparilis Herting 伊姆優寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2118)

Eugymnopeza imparilis Herting, 1973:36.

寄 主：

分 佈：北京；蒙古。

Eumea linearicornis (Zetterstedt) 長角尤寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:217; Zhao et Zhou, 1992:1289)

Tachina linearicornis Zetterstedt, 1844:1118.
=*Tachina westwermanni* Zetterstedt, 1844:1120.
=*Tachina cornuta* Zetterstedt, 1844:1121.
=*Tachina spernenda* Zetterstedt, 1844:1122.
=*Exirusta levis* Macquart, 1849:389.
=*Exorista flavifrons* Macquart, 1849:400.
=*Exorista volatica* Macquart, 1849:414.
=*Masicera lutescens* Macquart, 1850:461.
=*Masicera flavifrons* Macquart, 1850:465.
=*Masicera palustris* Macquart, 1850:485.
=*Eumea locuples* Robineau-Desvoidy, 1863:303.
=*Phryxe aurifacies* Robineau-Desvoidy, 1863:329.
=*Phryxe rustica* Robineau-Desvoidy, 1863:335.
=*Phryxe subtilis* Robineau-Desvoidy, 1863:335.
=*Parexorista magnicoris* Brauer et Bergenstamm, 1891:320, 326.
=*Exorista temera* (Meigen) of Pandellé, 1896:27.
=*Parexorista tinctippennis* Hendel, 1901:205.

別 名：*長角歐密寄蠅*。

寄 主：據記載有：*Cucullia prenanthis* B. 冬夜蛾
Calymnia affinis Linnaeus 楡兜夜蛾

分 佈：雲南、山西；日本(北海道)，千島、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、列寧格勒、歐洲向北達英格蘭、瑞典中部。

Eumea mitis (Meigen) 柔毛歐密寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:219)

Tachina mitis Meigen, 1824:335.
Exorista ardens Macquart, 1849:389.
Phryxe nigrita Robineau-Desvoidy, 1863:330.

寄 主：*Spilomota lariciana* Heineman 松白小捲蛾。

據記載：*Calymnia trapezina* Linnaeus　肉食黃夜蛾
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Laspeyresia pomonella Linnaeus　蘋小捲蛾
Loxostege sticticalis Linnaeus　黃緣條螟
Ostrinia nubilalis (Hübner)　玉米螟
Taeniocampa gracilis Fabricius
分 佈：山西、遼寧、黑龍江；日本、西伯利亞、外高加索、英國、瑞典。

Eumeella latifrons Chao et Zhou 寬額攸迷寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1930; Zhao et Zhou, 1996:256)
Eumeella latifrons Chao et Zhou, 1996:
寄 主：
分 佈：青海。

Eurysthaea scutellaris Robineau-Desvoidy 寬盾攸寄蠅 (ASZI, 1987, 2:696; ASZI et al., 1978:207; Chao et Liang, 1984:128; Fan, 1992:775; Shi, 1981(4):35; Xue et al., 1996, 2:1938)
Eurysthaea scutellaris Robineau-Desvoidy, 1848:438.
Roeselia yponomeutae Rondani, 1861:
Thryptocera cognata Schiner, 1862:
Discochaeta hyponomeutae Stein, 1924:
Discochaeta braueri Townsend, 1933:
寄 主：*Hyponomeuta malinella* Zeller　蘋果巢蛾。
國外：*Abraxas adustata*
Abraxas pantaria
Bupalus piniarius
Cacoecia rosana
Cocoecia selten
Cocoecia xylosteana
Collix sparsata
Eupithecia succenturiata
Hylophila prasinana
Hypena rostralis Linnaeus　長須夜蛾
Hyponomeuta cognatellus Hübner　衛矛巢蛾
Hyponomeuta evonymellus Linnaeus　稠李巢蛾
Hyponomeuta malinella Zeller　蘋果巢蛾
Hyponomeuta padellus
Hyponomeuta rorellus Hb.
Hyponomeuta rostralis Linnaeus
Sparganothis pilleriana
Tortrix viridana
葡萄長鬚捲蛾
櫟綠捲蛾
長鬚夜蛾
分 佈：江蘇、上海、黑龍江；外高加索、意大利、比利時、法國、英格蘭、柏林。

Eurithia anthophila (Robineau-Desvoidy) 採花廣顏寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:247; Hun., 1992:1200; Liu, Zhao et al., 1998:300; Sun et al., 1992:637; Xue et al., 1996, 2:2075; Yunn., 1987:1275; Zhao et Zhou, 1992:1334)

Erigone anthophila Robineau-Desvoidy, 1830:66.
Musca radicum (Linnaeus) of Fabricius, 1794:326.
Tachina bifasciata Meigen, *in* Fabricius, 1805:300.
Tachina lurida (Fabricius) of Fallén, 1810:270.
Erigone scutellaris Robineau-Desvoidy, 1830:66.
Eurithia intermedia Zetterstedt, 1844:1114.
Tachina crisia Walker, 1849:738.

寄 主：據記載：*Lophopteryx camelina* Linnaeus 駱駝舟蛾
Mamestra persicariae Linnaeus 白臀灰夜蛾
Spilosoma lubricipeda Esp. 黃腹麻燈蛾
Spilosoma menthastri Esp. 星白燈蛾

分 佈：湖南、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山西、內蒙古、吉林；日本、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、法國、愛爾蘭、瑞典。

Eurithia breviunguis Chao et Shi 短爪廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:79; Chao et Zhang, 1982:247; Xue et al., 1996, 2:2075)

Eurhthia breviunguis Chao et Shi, 1981:79.

寄 主：

分 佈：西藏(札達)。

Eurithia caesia (Fallén) 幵夏廣頻寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2075)

Tachina caesia Fallén, 1810:280.

寄 主：據記載：*Dianthoecia caesia*
Dianthoecia capsincola
Dianthoecia carpophaga
Agrotis pronuba

分 佈：西藏、新疆、內蒙古、黑龍江；歐洲。

Eurithia castellana (Strobl) 卡斯廣頻寄蠅 (Zhao et Zhou, 1996:263)

Eurythia castellana (Strobl, 1906:338-339.)

寄 主：

分 佈：新疆；外高加索、以色列。

Eurithia connivens (Zetterstedt) 望天廣顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2075; Yunn., 1987:1275; Zhao et Zhou, 1992:1333)

Tachina connivens Zetterstedt, 1844:1116.

寄 主：國外：*Euplexia lucipara* Linnaeus 白臀夜蛾。

分 佈：雲南、西藏、四川、河北、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；西伯利亞、英國、德國、歐洲中部及北部。

Eurithia consobrina (Meigen) 對眼廣顏寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:248; Liu, Zhao et al., 1998:301; Xue et al., 1996, 2:2075)

Tachina consobrina Meigen, 1824:248.
Tachina recta Meigen, 1824:257.

Erigone myophoroides Robineau-Desvoidy, 1830:67.
Eurythia tesselana Robineau-Desvoidy, 1830:67.
Eurythia viridulans Robineau-Desvoidy, 1830:68
Nemoraea osror Macquart, 1848:115.
Nemoraea setosa Macquart, 1848:116.
Eurythia reformata Rondani, 1859:79.
Fausta cgrtsuba Robineau-Desvoidy, 1863:161.
Erigone sedula Robineau-Desvoidy, 1863:161.
Erigone divergens Braauer, 1898:536.
Platychira atripalpis Villeneuve, 1936:5.
寄 主：
分 佈：西藏、山西、新疆、內蒙古、黑龍江；庫頁島、西伯利亞、聖彼得堡、塔吉克斯坦、法國、德國、奧地利、愛爾蘭、蘇格蘭、瑞典。

Eurithia excellens Zimin 棒鬃廣顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2075)
Eurithia excellens Zimin, 1957:532.
寄 主：
分 佈：河北、吉林、黑龍江；古北區東部。

Eurithia globiventris Chao et Shi 腹球廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:76; Xue et al., 1996, 2:2075)
Eurithia globiventris Chao et Shi, 1981:76.
寄 主：
分 佈：新疆。

Eurithia heilongjiaga Chao et Shi 黑龍江廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:79; Xue et al., 1996, 2:2075)
Eurithia heilongjiana Chao et Shi, 1981:79.
寄 主：
分 佈：黑龍江。

Eurithia intermedia (Zetterstedt) 中介廣顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2075; Zhao et Zhou, 1996:263)
Tachina intermedia Zetterstedt, 1844:1114.
寄 主：
分 佈：西藏、新疆；西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英格蘭、瑞士、瑞典、芬蘭。

Eurithia nigripennis Chao et Shi 黑翅廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:75; Chao et Zhang, 1982:246; Xue et a., 1996, 2:2082; Zhao et Zhou, 1992:1333)
Eurithia nigripennis Chao et Shi, 1982:75.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(吉隆)、四川。

Eurithia nigronitida Chao et Shi 亮黑廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:77; Xue et al., 1996, 2:2082; Yunn., 1987:1275)
Eurythia nigronitida Chao et Shi, 1981:75.
寄 主：
分 佈：雲南。

Eurithia shanxiensis Chao et Liu 山西廣顏寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:299)
Eurithia shanxiensis Chao et Liu
寄 主：
分 佈：山西。

Eurythia tadzhica Zimin 塔吉克廣顏寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:247; Xue et al., 1996, 2:2082; Zhao et Zhou, 1992:1333)
Eurythia tadzhica Zimin, 1957:522.
寄 主：
分 佈：西藏(江達)、新疆；蘇聯。

Eurythia trichocalyptera Chao et Shi 毛瓣廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:76; Chao et Zhang, 1981:247; Xue et al., 1996, 2:2082; Yunn., 1987:1274; Zhao et Zhou, 1992:1333)
Eurythia trichocalyptera Chao et Shi, 1982:76.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(芒康)、四川。

Eurythia tuberculata Chao et Shi 疣突廣顏寄蠅 (Chao et Shi, 1981:81; Chao et Zhang, 1982:248; Xue et al., 1996, 2:2082; Zhao et Zhou, 1992:1333)
Eurythia tuberculata Chao et Shi, 1982:81.
寄 主：
分 佈：西藏(芒康)、四川。

Eurithia vivida (Zetterstedt) 雙尾廣顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2082; Zhao et Zhou, 1992:1333)
Tachina vivida Zetterstedt, 1838:642.
寄 主：
分 佈：四川、新疆、黑龍江；蘇聯、歐洲北部。

Eutrixopsis javana Townsend 爪哇合眼寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2041)
Eutrixopsis javana Townsend, 1919:166.
寄 主：
分 佈：廣西；日本、馬來西亞、爪哇。

Everestiomyia antennalis Townsend 斧角珠峰寄蠅 (Chao et Shi, 1982:246; Xue et al., 1996, 2:2066; Yunn., 1987:1274; Zhao et Zhou, 1992:1333; 1996:263)
Everestiomyia antennalis Townsend, 1933:466.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(日土)、四川、青海(瑪多)、新疆；日本。

Exorista amoena Mesnil 毛蟲追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:697; ASZI et al., 1978:213; Chao et Liang, 1984:63; Chao et Zhang, 1982:261; Hu, 1983:288; Shi, 1981(4):36, 37; Tian et al., 1993, 15(4):156)
寄 主：*Clostera anastomosis* Linnaeus 分月扇舟蛾(幼蟲、蛹)
Dicrenura lanigera Butler 小雙尾舟蛾
Leucoma selicis Linnaeus 楊毒蛾

Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus　天幕毛蟲
Melalopha anachoreta Fabricius　白楊舟蛾
Narosoideus flavidorsalis (Staudinger)　梨刺蛾
楊扇舟蛾
小黑帶舟蛾
Pieris rapae Linnaeus　菜粉蝶。

分 佈：雲南、西藏(察雅)、江蘇、河北、天津、北京、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(海林)；蘇聯(塔吉克)。

Exorista antennalis Chao 短角追寄蠅 (Chao, 1964:366; Xue et al., 1996, 2:1672)

Exorista antennalis Chao, 1964:366.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Exorista aureiforns (Baranov) 飾額追寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1529; Xue et al., 1996, 2:1672; Yunn., 1987:1197; Zhao et Zhou, 1992:1271)

Eutacjoma aureiforns Baranov, 1936:107.

別 名：*金額追寄蠅*。

寄 主：

分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、所羅門群島。

Exorista bisetosa Mesnil 雙鬃追寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:518; Xue et al., 1996, 2:1672)

Exorista bisetosa Mesnil, 1940:39.

寄 主：

分 佈：廣西、西藏(墨脫)、江蘇、上海、山東、河北、北京；日本。

Exorista brevihirta Liang et Chao 短毛追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1672)

Exorista brevihirta Liang et Chao, 1992:213-214.

寄 主：

分 佈：廣東。

Exorista cantans Mesnil 坎坦追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1672)

Exorista cantans Mesnil, 1960:574-575.

寄 主：

分 佈：福建、廣東、北京；日本。

Exorista cephalopalpis Chao (Chao, 1964:365)

Exorista cephalopalpis Chao, 1964:365.

寄 主：

分 佈：臺灣、廣西。

Exorista civilis (Rondani) 傘裙追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:697; ASZI et al., 1978:213; Chao, 1964:880; Chao et Liang, 1984:65; Chao et Shi, 1981(3):51; Chen, 1989:114; Cui, 1992:292; Dai, 1992:42; Fan, 1992:732; Liu et Li, 1986:91; Liu, Zhao et al., 1998:88; Lu, 1976, 13(1):19-20; Shi, 1981(4):34, 35, 36; Wu et al., 1989:161; Xiao, 1985(2):27; Xue et al., 1996, 2:1672; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183; Zhou, 1981, 3(1-2):32-33; Zhao et Zhou, 1996:252)

Tachina civilis Rondani, 1859:199.
Tachina erucarum (Rondani) of Belanovaky, 1931:28.
Tachina cinerascens Belanovsky, *In* Zverezomb-Zubovsky, 1931:159.
Tachina nigroscutellata Belannovsky, 1937:218.

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲
Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾
小柏天蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 草地螟(甜菜網野螟)
Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾
Neodiprion zhejiangensis 浙江黑松葉蜂(幼蟲)
國外：*Agrotis occulta*
Loxostege sticticalis 草地螟
Ostrinia nubilalis (Hübner) 玉米螟
Polia oleraceae 菜園夜蛾
黃綠條螟

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、上海、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、山西、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、赤塔、庫頁島、烏克蘭、中亞、外高加索、地中海、歐洲中部。

Exorista fallax Meigen 紅尾追寄蠅 (ASZI et al., 1978:213; Chao, 1962:39; 1964:880; Ma et al., 1988, 4(1):25-28; Shi, 1981(4):33, 36)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
葎草舟蛾
榆鳳蝶。
國外：*Chloridea dipsacea* 苜蓿夜蛾
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Nygmia phaeorrhoea 棕尾毒蛾

分 佈：臺灣、廣東、雲南、河南、內蒙古、遼寧；蒙古、烏克蘭、歐洲、埃及、羅得西亞、馬達加斯加。

Exorista fasciata (Fallén) 條紋追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:697; ASZI et al., 1978:214; Chao, 1964:879; Chao et Liang, 1984:66; Chen, 1989:115; Fan, 1992:733; Liu, Zhao et al., 1998:90; Shi, 1981(4):36, 37, 38, 39; Shu et Yu, 1985:93; Xue et al., 1996, 2:1672; Zhao et Zhou, 1992:1277)

Tachina fasciata Fallén, 1820:5.
Tachina illustris Meigen, 1824:293.

Tachina macrocera Robineau-Desvoidy, 1830:189.
Tachina nitidiventris Zetterstedt, 1859:6071.
Baumhaueria grandis Egger, 1861:213.
Tachina albifrons Rondani, 1865:214.
Tachina impotens Rondani, 1865:214.
Tachina latifrons Rondani, 1865:215.

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 黃褐天幕毛蟲
Narosoideus flavidorsalism (Staudinger) 梨刺蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(蛹)
櫟角尺蠖。
國外：*Arctia caja* Linnaeus
Arctia hebe
Arctia maculosa
Cosmotriche potatoria Linnaeus 牧草枯葉蛾
Dasychira groenlandica Walker
Deilephila hippohaes
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Ennomos erosaria
Eriogaster lanestris Linnaeus 絨毛枯葉蛾
Euclidia triguetra
Euproctis chryssorrhoea
Lasiocampa quereus Linnaeus 櫟枯葉蛾
Lasiocampa frifolii Schiff.
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 模舞毒蛾
Macrothylaeia rubi Linnaeus 樹莓枯葉蛾
Malacosoma castrensis
Melitaea athalia
Nygmia phaeorrhaea 棕尾毒蛾
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Orgyia media Linnaeus
Parnassius apollo Linnaeus 阿波羅絹蝶
Phragmatobia juliginosa Linnaeus 亞麻燈蛾
Zygaena filipendulae Linnaeus
Zygaen trifolii Esp.

分 佈：廣東、西藏、四川、安徽、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯(西伯利亞南部)、非洲北部、意大利、法國、捷克、斯洛伐克、斯堪的納維亞半島、德國、英格蘭、瑞典。

Exorista fortis Chao 強壯追寄蠅 (Chao, 1964:364; Xue et al., 1996, 2:1675)

Exorista fortis Chao, 1964:372.
寄 主：
分 佈：浙江(黃山、天目山)。

Exorista frons Chao 突額追寄蠅 (Chao, 1964:370; Xue et al., 1996, 2:1675)
Exorista frons Chao, 1964:370-372.
寄 主：
分 佈：北京、遼寧(風城)。

Exorista fuscihirta Chao et Liang 褐毛追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1675)
Exorista fuscihirta Chao et Liang, 1992:212.
寄 主：
分 佈：雲南。

Exorista fuscipennis Baranov 棕肛追寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:517; Liu, Zhao et al., 1998:91; Xue et al., 1996, 2:1675; Yunn., 1987:1198)
Exorista fuscipennis Baranov, 1932:90.
別 名：*褐翅追寄蠅*。
寄 主：
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、陝西、山西、北京、遼寧；日本、越南。

Exorista grandiforceps Chao 寬肛追寄蠅 (Chao, 1964:368; Xue et al., 1996, 2:1675; Zhao et Zhou, 1992:1274)
Exorista grandiforceps Chao, 1964:368-369.
寄 主：
分 佈：廣西(龍勝天坪山)、雲南。

Exorista hainanensis Chao et Liang 海南追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1675)
Exorista hainanensis Chao et Liang, 1992:212.
寄 主：
分 佈：海南。

Exorista hamilis Mesnil 筒須追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:698; Chao et Liang, 1984:63; Xia, 1990:45; Yunn., 1987:1198)
寄 主：*Chalioides kondonsis* Matsumura 橘白袋蛾
Mahasena colona Sonan 茶褐袋蛾
Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾。
分 佈：廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、山東、河北；日本。

Exorista hyalipennis (Baranov) 透翅追寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:260; Chao et Zhou, 1997:1530; Hun., 1992:1163; Sun et al., 1992:620; Xue et al., 1996, 2:1675; Zhao et Zhou, 1992:1278)
Eutachina hyalipennis Baranov, 1932:88.
寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(吉隆)、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、北京、遼寧；日本、越南。

Exorista intermedius Chao et Liang 中介追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1675; Zhao et Zhou, 1992:1271)

Exorista intermedius Chao et Liang, 1992:214.

寄 主：

分 佈：雲南、四川。

Exorista japonica (Townsend) 日本追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:699; ASZI et al., 1978:215; Chang et al., 1954: 142; Chao, 1962:39; 1964:879; Chao et Liang, 1984:67; Chao et Shi, 1981(3):51; Chao et Zhou, 1997:1531; Chen, 1989:115; Chen et al., 1993:148; Chou et al., 1994:328; Fan, 1992:733; He et al., 1991:66; Hun., 1992:1163; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu, Zhao et al., 1998:92; Lu et Lan, 1983:247; Shi, 1981 (4):33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 1981, 24(3):342; Shu et Yu, 1985:93; Sun et al., 1980(4):22; Sun et al., 1984:110; Wu et al., 1989:162-163; Xiao, 1985(2):27; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yu, 1983:46; Yu, 1995, 17(3):138; Yunn., 1987:1201; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

Tachina japonica Townsend, 1909:247.

Tachina nakanensis Matsumura, 1916:

Eutachina tenuiforceps Raranov, 1932:

寄 主：*Algedonia coclesalis* Walker 竹織葉野螟

Ascotis selenaria Schiffermüller et Denis 大造橋蟲

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

Dendrolimus spectabilis Butler 赤松毛蟲

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲

Dendrolimus sibiricus Tschetwerikow 西伯利亞松毛蟲

Euproctis flava (Bremer) 折帶黃毒蛾

Euproctis conspersa Bulter 茶黃毒蛾

Narosoideus flavidorsalis (Staudinger) 梨刺蛾

Helicoverpa armigera (Hübner) 銀紋夜蛾

Histia rhodope nigrinus Jarden 重陽木斑蛾

Hyphatria cunea Dyury 美國白蛾(秋幕毛蟲)

Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾

Mythimna loreyi (Duponche) 勞氏粘蟲

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Mythimna copta 白脈粘蟲

Leucoma salicis (Linnaeus) 楊毒蛾

Lymantria dissoluta Swinhoe 條毒蛾

Melalopha anachoreta Fabricius 白楊舟蛾

榆毒蛾

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟

Ostrenia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟

Pantana phyllostachysae Chao 剛竹毒蛾

Euproctis cryptosticta Collenette 蓖麻黃毒蛾

舟形毛蟲

Simyra albovenata Goege 稻毛蟲

Stilpnotia ochropoda Eversmann 榆毒蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Mycalesis gotama 稻眼蝶
Diprion nanhuaensis 南華松葉蜂(幼蟲)
日本：*Clania minuscula* Butler 小袋蛾
Euphrotis erecta
Heliocoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Lymantria ampla Linnaeus
Lymantria fuliginossa
Philudora pyriformis
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、越南、印度、尼泊爾。

Exorista ladelli (Baranov) 拉氏追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1678)

Eutachina ladelli Baranov, 1936:108.
Exorista sinica Chao, 1964:

寄 主：

分 佈：四川、浙江；泰國。

Exorista larvarum (Linnaeus) 古毒蛾追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:698; ASZI et al., 1978:215; Chao et Liang, 1984:68; Chao et Zhang, 1982:261; Chao et Zhou, 1988:517; Chen, 1989:115; Fan, 1992:733; Shi, 1981(4):36, 37, 38; Xue et al., 1996, 2:1678; Zhao et Zhou, 1992:1276; 1996:253)

Musca larvarum Linnaeus, 1758:596.
Tachina noctuarum Rondani, 1865:
Tachina utilis Townsend, 1908:
Exorista jugoslavica Lehrer, 1967:

寄 主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶(寧夏)
Dasychira mendosa Hübner 沁茸毒蛾
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Dendroliimus supurans (Butler) 落葉松毛蟲
Gynaephora alpherakii (Grum-Grschimailo) 黃斑草毒蛾(草原毛蟲)
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾(遼寧)
天蛾
國外鱗翅目有 49 種，葉蜂科 2 種：
Acronycta auricoma Linnaeus
Acronycta rumicis Linnaeus 梨劍紋夜蛾

Arctia caja Linnaeus 豹燈蛾
Arctia hebe Linnaeus
Arctia villica Linnaeus
Agrotis segetum Schiff. 黃地老虎
Autographa iota Linnaeus
Bombyx mori Linnaeus 家蠶
Catocala fraxini Linnaeus
Cosmotriche potatoria Linnaeus 牧草枯葉蛾
Cucullia prenanthis B.
Cucullia ceramanthae Fr.
Dasychira fascelina Linnaeus
Deilephila galii Rott.
Epinephele janira Linnaeus
Nygmia phaeorrhoea Linnaeus 棕尾毒蛾
Gastropacha quercifolia Linnaeus 李枯葉蛾
Hyponomeuta evonymella Linnaeus 稠李巢蛾
Lasiocampe quercus Linnaeus 櫟枯葉蛾
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 模舞毒蛾
Macroglossa stellatarum Linnaeus 小星天蛾
Macrothylacia rubi Linnaeus 樹莓枯葉蛾
Malacosoma castrensis Linnaeus
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐天幕毛蟲
Mamestra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾
Melitaea didyma O.
Metopsilus porcellus Linnaeus
Ocneria detrita Esp. 小舞毒蛾
Olelthreutes hercyniana Tr.
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Orgyia gonostigma Fabricius 赤紋毒蛾
Orgyia cricae Germ. 灰斑古毒蛾
Orthosia humilis Fabricus
Panolis gata Goez.
Panolis griseovarigata Goez.
Papilio machaon Linnaeus 茴香鳳蝶
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶
Plusia jota Linnaeus
Porthesia similis Fuessl. 桑毒蛾
Pygacra anastomosis Linnaeus
Saturnia pyri Linnaeus 大天蠶蛾
Spaelotis praecox Linnaeus
Spilosoma lubricipeda Linnaeus 黃腹斑燈蛾

Trachea piniperda Esp. 梟首夜蛾
Vanessa antiopa Linnaeus 長吻蛺蝶
Vanessa io Linnaeus 孔雀蛺蝶
Vanessa polychloros Linnaeus 雜色蛺蝶
Vanessa urticae Linnaeus 蕁麻蛺蝶
Zygaena ephialtes Linnaeus
Zygaena lonicerae Schw.
膜翅目有：*Acantholyda pinivora* Ensl. 松葉蜂
Diprion pini Linnaeus 松葉蜂

分 佈：江西、西藏、浙江、安徽、山東、河北、北京、青海、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、蘇聯(西伯利亞、中亞、外高加索)、近東(埃及、巴勒斯坦)、歐洲(包括英國)。

Exorista laterosetosa Chao 雙側追寄蠅 (Chao, 1964:370; Xue et al., 1996, 2:1678)

Exorista laterosetosa Chao, 1964:164, 370, 374.
寄 主：
分 佈：廣西(龍勝蔚青嶺)。

Exorista lepis Chao 瓦鱗追寄蠅 (Chao, 1964:367; Chao et Zhou, 1997:1532; Xue et al., 1996, 2:1678)

Exorista lepis Chao, 1964:363, 367-368..
寄 主：
分 佈：四川(峨眉山)、湖北。

Exorista longisquama Liang et Chao 長瓣追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1678)

Exorista longisquama Liang et Chao, 1992:209, 212-213, 223.
寄 主：
分 佈：廣東。

Exorista mimula Meigen 迷追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1678; Zhao et Zhou, 1992:1278)

Exorista mimula Meigen, 1824:
寄 主：
分 佈：雲南、四川、陝西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本(北海道)、蒙古、西伯利亞、歐洲(包括英國)。

Exorista penicilla Chao et Liang 刷肛追寄蠅 (Hun., 1992:1164; Sun et al., 1992:620; Xue et al., 1996, 2:1678; Zhao et Zhou, 1992: 1271)

Exorista penicilla Chao et Liang, 1992:208, 210 222.
寄 主：
分 佈：湖南、廣東、四川、浙江。

Exorista pratensis (Robineau-Desvoidy) 草地追寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:94; Xue et al., 1996, 2:1678)

Tachina pratensis Robineau-Desvoidy, 1830:194.
Tachina clausa Macquart, 1934:266.
Tachina brucorum Rondani, 1859:197.

Exorista grisella Mesnil, 1946:61.
寄 主：據記載國外：*Cladius comari* R. 葉蜂
Phlyctaenodes sticticalis Linnaeus 黃綠條螟
Zygaena sp.
分 佈：四川、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、摩洛哥、意大利、法國。

Exorista pseudorustica Chao 擬鄉間追寄蠅 (Chao, 1964:364; Chao et Zhang, 1982:260; Chao et Zhou, 1988:518; Hun., 1992:1164; Sun et al., 1992:620; Xue et al., 1996, 2:1682; Yunn., 1987:1196; Zhao et Zhou, 1992:1273)
Exorista pseudorustica Chao, 1964:362, 364, 372.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、雲南、西藏(墨脫、吉隆、貢覺)、四川、浙江。

Exorista quadriseta Baranov 四鬃追寄蠅 (Hun., 1992:1164; Sun et al., 1992:620; Xue et al., 1996, 2:1682; Yunn., 1987:1197)
Exorista quadriseta Baranov, 1932:91.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、陝西；朝鮮。

Exorista rossica Mesnil 毛蟲追寄蠅 (Fan, 1992:731; Liu, Zhao et al., 1998:95; Xue et al., 1996, 2:1682; Yan et al., 1993, 9(2):50)
Exorista rossica Mesnil, *In* Lindner, 1960:583.
Exorista amoena Mesnil of Chao, 1964:
寄 主：*Leucoma salicis* Linnaeus 楊毒蛾
Melalopha anachoreta Fabricius 楊舟蛾
Dicrenura lanigera Butler 雙尾舟蛾
Lymantris diapar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustri testacea Linnaeus 黃褐天幕毛蟲
分 佈：雲南、江蘇、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；塔吉克斯坦、中亞、土耳其。

Exorista rustica (Fallén) 鄉間追寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:260; Liu, Zhao et al., 1998:96; Xue et al., 1996, 2:1682; Yunn., 1987:1196; Zhao et Zhou, 1992:1273)
Tachina rustica Fallén, 1810:264.
寄 主：國外：葉蜂科 *Athalia rosae* Linnaeus
Lophyrus pini Linnaeus 松葉蜂
Lophyrus variegatus Harting
Pristiphora pallidiventris Fall.
Rhodogaster viridius Linnaeus
Tenthredella flavicorns Fabricius (*Tenthredo flava* Poda)
Tenthredo (*Allantus*) *arcuata* Förster
Tenthredo nassata Linnseus
Tenthredo scalaris Kl.
Tenthredopsis campestris
Tenthredopsis coqueberti Kl.

Tenthredopsis oleracea Linnaeus
鱗翅目：*Acronycta aceris* Linnaeus 楓劍紋夜蛾
Barathra brassicae Linnaeus 甘藍夜蛾
Hadena oleracea Linnaeus
Helicoverpa armigera Hübner. 棉鈴蟲
Laphygma exigua Hübner 甜菜夜蛾
Lasiocampa quercus Linnaeus 櫟枯葉蛾
Loxostege sticticalis Linnaeus 草地螟
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantra monacha Linnaeus 僧尼舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Orgyia ericae Linnaeus
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
沙棗毒蛾
Vanessa polychloros Linnaeus 雜色蛺蝶

分 佈：福建、雲南、西藏、四川、山西、河北、青海、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、歐洲法國、德國、比利時、英格蘭、愛爾蘭、瑞典。

Exorista sinica Chao 秦追寄蠅 (Chao, 1964:369)

Exorista sinica Chao, 1964:369.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)、浙江(天目山)。

Exorista sorbillans (Weidemann) 家蠶追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:699; ASZI et al., 1978:212; Chao, 1964:877-884; Chao et Liang, 1984:62; Chao et Shi, 1981(3):51; Chen, 1989:114; Cheng, 1981, 8(1):24-25; Chou et al., 1994:329; Fan, 1992:731; He et al., 1988:22; He et al., 1991:66; Hu, 1983:288; Hu, 1991:185; Hun., 1992:1165; Liu, Zhao et al., 1998:97; Lo et Wu, 1989:182; Shi, 1981(4):35, 36, 38, 39; Wu et al., 1989:162; Xiao, 1985(2):27; Xie et al., 1999, 21(2):84; Xue et al., 1996, 2:1682; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yu, 1983:46; Yunn., 1987:1199; Zhang, 1987[ed.] 2:70; Zhao et Zhou, 1992:1274)

Tachina sorbillans Weidemann, 1830:31.
Oestrus bombycis Louis, 1880:16.
Exorista auriceps (Macquart) of Mesnil, 1950:
寄 主：*Eumeta veriegata* (Snellen) 大袋蛾
Algedonia coclesalis Walker 竹織葉野螟
Artona funeralis Butler 竹斑蛾
Bombyx mori Linnaeus 家蠶 (Chao, 1964:878-879)
Bombyx mandarina 野蠶(Hu, 1991:103)
Rondotia menciana Moore 桑螨
Brephos nothum Hb. 尺蛾
Narosoideus flavidorsalis (Staudinger) 梨刺蛾
臭椿皮蛾
蘋掌舟蛾
櫟掌舟蛾

霜天蛾
Clanis bilineata Walker 豆天蛾 (Chao, 1964:878-879)
Ascotis selenaria Schiffermüller et Denis 大造橋蟲
Cocytodes coerulea Guebde 苧麻夜蛾
Dendrolimus spectabilis Tsai et Liu 赤松毛蟲(Chao, 1964:878-879)
Dendroliimus punctatus Walker 馬尾松毛蟲 (Chao, 1964:878-879)
Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(Chao, 1964:878-879)
Dictroploca japonica Butler 樟蠶
Earia pudicana Stgr. 柳梢夜蛾
Eurobracon yokohamae Dalla Torre
Mythimna separata Walker 粘蟲
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
Lymantria dissolute Swinhoe 條毒蛾
Lymantria xylina Swinhoe 木麻毒蛾
Parnara guttata Bremer et Gray 稻苞蟲
Parocneria furva (Leech) 側柏毒蛾
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Yala pyricola Chu 棗尺蠖
舟形毛蟲。
國外：*Acronycta aceris* Linnaeus 楓劍紋夜蛾
Arctia caja (Linnaeus) 豹燈蛾
Arctia hebe Linnaeus
Attacus lunula Walker
Bombyx fortunatus Hatt.
Bombyx mori Linnaeus 家蠶
Brephos nothum Hb.
Bupalus pniiarius Linnaeus 松尺蠖
Cossus cossus Linnaeus 柳木蠹蛾
Dasychira thwaitesii Moore
Dicranura vinula Linnaeus 大叉尾舟蛾
Eudia pavonia
Heliconius robigus 巴西蛺蝶
Hemerocampa leucostigma Dr.
Hippotion celerio Linnaeus 芋銀線天蛾
Lymantria dispae 舞毒蛾
Lymantria monacha 模舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐天幕毛蟲
Mamestra oleracea Linnaeus 菜園夜蛾(*Polia*)
Mamestra pisi Linnaeus 豌豆夜蛾

Nygmia phaeorrhoea Dow. 棕尾毒蛾
Olene mendosa Hb. 棉毒蛾
Orzyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Papilio demoleus libanius Fruhstorfer 無尾鳳蝶
Papilio machaon 茴香金鳳蝶
Philudoria potatoria Linnaeus
Mamestra oleraceae Linnaeus 菜園夜蛾
Saturnia carpinis Schiff.
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾
Saturnia pyri Schiffermüller 大天蠶蛾
Smerinthus ocellata 柳楊紫目天蛾
Smerinthus populi Linnaeus
Sphinx ligustri Linnaeus 丁香天蛾
Thaumetopoea pityocampa Schiff.
Vanessa jo (B. B.) 孔雀蛺蝶
Zygaena purpuralis
藍目天蛾
白齒灰夜蛾

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、印度、西伯利亞、歐洲、馬達加斯加、大洋洲。

Exorista spina Chao et Liang 緣刺追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1687; Zhao et Zhou, 1992:1271)

Exorista spina Chao et Liang, 1992:1108. 210-211, 222.
寄 主：
分 佈：雲南。

Exorista tenuicerca Liang et Chao 狹肛追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1687)

Exorista tenuicerca Liang et Chao, 1992:208, 211-212, 222.
寄 主：
分 佈：海南(五指山)。

Exorista wangi Chao et Liang 王氏追寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1687; Zhao et Zhou, 1992:1271)

Exorista wangi Chao et Liang, 1992:109, 213, 223.
寄 主：
分 佈：四川。

Exorista xanthaspis (Wiedemann) 紅尾追寄蠅 (ASZI, 1987, 2:699; Chao et Liang, 1984:64; Chen, 1989:114; Fan, 1992:731; He et al., 1991:66; Hun., 1992:1165; Liu, Zhao et al., 1998:99; Ma et al., 1988:25-28; Shi, 1981(4):36; Sun et al., 1992:620; Wu et al., 1989:161-162; Xue et al., 1996, 2:1687; Yunn., 1987:1200; Zhang, 1987[ed.] 2:70)

Tachina xanthaspis Wiedemann, 1830:314.
=*Tachina pyrrocera* Wideemann, 1830:314.
=*Eutachina winnertzi* Brauer et Bergenstamm, 1894:622.
=*Cyclotophrys anser* Townsend, 1909:246.

=*Tactuna fallax* (Meiger) Stein, 1924:114.
=*Eutachina civiloides* Baranov, 1932:84.
寄 主：*Clania minuseula* Butler　小袋蛾
Eumeta variegata (Snellen)　大袋蛾(幼蟲體外)
松天蛾
Dasychira axutha Collenette　松茸毒蛾
Dasychira horsfieldi　黑頸茸毒蛾
Dasucjora pudibunda (Linnaeus)　茸毒蛾
Dendrolimus punctatus (Walker)　馬尾松毛蟲
Epicopeia mencia Moore　榆鳳蛾
Mythimna separata Walker　粘蟲
菲律賓舟蛾
葎草舟蛾
榆鳳蝶
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏(樟木)、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、烏克蘭、廣布東洋區、馬達加斯加、羅得西亞、埃及、羅馬尼亞、南斯拉夫、法國、匈牙利。

Exorista yunnanica Chao 雲南追寄蠅 (Chao, 1964:369; Xue et al., 1996, 2:1687; Yunn., 1987:1199; Zhao et Zhou, 1992:1274)
Exorista yunnanica Chao, 1964:369.
寄 主：
分 佈：廣東、廣西、雲南。

Exorista sp. 橘白袋蛾追寄蠅 (Chen et Luo, 1990:81)
Exorista sp. Chen et Luo, 1990:81.
寄 主：*Chalioides kondonis*　橘白袋蛾。
分 佈：福建(福州)。

Exorista sp. 茶毛蟲蛹寄蠅 (Dai, 1992:42)
Exorista sp. Dai, 1992:42.
寄 主：茶毛蟲。
分 佈：貴州。

Exorista sp. 茶褐袋蛾追寄蠅 (Dai, 1992:42)
Exorista sp. Dai, 1992:42.
寄 主：*Mahasena colona*　茶褐袋蛾。
分 佈：貴州。

Exorista sp. 煙青蟲追寄蠅 (Zhang, 1987[ed.] 2:70)
寄 主：煙青蟲。
分 佈：江西。

Exorista sp. 追寄蠅 (Zhang, 1987[ed.] 2:70)

寄 主：

分 佈：江西。

Exorista sp. 棉蝗追寄蠅 (Liu et al., 1999, 21(3):99)

寄 主：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)。

分 佈：廣東。

Fausta inusta Mesnil 缺緣法寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2068)

Fausta inusta Mesnil, 1957:57.

寄 主：

分 佈：內蒙古；日本、西伯利亞。

Fausta mimetes Zimin 耳肛法寄蠅 (Chao et Shi, 1982:246; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Fausta mimetes Zimin, 1960:

寄 主：

分 佈：西藏(察雅)；日本、西伯利亞。

Fausta nemorum (Meigen) 側耳法寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2068)

Tachina nemorum Meigen, 1824:251.

Tachina ignobilis Meigen, 1824:

Fausta florea Robineau-Desvoidy, 1830:

寄 主：

分 佈：四川；日本、歐洲。

Fausta nigrotibia Chao et Zhou 黑脛法寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2068; Zhao et Zhou, 1996:262)

Fausta nigrotibia Chao et Zhou, 1996:

寄 主：

分 佈：青海(可可西里)。

Fischeria bicolor Robineau-Desvoidy 雙色菲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2088)

Fischeria bicolor Robineau-Desvoidy, 1830:191.

寄 主：

分 佈：甘肅；印尼、塔吉克斯坦、外高加索、意大利、法國。

Flavicorniculum forficalum Chao et Shi 叉尾黃角寄蠅 (Chao et Shi, 1981:205; Xue et al., 1996, 2:2083)

Flavicorniculum forficalum Chao et Shi, 1981:205.

寄 主：

分 佈：廣西(龍勝)。

Flavicorniculum hamiforceps Chao et Shi 鷹鉤黃角寄蠅 (Chao et Shi, 1981:207; Chao et Zhou, 1997:1543; Hun., 1992:1200; Xue et al., 1996, 2:2086; Zhao et Zhou, 1992:1334)

Flavicorniulum hamiforceps Chao et Shi, 1981:207-208.

寄 主：
分 佈：福建、湖南、四川、浙江。

Flavicorniculum multisetosum Chao et Shi 密鬃黃角寄蠅 (Chao et Shi, 1981:205; Xue et al., 1996, 2:2086)
Flavicorniculum multisetosum Chao et Shi, 1981:205.
寄 主：
分 佈：廣西(龍勝)。

Flavicorniculum planiforceps Chao et Shi 扁肛黃角寄蠅 (Chao et Shi, 1981:204; Chao et Zhou, 1997:1543; Xue et al., 1996. 2:2086; Yunn., 1987:1272; Zhao et Zhou, 1992:1334)
Flavicorniculum planiforceps Chao et Shi, 1981:204.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、湖北。

Frontina adusta (Walker) 閃色寬額寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:233; Sun et al., 1992:633; Xue et al., 1996, 2:1932; Zhao et Zhou, 1992:1290)
Tachina adusta Walker, 1852:292.
Frontina varicolor Villeneuve, 1937:2.
別 名：*閃斑寬額寄蠅*。
寄 主：
分 佈：雲南、四川、湖北、山西；印度。

Frontina laeta Meigen 彩艷寬額寄蠅 (ASZI, 1987, 2:700; Chen et al., 1993:148; Fan, 1992:783; Xue et al., 1996, 2:1932; Zhao et Liang, 1984:140)
Frontina laeta Meigen, 1824:381.
Laatreillia testacea Robineau-Desvoidy, 1830:
Tachina auraonitans Hartig, 1838:
Tachina laetabilis Zetterestedt, 1844:
寄 主：*Chihuo zao* Yang 棗尺蠖
國外：*Malacosoma castrensis* Linnaeus
Smerinthus ocellata Leech 藍目灰天蛾
Smerinthus populi
Sphinx ligustri Linnaeus 丁香天蛾
分 佈：浙江、江蘇、內蒙古、吉林；日本、外高加索、聖彼得堡、哈薩克斯坦、法國、英格蘭、德國、瑞典、挪威。

Frontina varicolor Villeneuve 閃色寬額寄蠅 (Yunn., 1987:1245)
寄 主：
分 佈：雲南、四川；印度。

Germaria angustata (Zetterstedt) 安古蕾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2037)
Gonia angustata Zetterstedt, 1844:1198.
寄 主：*Euzopphera alpherakyella* 棗暗斑螟(新疆)。
分 佈：青海、新疆、內蒙古；西伯利亞、外高加索、英國、丹麥、瑞典。

Germaria barbara Mesnil 巴爾古蕾寄蠅 (Zhao et Zhou, 1996:262)

Germaria barbara Mesnil, 1963:37.

寄 主：

分 佈：青海、新疆、內蒙古；阿爾及利亞。

Germaria vicina Mesnil 鄰古蕾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2037; Zhao et Zhou, 1996:262)

Germaria vicina Mesnil, 1963:38.

寄 主：

分 佈：新疆；塔吉克斯坦。

Germaria violaceiventris Enderlein 紫腹古蕾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2037; Zhao et Zhou, 1996:262)

Germaria violaceiventris Enderlein, 1934:132.

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、塔吉克斯坦。

Gonia atra Meigen 深黑膝芒寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:235; Xue et al., 1996, 2:1944; Zhao et Zhou, 1992:1292)

Gonia atra Meigen, 1826:7.
Rhedia vicina Robineau-Desvoidy, 1830:76.
Gonia bicincta Meigen, 1838:245.
Reaumuria fuscipennis Robineau-Desvoidy, 1863:742.
Asiogonia asiatica Rohdendorf, 1928:101.

寄 主：

分 佈：西藏、山西、甘肅、內蒙古；蒙古、西伯利亞南部、外高加索、亞洲、地中海、北非、意大利(西西里)、西班牙、法國。

Gonia bimaculata Wiedemann 雙斑膝芒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:700; Chao et Liang, 1984:87; Fan, 1992:748; He et al., 1991:66; Liu, Zhao et al., 1998:242; Xue et al., 1996, 2:1944; Zhao et Zhou, 1996:256)

Gonia bimaculata Wiedemann, 1819:25.
Gonia cilipeda Rondani, 1859:35.
Gonia incerta Bigot, 1888:10.
Saimacia bimaculata cabrerae Mesuil, *in* Lindner, 1956:523.

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Agrotis segetum (Sschiffermüller) 黃地老虎
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶。
國外：*Agrotis segetum* (Sschiffermüller) 黃地老虎
Agrotis ipsilon (Rottemberg) 小地老虎
Hyphantria cunea (Drury) 美國白蛾

分 佈：福建、浙江、江蘇、上海、山東、山西、河北、北京、青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古；中亞、烏克蘭、外高加索、巴勒斯坦、加那利群島、中歐、非洲(突尼斯)。

Gonia capitata (De Geer) 闊額膝芒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:700; Liu, Zhao et al., 1998:240; Xue et al., 1996, 2:1944)

Musca capitata De Geer, 1776:23.

Rhedia testacea Robineau-Desvoidy, 1830:75.
Gonia trifaria Zeller, 1842:841.
Gonia maritima Perris, 1847:495.
Salmacia vittata Robineau-Dersvoidy, 1851:312.
別 名：*寬額膝芒寄蠅*。
寄 主：*Actebia praecox* Linnaeus 青翅細夜蛾
Agrotis exclamationis Linnaeus 鳴地老虎
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
Agrotis ipsilon (Rottemberg) 小地老虎
Agrotis vestigialis (Hufnnegal) 射水地老虎
Hadena pisi Linnaeus 豆葉盜夜蛾
Crymodes devastator (Brace) 透明緩夜蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Peridromia saucia (Hübner) 雜色地老虎
分 佈：山西、北京、內蒙古；蒙古、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、非洲、法國、英格蘭、波蘭、瑞典。

Gonia chinensis Wiedemann 中華膝芒寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1540; Fan, 1992:746; Hun, 1992.:1194; Sun et al., 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1944; Zong et al., 1984:248)
Gonia chinensis Wiedemann, 1824:47.
Gonia fuscipes Matsumura, 1905:
Turanogonia smirnovi Rohdendorv, 1924:
Salmacia pruinosa Villeneuve, 1933:
別 名：*夜蛾土藍寄蠅，夜蛾膝芒寄蠅*。
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、北京；日本、菲律賓、越南、印度、錫金、尼泊爾、巴基斯坦、烏茲別克斯坦。

Gonia divisa Meigen 迪維膝芒寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1944)
Gonia divisa Meigen, 1826:4.
Rehdia bombylans Robineau-Desvoidy, 1830:
Gonia picea Matsumura, 1905:
寄 主：據記載：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎
分 佈：北京；日本、西伯利亞、聖彼得堡、法國、英國、瑞典。

Gonia klapperichi (Mesnil) 黃毛膝芒寄蠅 (Fan, 1992:745; Sun et al., 1992:634; Xue et al., 1996, 1944)
Tiranogoonia klapperichi Mesnil, 1984:532.
寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎(新疆)。
國外：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎
Phragmatobia fulginosa Linnaeus 亞麻燈蛾
分 佈：福建、貴州、雲南、浙江、青海、新疆、遼寧；緬甸、印度、北非、歐洲(英國除外)。

Gonia ornata Meigen 華麗膝芒寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:236; Xue et al., 1996, 2:1949)

Gonia ornata Meigen, 1826:3.
Gonia vittata Meigen, 1826:3.
Gonia nervosa Meigen, 1826:3.
Rhedia vernalis Robineau-Desvoidy, 1830:74.
Rhedia ddiversa Robineau-Desvoidy, 1830:77.
Gonia lateralis Zeller, 1842:843.

寄 主：據記載：*Actebia praecox* Linnaeus 青翅細夜蛾
Agrotis exclamationis Linnaeus 鳴夜蛾
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
Agrotis vestigialis (Hufnnegal) 射水地老虎
Ceramica pisi
Diplurella algeriensis
Jasspidea celsia
Luceria virens
Pachytelia villosela Linnaeu 絨毛簑蛾

分 佈：山西、北京、內蒙古、吉林；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、土耳其、巴勒斯坦、法國、德國、波蘭、蘇格蘭、瑞典。

Gonia picea (Robineau-Desvoidy) 黑腹膝芒寄蠅 (Chao et Liang, 1984:86; Chao et Zhou, 1997:1541; Fan, 1992:747; He et al., 1991:66; Liu, Zhao et al., 1998:239; Xue et al., 1996, 2:1949; Zhao et Zhou, 1996:257)

Gonia fasicata Meigen, 1926:
Spallaanzania fasciata Meigen, 1830:6.
Spallanzania picea Robineau-Desvoidy, 1830:78.
Reaumuria desvoidyi Robineau-Desvoidy, 1830:275.
Musca piniperdae Ratzeburg, 1844:174.
Salmacia sicula (Robineau-Desvoidy) of Mesnil, *in* Lindner, 1956:529. misidentifired.

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
國外：*Agrotis nigricans* Linnaeus
Charaeas grminis Linnaeus
Jaspidea celsia Linnaeus
Leucania comma Linnaeus
Panolis flammea (Schiff.) 小眼夜蛾

分 佈：西藏、四川、江蘇、上海、安徽、陝西、山西、北京、青海、新疆、遼寧、黑龍江；西伯利亞、土庫曼斯坦、外高加索、聖彼得堡、巴勒斯坦、法國、英格蘭、德國、瑞典。

Gonia sicula Roubineau-Desvoidy 黑腹膝芒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:701; Chao et Zhang, 1982:276)

寄 主：*Agrotis* spp. 地老虎。
國外：*Charaeas graminis* Linnaeus
Leucania comma Linnaeus
Panolis flammaea Schiff.

Podalirius retusus Kirby
分 佈：西藏(日喀則、普蘭巴噶)、四川、江蘇、上海、安徽、陝西、北京、遼寧、黑龍江；歐洲(中部、北部包括英國)。

Gonia ussuriensis (Rohdendorf) 烏蘇里膝芒寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1949)
Salmacia ussuriensis Rohdendorf, 1928:99.
寄 主：
分 佈：上海、黑龍江；日本。

Gonia vacua Meigen 白霜膝芒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:701; Chao et Zhang, 1982:276; Liu, Zhao et al., 1998:238; Xue et al., 1996, 2:1949)
Gonia vacua Meigen, 1826:4.
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎。
分 佈：西藏(普蘭巴噶)、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆；烏克蘭、外高加索、捷克斯洛伐克、匈牙利、瑞士。

Goniophthalmus frontioides Chao et Zhou 擬寬額貢寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5; 207-208; Xue et al., 1996, 2:1941; Yunn., 1987:1250; Zhao et Zhou, 1992:1292)
Goniophthalmus frontioides Chao et Zhou 1987:207-208.
寄 主：
分 佈：雲南。

Graphogaster buccata Herting 寬額戈寄蠅 (Chao et Shi, 1982:235; Xue et al., 1996, 2:2029; Zhao et Zhou, 1996:263)
Graphogaster buccata Herting, 1871:10.
寄 主：
分 佈：西藏(日土)；法國、意大利、瑞士、芬蘭。

Gymnochaeta goniata Chao 鈎肛亮寄蠅 (Chao, 1979:80; Xue et al., 1996, 2:2061)
Gymnochaeta goniata Chao, 1979:80-82.
寄 主：
分 佈：新疆。

Gymnochaeta magna Zimin 馬格亮寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2061)
Gymnochaeta magna Zimin, 1958:14.
寄 主：
分 佈：北京、遼寧、黑龍江；古北區。

Gymnochaeta mesnili Zimin 莫亮寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2061)
Gymnochaeta mesnili Zimin, 1958:59.
寄 主：
分 佈：黑龍江；蒙古。

Gymnochaeta porphyrophora Zimin 棒須亮寄蠅 (Chao et Shi, 1982:243; Xue et al., 1996, 2:2061; Zhao et Zhou, 1992:1334)

Gymnochaeta porphyrophora Zimin, 1958:57.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(聶拉木、亞東)、四川、青海。

Gymnocheta viridis Fallén 綠色亮寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2061)
Gymnocheta viridis Fallén, 1810:253.
寄 主：
分 佈：河北、黑龍江；古北區。

Gymnophryxe carthaginiensis (Bischof) 卡西金怯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1885)
Archiclops carthaginiensis Bischof, 1900:497.
Archiclops mageritensis Mesnil, 1956:
寄 主：據記載：*Thaumatopoea herculeana* 異舟蛾(夜蛾科)
分 佈：雲南；阿爾及利亞、摩洛哥、意大利(西西里島)、西班牙、突尼斯。

Gymnophryxe inconspicua (Villeneuve) 平庸金怯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1885; Zhao et Zhou, 1996:255)
Histochaeta inconspicua Villeneuve, 1924:7.
寄 主：
分 佈：青海、新疆；蒙古、西伯利亞、土耳其。

Gymnophryxe modesta Herting 謙金怯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1885)
Gymnophryxe modesta Herting, 1973:29.
寄 主：松線小捲蛾。
分 佈：寧夏；蒙古。

Gymnophryxe theodori (Kugler) 蒂奧金怯寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:199)
Archiclops theodori Kugler, 1968:63.
寄 主：
分 佈：山西；中亞。

Gymnosoma clavatum (Rohdendorf) 啞鈴膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:731; Liu, Zhao et al., 1998:347; Xue et al., 1996, 2:21164)
Gymnosoma clavata Rphdendorf, *in* Fedotov, 1947:84.
Rhodogyne werbekei Mesnil, 1952:150.
寄 主：蝽科。
分 佈：西藏、山西；中亞、蘇聯(歐洲部分)。

Gymnosoma desertorum (Rohdendorf) 荒漠膜腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2164)
Rhoddogyne desertorum Rohdendorf, 1947:84.
寄 主：
分 佈：新疆；蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、烏克蘭。

Gymnosoma dolycoridis Dupuis 斑須蝽膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:731; Xue et al., 1996, 2:2164)
Gymnosoma dolycoridis Dupuis, 1961:72.
Gymnosoma meridionalis Zimin, 1966:

Gymnosoma orientalis Zimin, 1966:
寄 主：雲南斑須蝽。
分 佈：雲南、陝西；巴基斯坦、西伯利亞、中亞、哈薩克斯坦、烏克蘭、外高加索、北非、法國、捷克和斯洛伐克、德國。

Gymnosoma inornatum Zimin 狹頰膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:732; Xue et al., 1996, 2:2164)
Gymnosoma inornatum Zimin
寄 主：蝽科。
分 佈：北京；蘇聯、法國。

Gymnosoma nudifrons Herting 黑臂膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:730; Xue et al., 1996, 2:2164)
Gymnosoma nudifrons Herting, 1966:9.
寄 主：蝽科。
分 佈：黑龍江；庫頁島、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、法國、瑞士、瑞典、挪威。

Gymnosoma rotundatum (Linnaeus) 普通膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:730; Xue et al., 1996, 2:2164; Zhao et Zhou, 1992:1343)
Musca rotundatum Linnaeus, 1785:596.
寄 主：蝽科。
分 佈：雲南、四川、河北、北京；蘇聯、印度、塞浦路斯、阿爾及利亞、摩洛哥、埃塞俄比亞。

Gymnosoma sylvaticum (Zimin) 寬頰膜腹寄蠅 (ASZI, 1987, 2:733; Xue et al., 1996, 2:2164;)
Gymnosoma sylvaticum (Zimin, 1966:454.)
寄 主：蝽科。
分 佈：內蒙古；西伯利亞。

Halydaya aurea Egger 金黃筒寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2148)
Halydaya aurea Egger, 1856:384.
寄 主：
分 佈：甘肅、吉林；日本、蒙古、庫頁島、西伯利亞、外高加索、烏克蘭、法國、瑞士、奧地利。

Halydaya luteicornis (Walker) 銀顏筒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:702; Chao et Liang, 1984:166; Chou et al., 1994:328; He et al., 1991:66; Hun., 1992:1203; Sun et al., 1992:637; Xue et al., 1996, 2:2148; Yu, 1983:46; Yu, 1995, 17(3):139)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Geunée) 稻縱卷葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
重寄生蜂：稻苞蟲兔唇釉小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、吉林；琉球群島、寮國、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、所羅門群島。

Hamaxia incongrua Walker 日本麗金龜寄蠅 (Chao, 1982:89)

寄 主：*Popillia japonica* Newman 日本麗金龜。

分 佈：遠東；美國(引進)。

Hamaxia monochaeta Chao et Yang 單鬃車寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2040)

Hamaxia monochaeta Chao et Yang, *in* Xue et al., 1996, 2:2040-2041.

寄 主：

分 佈：廣西(曲兒山)、四川。

Hebia parafacialis Chao et Zhou 狹顏嬌寄蠅 (Hun., 1992:1194; Xue et al., 11996, 2:1938)

Hebia parafacialis Chao et Zhou, 1992:1194.

寄 主：

分 佈：湖南。

Hemipeletieria chaoi Zimin 趙氏頬迷寄蠅 (Chao, 1963:220; Yunn., 1987:1258)

寄 主：

分 佈：雲南、甘肅。

Hemipeletieria fuscata Chao 暗色頬迷寄蠅 (Chao, 1963:223; Yunn., 1987:1259)

Hemipeletieria fuscata Chao, 1963:223.

寄 主：

分 佈：雲南(騰沖)。

Hemipeletieria pallida Zimin 頬迷寄蠅 (Chao, 1963:220)

寄 主：

分 佈：吉林。

Hemipeletieria semiglabra Zimin 半圓頬寄蠅 (Chao, 1963:221)

寄 主：

分 佈：東北。

Hemipeletieria trifurca Chao 三叉頬迷寄蠅 (Chao, 1963:222; Yunn., 1987:1259)

Hemipeletieria trifurca Chao, 1963:222.

寄 主：

分 佈：雲南(思茅)。

Hermya beelzebul (Wiedemnn) 比賀寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1551; Liu, Zhao et al., 1998:352; Xue et al., 1996, 2:217

Tachina beelzebul Wiedemnn, 1830:301.

Tachina imbrasus Walkre, 1849:781.

Paraphania fuscipennis Tothill, 1918:54.

Pseudorectocera albifacies Townsend, 1928:385.

寄 主：

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、山西、新疆、吉林；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Hermya formosna Villienuve 臺灣賀寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2177)
Hermya formosna Villienuve, 1939:353.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江、安徽。

Hermya micans (Wulp) 密賀寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2177)
Hermya micans (Wulp, 1881:40.)
寄 主：
分 佈：廣西、雲南；菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼。

Hermya nigra Sun 黑賀寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2177)
Hermya nigra Sun, 1994:206-208.
寄 主：
分 佈：雲南。

Hermya surstylis Sun 尾賀寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2177)
Hermya surstylis Sun, 1994:208-209.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、浙江。

Hermya yaanna Sun 雅安賀寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2178)
Hermya yaanna Sun, 1994:210-211.
寄 主：
分 佈：四川。

Homotrixa brevifacies Villeneuve 寬顏同相寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1957)
Homotrixa brevifacies Villeneuve, 1914:440.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Huebneria affinis (Fallén) 連姆翹端寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1784)
Tachina affinis Fallén, 1810:280.
寄 主：
分 佈：新疆；西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、英國、瑞典。

Hyalurgus atratus Mesnil 亮黑透翅寄蠅 (Chao et Shi, 1980:315; Xue et al., 1996, 2:2062)
Hyalurgus atratus Mesnil, 1967:47-48.
寄 主：
分 佈：四川。

Hyalurgus cinctus Villeneuve 橫帶透翅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:295; Xue et al., 1996, 2:2062; Yunn., 1987:1274; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Hyalurgus cinctus Villeneuve, 1937:9.

寄 主：*Dendrolimus sibiricus* Tschetwerikov 西伯利亞松毛蟲。

分 佈：雲南、四川、山西、青海、甘肅、吉林；古北區。

Hyalurgus curvicercus Chao et Shi 曲肛透翅寄蠅 (Chao et Shi, 1980:317; 1982:244; Xue et al., 1996, 2:2062)

Hyalurgus curvicercus Chao et Shi, 1980:317-319.

寄 主：

分 佈：西藏(亞東)。

Hyalurgus flavipes Chao et Shi 黃腿透翅寄蠅 (Chao et Shi, 1980:316; Xue et al., 1996, 2:2066; Yunn., 1987:1274; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Hyalurgus flavipes Chao et Shi, 1980:315-316.

寄 主：

分 佈：雲南(麗江五龍山)、山西。

Hyalurgus latifrons Chao et Shi 寬額透翅寄蠅 (Chao et Shi, 1980:316; 1982:244; Xue et al., 1996, 2:2066)

Hyalurgus latifrons Chao et Shi, 1980:315-316.

寄 主：

分 佈：西藏(吉隆)。

Hyalurgus longihirtus Chao et Shi 長毛透翅寄蠅 (Chao et Shi, 1980:315; Xue et al., 1996, 2:2066)

Hyalurgus longihirtus Chao et Shi, 1980:315-316.

寄 主：

分 佈：黑龍江(伊春帶嶺)。

Hyalurgus lucidus (Meigen) 黃腿透翅寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998L294)

Tachina lucidus Meigen, 1824:268.

Tachina diaphana Fallén, 1820:33.

Tachina flavida Meigen, 1824:369.

寄 主：*Pristiphora erichsonii* (Hartig) 落葉松葉蜂(內蒙古)。

據記載：*Pristiphora errichsonii* Hartig

Pristiphora geniculata Hartig

Pristiphora testacea Jurine

Trichiocmpus viminalis Fall.

分 佈：雲南、山西、甘肅、內蒙古。

Hyalurgus sima (Zimin) 斑腿透翅寄蠅 (ASZI, 1987, 2:702; Chao et Liang, 1984:171; Chen, 1989:116; Fan, 1992: 805; Xue et al., 1996, 2:2066; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Hyalurgus sima (Zimin, 1960:741.)

Hyalurgus spathulatus Mesnil, 1967:

寄 主：*Dendrolimus sibiricus* Tschetw. 西伯利亞松毛蟲。

分 佈：雲南、四川、山西、青海、吉林；蘇聯、古北區東部。

Hyleorus arctornis Chao et Zhou 白毒蛾飾苔寄蠅 (Hun., 1992:1201)

Hyleorus arctornis Chao et Zhou, 1992:1201.

寄 主：

分 佈：湖南。

Hyleorus elatus (Meigen) 矮飾苔寄蠅 (ASZI, 1987, 2:703; Chao et Liang, 1984:151; Fan, 1992:781; Liu, Zhao et al., 1998:329; Xue et al., 1996, 2:2125; Zhao et Zhou, 1992:1337)

Plagia elatus Meigen, 1838:201.

Plagia aaurifluae Wulp, 1869:137.

Tachina selosa Brischke, 1885:21.

Hystricovoria bakeri (Townsend) of Takano, 1956:59.

別 名：*高攀海猶寄蠅，矮海寄蠅*。

寄 主：*Euproctis phaeorrhoea* (Linnaeus) 棕尾毒蛾

Euproctis similes Fuessly 黃尾毒蛾

國外：*Porthesia similis* Puessly 桑毛蟲

分 佈：四川、浙江、江蘇、上海、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本、德國北部。

Hypotachina bifurca Chao et Shi 雙叉駭寄蠅 (Chao et Chou, 1988:513; Chao et Shi, 1982:235; 1985:165)

Hypotachina bifurca Chao et Shi, 1982:235.

寄 主：

分 佈：西藏(波密、左貢)。

Hypotachina fasciata Chao et Shi 條胸駭寄蠅 (Chao et Shi, 1985:165)

Hypotachina fasciata Chao et Shi, 1985:165.

寄 主：

分 佈：江西、雲南、四川、浙江、安徽。

Hypotachina javana Brauer et Bergenstamm 爪哇駭寄蠅 (Chao et Shi, 1985:164)

Hypotachina javana Brauer et Bergenstamm

寄 主：

分 佈：四川；印尼。

Hypotachina triangulata Villeneuve 黑三角駭寄蠅 (Chao et Shi, 1985:165)

Hypotachina triangulata Villeneuve

寄 主：

分 佈：

Hypovoria hilaris Villeneuve 歡亞蝸寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2132)

Hypovoria hilaris Villeneuve, 1912:510.

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古、吉林；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索。

Hystricovoria bakeri Townsen 貝克豪蝸寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2125)

Hystricovoria bakeri Townsen, 1928:395.

寄 主：

分 佈：海南；菲律賓、印度、非洲區。

Hystriomyia bifurca Chao et Shi 雙叉駭寄蠅 (Yunn., 1987:1252)

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Hystriomyia fasciata Chao et Shi 條胸駭寄蠅 (Yunn., 1987:1252)

寄 主：

分 佈：雲南、四川、江西、浙江、安徽。

Hystriomyia fetissovi Portschinsky 雙色豪寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2024)

Hystriomyia fetissovi Portschinsky, 1881:275.

寄 主：

分 佈：雲南、四川、河北、新疆；蒙古、西伯利亞、中亞地區。

Hystriomyia lata Portschinsky 側豪寄蠅 (Chao et Shi, 1985:164; Xue et al., 1996, 2:2028)

Hystriomyia lata Portschinsky

寄 主：

分 佈：新疆；中亞地區。

Hystriomyia nigrosetosa Zimin 黑鬃豪寄蠅 (Chao, 1974:474; Chao et Shi, 1985:164; Xue et al., 1996, 2:2028; Yunn., 1987:1252; Zhao et Zhou, 1992:1325)

Hystriomyia nigrosetosa Zimin, 1931:34.

寄 主：

分 佈：雲南、四川、陝西、河北、內蒙古；蒙古、西伯利亞(阿爾泰)。

Hystriomyia pallida Chao 淡豪寄蠅 (Chao, 1974:476; Chao et Shi, 1985:164; Xue et al., 1996, 2:2028; Zhao et Zhou, 1992:1325)

Hystriomyia pallida Chao, 1974:476.

寄 主：

分 佈：四川(康定)、青海。

Hystriomyia paradoxa Zimin 墨黑豪寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2028; Zhao et Zhou, 1996:261)

Hystriomyia paradoxa Zimin, 1935:605.

寄 主：

分 佈：西藏、青海。

Hystriomyia rubra Chao 紅豪寄蠅 (Chao, 1974:475; Chao et Shi, 1985:164; Xue et al., 1996, 2:2028; Zhao et Zhou, 1992:1325)

Hystriomyia rubra Chao, 1974:475.

寄 主：
分 佈：四川、青海(王樹)。

Hystriomyia triangulata Villeneuve 黑三角駭寄蠅 (Yunn., 1987:1252)
寄 主：
分 佈：雲南、四川

Isomera cinerascens Rondani 灰色等腿寄蠅 (ASZI, 1987, 2:703; ASZI et al., 1978:211; Chao, 1962:42; Chao et Liang, 1984:88; Shi, 1981(4):34, 35; Sun et al., 1980(4):23; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yunn., 1987:1249; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(臺灣)。
國外：*Cirphis loreyi* Dup. 蔗夜蛾
Plecoptera reflexa Guenée
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、浙江、江蘇、上海、山東、河南、河北、北京、新疆、遼寧、吉林；亞洲、蘇聯、馬達加斯加、非洲、歐洲中部。

Isopexopsis parafacialis Sun et Chao 側顏類梳寄蠅 (Sun et Chao, 1994:480)
Isopexopsis parafacialis Sun et Chao, 1994:480-482.
寄 主：
分 佈：雲南。

Isosturmia cruciata (Townsend) 叉異叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1180; Sun et al., 1992:627; Xue et a., 1996, 2:1872)
Zygocacelia cruciata Townsend, 1927:64.
寄 主：
分 佈：湖南；馬來西亞、印尼。

Isosturmia grandis Chao et Sun 巨形異叢毛寄蠅 (Sun et al., 1992:627; Xue et al., 1996, 2:1872)
Isosturmia grandis Chao et Sun, *In* Sun et al., 1992:627-628.
寄 主：
分 佈：貴州。

Isosturmia intermedia Townsend 中介異叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1181; Sun et al., 1992:628; Xue et al., 1996, 2:1872)
Isosturmia intermedia Townsend, 1927:68.
=*Isosturmia trisetosa* (Baranov)
寄 主：據記載：*Lethe diana* (Butler) 黛色珍眼蝶
Mycalesis gotama fulginia Fruhstorfer 稻黃褐眼蝶
分 佈：臺灣、湖南、海南、上海；日本、泰國、印尼(蘇門答臘)。

Isosturmia japonica (Mesnil) 日本異叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1181; Sun et al., 1992:628; Xue et al., 1996, 2:1872)
Drino japonica Mesnil, 1957:13.

寄 主：
分 佈：湖南、浙江；日本。

Isosturmia picta (Baranov) 多徑毛異叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1181; Liu, Zhao et al., 1998:190; Sun et al., 1992:628; Xue et al., 1996, 2:1872)

Sturmia picta Baranov, 1932:77.
=*Drino chatterijeeana* Baranov, 1934:1235.
別 名：*多徑毛贅寄蠅*。
寄 主：*Euprotis bipunctapex* (Hampson) 烏桕黃毒蛾
Euprotis chrysorrhoea (Linnaeus) 黃毒蛾
Euprotis plana (Walker) 毒蛾
Euprotis conspersa 茶黃毒蛾
Euprotis sp. 黃腹白毒蛾
Porhesia similis (Fuessly) 盜毒蛾
袋蛾
Mycalesis francissa prdiccas Hewitson 稻黑眼蝶。
據記載：*Euproctis bipunctapex* (Hamps) 烏桕黃毒蛾
Euproctis conspersa 茶黃毒蛾
Euproctis flava (Bremer) 折帶黃毒蛾
Euproctis plana Walker 漫星黃毒蛾
Plecoptera reflexa Guenée 夜蛾
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、山西、北京；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼。

Isosturmia pruinosa Chao et Sun 黃粉異叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1182; Xue et al., 1996, 2:1872)

Isosturmia pruinosa Chao et Sun., 1992:1182.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州。

Isosturmia spinisurstyla Chao et Liang 刺尾異叢毛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1872)

Isosturmia spinisurstyla Chao et Liang, *in* Xue et al., 1996, 2:1872-1973.
寄 主：
分 佈：海南(五指山)。

Istochaeta altaica (Borisova) 阿爾泰裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1726; Zhao et Zhou, 1992:1281)

Hyperecteina altaica Borisova, 1963:686.
寄 主：
分 佈：四川；蘇聯(遠東)。

Istochaeta bicolor (Villeneuve) 異色裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:54)

Istochaeta Rendani, 1859:157, 171.
Urophyllina bicolor Villeneuve, 1937:3.
Centeter usssurieensis Rohdendorf, 1949:418.

寄 主：*Maladera japonica* Motschulsky 日本瑪絨金龜
Maladera orientalis (Motschulsky) 黑瑪絨金龜
分 佈：貴州、雲南、四川、浙江、山西；日本、緬甸。

Istochaeta brevichirta Chao et Zhou 短毛裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1726)
Istochaeta brevichirta Chao et Zhou, 1886:
寄 主：
分 佈：山西。

Istochaeta brevinychia Chao et Zhou 短爪裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:56; Xue et al., 1996, 2:1726; Zhao et Zhou, 1992: 1282)
Istochaeta brevinychia Zhao et Zhou, 1993:1282, 1345.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、山西。

Istochaeta graciliseta Chao et Zhou 細鬃裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1726; Zhao et Zhou, 1992:1281)
Istochaeta graciliseta Zhao et Zhou, 1993:1281, 1345.
寄 主：
分 佈：雲南(瀘水)。

Istochaeta grossa (Chao) 巨裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:60; Xue et al., 1996, 2:1726)
Urophyllina grossa Chao, 1982:262.
寄 主：
分 佈：西藏、浙江、山西。

Istochaeta leishanica Chao et Sun 雷山裸背寄蠅 (Sun et al., 1992:624; Xue et al., 1996, 2:1726)
Istochaeta leeishanica Zhao et Sun, *In* Sun et al., 1993:624-625, 638.
寄 主：
分 佈：廣西、貴州。

Istochaeta longicauda Liang et Chao 長尾裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1726)
Istochaeta longicauda Liang et Chao, 1995:487, 488.
寄 主：
分 佈：西藏(聶拉木樟木)。

Istochaeta ludingensis Chao et Zhou 瀘定裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhou, 1992: 1281)
Istochaeta ludingensis Zhao et Zhou, 1992:1281-1282, 1345.
寄 主：
分 佈：四川(瀘定)。

Istochaeta nigripedalis Yang et Chao 黑足裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1734)
Istochaeta nigripedalis Yang et Chao, 1990:307-308.
寄 主：
分 佈：廣西。

Istochaeta nyalamensis Liang et Chao 聶拉木裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1734)
Istochaeta nyalamensis Liang et Chao, 1995:488, 489.
寄 主：
分 佈：西藏(聶拉木)。

Istochaeta nyctia (Borisova) 寬尾裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:59; Xue et al., 1996, 2:1734)
Hyperecteina nyctia Borisova, 1966:272.
寄 主：
分 佈：山西；俄羅斯南部濱海。

Istochaeta rufipes (Villeneuve) 紅足裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:60; Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhou, 1992:1281)
Urophyllina rufipes Villeneuve, 1937:5.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南、四川、山西；蘇聯(阿穆爾)、瑞士。

Istochaeta shanxiensis Chao et Liu 山西裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:57; Xue et al., 1996, 2:1734)
Istochaeta shanxiensis Chao et Liu, 1985:169-170.
寄 主：
分 佈：山西。

Istochaeta subrufipes (Borissova) 狹額裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhou, 1992:1280)
Urophyllina subrufipes Borissova, 1964:774.
寄 主：
分 佈：雲南、四川；俄羅斯(遠東)。

Istochaeta tricaudata Yang et Chao 三尾裸背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:58; Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhc 1992:1281)
Istochaeta triausata Yang et Chao, 1990:308-310.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、山西。

Istochaeta ussuriensis Rohdendord 烏蘇里裸背寄蠅 (Sun et al., 1992:625; Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhou, 1992: 1280)
Istochaeta ussuriensis Rohdendord, 1949:418.
寄 主：
分 佈：貴州、雲南、四川、山西；日本、俄羅斯(遠東地區、濱海)、緬甸、爪哇。

Istochaeta zimini Borisova 濟民裸背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1734; Zhao et Zhou, 1992:1281)
Istochaeta zimini Borisova, 1964:777
寄 主：
分 佈：西藏、四川；日本、俄羅斯(遠東地區)。

Janthinomyia elegans (Matsumura) 叉葉江寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2072; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Gymnochaeta elegans Matsumura, 1905:28.

寄 主：

分 佈：福建、雲南、四川、浙江、北京、內蒙古、黑龍江；蒙古、日本、俄羅斯(遠東)。

Janthinomyia felderi Brauer et Bergenstamm 并葉江寄蠅 (Chao et Shi, 1982:243; Chao et Zhou, 1988:516; 1997:1549; Hun., 1992:1200; Sun et al., 1992:637; Xue et al., 1996, 2:2072; Zhao et Zhou, 1992:1332)

Janthinomyia felderi Brauer et Bergenstamm, 1893:141.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、西藏(察隅、亞東、吉隆)、四川、浙江；印度、尼泊爾。

Leiophora innoxia (Meigen) 短頰粗芒寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1739; Zhao et Zhou, 1992:1280)

Tachina innoxia Meigen, 1824:405.

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；烏克蘭、法國、意大利、瑞士、英國。

Leskia aurea (Fallén) 金黃萊寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2088)

Tachina aurea Fallén, 1820:21.

寄 主：蘋果透翅蛾
板栗透翅蛾
據記載：*Aegeria vespiformis*
Aegeria scoliaeformis
Aegeria typhiaefoormis
蟻態透翅蛾

分 佈：河北；日本、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、法國、英國、瑞典。

Ligeriella aristata (Villeneuve) 鈍芒利格寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:261; Chao et Zhou, 1988:518; Liu, Zhao et al., 1998:51; Xue et al., 1996, 1:1748; Zhao et Zhou, 1992:1279)

Vibrissina aristata Villeneuve, 1911:120.

寄 主：

分 佈：西藏(樟木)、波密、江達、昌都)、山西；蒙古、塔吉克斯坦、聖彼得堡、瑞士、奧地利、波蘭。

Linnaemya altaica Richter 阿爾泰短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2096)

Linnaemya altaica Richter, 1979:217.

Linnaemya nonappendix Chao et Shi, 1980:

寄 主：

分 佈：北京；蒙古。

Linnaemya ambigua Shima 可變短鬚寄蠅 (Sun et al., 1992:636)

寄 主：

分 佈：貴州；日本。

Linnaemya atriventris (Malloch) 黑腹短鬚寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:310; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2096; Zhao et Zhou, 1992:1327)

Palpina atriventris Malloch, 1935:580.
Linnaemyia montschadskyi Žimin, 1954:272.
寄 主：
分 佈：貴州、西藏、山西、內蒙古；日本、俄羅斯遠東、馬來西亞、泰國、印尼。

Linnaemya (Homoenychia) claripalla Chao et Shi 亮黑短須寄蠅 (Chao et Shi, 1980:267; Xue et al., 1996, 2:2096; Zhao et Zhou, 1992:1327)

Linnaemyia (*Homoenychia*) *claripalla* Chao et Shi, 1980:267-268.
寄 主：
分 佈：青海(玉樹)。

Linnaemya (s. str.) **comta** (Fallén) 飾額短須寄蠅 (ASZI, 1987, 2:704; ASZI et al., 1978:220; Chao, 1962:85, 36; Chao et Liang, 1984:168; Chao et Shi, 1980:269; 1982:242; Chao et Zhou, 1988:516; Fan, 1992:804; He et al., 1991:66; Shi, 1981(4):33, 34; Xue et al., 1996, 2:2096; Yang et al., 1965:446-458; Yunn., 1987:1268; Zhao et Zhou, 1992:1326; 1996:260)

Tachina comta Fallén, 1810:277, 284.
Tachina compta Meigen, 1824:262.
Tachina fulgens Meigen, 1824:259.
Linnaemyia heraclei Robineau-Desvoidy, 1830:53.
Linnaemyia analis Robineau-Desvoidy, 1830:54.
Linnaemyia aestivalis Robineau-Desvoidy, 1830:54.
Linnaemyia borealis Robineau-Desvoidy, 1830:54.
Bonnetia longipes Robineau-Desvoidy, 1830:55.
Bonnetia oenanthis Robineau-Desvoidy, 1830:56.
Micropalpus humeralis Robineau-Desvoidy, 1863:119.
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Euxoa exlamationis (Linnaeus) 警紋地老虎
Euxoa segetum (Schiff.) 黃地老虎
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Mythimna separate (Walker) 粘蟲(Chao, 1962:85)。
國外：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Euxoa pavonia.
Feltia sp. 夜蛾
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Peridroma sp.
Polia sp.
分 佈：福建、廣西、雲南、西藏(樟木)、四川、青海、江蘇、湖北、山西、河北、天津、北京、青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古(滿洲里)、遼寧、吉林、黑龍江；印度、尼泊爾、蒙古、西伯利亞、聖彼得堡、亞洲中部、法國、蘇格蘭、奧地利、瑞典、芬蘭。

Linnaemya felis Mesnil 菲短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2099; Zhao et Zhou, 1992:1330)

Linnaemyia felis Mesnil, 1957:50.

寄 主：
分 佈：雲南；緬甸。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) fissiglobula Pandellé 裂肛短須寄蠅 (Chao, 1962:94; Chao et Shi, 1980:269; Liu, Zhao et al., 1998:315; Xue et al., 1996, 2:2099)
Linnaemyia fissiglobula Pandellé, 1895:350.
寄 主：
分 佈：陝西、山西、內蒙古、黑龍江；日本、西伯利亞、哈薩克斯坦、烏克蘭、捷克斯洛伐克、西班牙、法國、德國。

Linnaemya (Bonellimya) haemorrhoidalis (Fellén) 飾鬃短須寄蠅 (Chao, 1962:91; Chao et Shi, 1980:269; Xue et al., 1996, 2:2099)
Tachina haemorrhoidalis Fellén, 1810:277.
寄 主：
分 佈：吉林；古北區。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) hirtradia Chao et Shi 毛翅短須寄蠅 (Chao et Shi, 1980: 265; Xue et al., 1996, 2:2099)
Linnaemyia (Gymnochaetopsis) hirtradia Chao et Shi, 1980:265-266.
Linnaemya hirtipennis Shima, 1986:
寄 主：
分 佈：陝西(秦嶺)。

Linnaemya kanoi Shima 加納短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2099)
Linnaemya kanoi Shima, 1986:48.
寄 主：
分 佈：貴州；泰國。

Linnaemya lateralis (Townsend) 側斑短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2099; Zhao et Zhou, 1992:1330)
Eugymnochaetopsis lateralis Townsend, 1927:287.
寄 主：
分 佈：臺灣、四川；印尼。

Linnaemya (Eurysurstyla) linguicerca Chao et Shi 舌肛短須寄蠅 (Chao et Shi, 1980:264; Xue et al., 1996, 2:2099; Yunn., 1987:1269; Zhao et Zhou, 1992:1327)
Linnaemyia (Eurysurstyla) linguicerca Chao et Shi, 1980:264-266.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)、四川。

Linnaemya (Bonellimya) media Zimin 齒肛短須寄蠅 (Chao, 1962:90; Chao et Shi, 1980:270; Xue et al., 1996, 2:2099)
Linnaemyia media Zimin, 1954:274.
Linnaemyia medina, Chao et Shi, 1980:270.
寄 主：
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、俄羅斯遠東地區，古北區。

Linnaemya medogensis Chao et Zhou 墨脫短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2099)
Linnaemya medogensis Chao et Zhou, *in* Xue et al., 1996, 2:2099-2100.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

Linnaemya (Bonellimya) microchaeta Zimin 刺腹短須寄蠅 (Chao, 1962:91; Chao et Shi, 1980:269; 1982:242; Chao et Zhou, 1988:516; Shi, 1995:537; Sun et al., 1992:636; Yunn., 1987:1270; Zhang, 1987[ed.] 2:70)
Linnaemyia microchaeta Zimin, 1954:277-278.
Linnaemyia (*Bonellimya*) *microchaeta* Zimin, 1954:
別 名：*小短須寄蠅*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(米林、聶拉木、吉隆)、浙江、安徽、陝西、山西、河北、北京、遼寧；蘇聯(塔吉克斯坦)。

Linnaemya microchaetopsis Shima 刺徑短鬚寄蠅 (Hun., 1992:1198; Liu, Zhao et al., 1998:316; Xue et al., 1996, 2:2100; Zhao et Zhou, 1992:1327)
Linnaemyia microchaetopsis Shima, 1986:35-37.
Linnaemya microchaeta Chao *nec* Shima, 1962:
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、陝西、山西、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯。

Linnaemya nigricornis Chao 黑角短須寄蠅 (Chao, 1979:79)
Linnaemyia nigricornis Chao, 1979:79.
寄 主：
分 佈：新疆。

Linnaemya (Homoenychia) nonappendix Chao et Shi 缺贅短須寄蠅 (Chao et Shi, 1980: 266)
Linnaemyia (*Homoenychia*) *nonappendix* Chao et Shi, 1980:266-267.
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Linnaemya olsufjevi Zimin 歐氏短鬚寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:321; Xue et al., 1996, 2:2100; Zhao et Zhou, 1996:260
Linnaemyia olsufjevi Zimin, 1954:279.
寄 主：*Leucoma salicis* Linnaeus 楊毒蛾
分 佈：西藏、山西、青海、新疆、內蒙古；西伯利亞、聖彼得堡、哈薩克斯坦、烏克蘭、外高加索、雅羅斯拉夫爾、荷蘭、法國、瑞士、瑞典、美國。

Linnaemya (Bonellimya) omega Zimin 峨嵋短須寄蠅 (Chao, 1962:92; Chao et Shi, 1980:270; 1982:243; Hun., 1992:1198; Liu, Zhao et al., 1998:318; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2100; Yunn., 1987:1270; Zhao et Zhou, 1992:1328)
Linnaemyia omega Zimin, 1954:280.
寄 主：*Leucoma salicis* Linnaeus 楊毒蛾(新疆)。

分 佈：臺灣、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(樟木、聶拉木)、四川、浙江、湖北、山西、新疆；日本、蘇聯、緬甸、泰國、印度、尼泊爾、瑞典。

Linnaemya pallidohirta Chao 白毛短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2100)

Linnaemya pallidohirta Chao, 1962:87-88.

寄 主：

分 佈：?中國(小水谷)；日本、俄羅斯遠東地區。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) paralongipalpis Chao 黃粉短須寄蠅 (Chao, 1962:88; Chao et Zhou, 1997:1548; Hun., 1992:1199; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2100; Yunn., 1987:1269; Zhao et Zhou, 1992:1327)

Linnaemyia paralongipalpis Chao, 1962:88-89.

寄 主：

分 佈：湖南、雲南、四川(峨嵋山)、湖北；俄羅斯(遠東地區)。

Linnaemya (Bonellimya) perinealis Pandellé 長肛短須寄蠅 (Chao, 1962:94; Chao et Shi, 1980:269; 1982:243; Liu, Zhao et al., 1998:318; Xue et al., 1996, 2:2100; Yunn., 1987:1270; Zhao et Zhou, 1992:1328)

Linnaemyia perinealis Pandellé, 1895:350.

寄 主：據記載：*Agrotis c-nigrum* Linnaeus 八字地老虎

分 佈：臺灣、福建、雲南、西藏(類烏、察雅)、四川、浙江、山西、河北、北京、青海、內蒙古、青海、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、西伯利亞、哈薩克斯坦、泰國、印度、尼泊爾、法國、阿爾卑斯山中部、挪威。

Linnaemya (Bonellimya) picta (Meigen) 鈎肛短鬚寄蠅 (Chao et Shi, 1980:270; 1982:243; Chao et Zhou, 1988:516; 1997:1548; Hun., 1992:1199; Liu, Zhao et al., 1998:319; Xue et al., 1996, 2:2100; Yunn., 1987:1271; Zhang, 1998, 14(2):47)

Tachina picta Meigen, 1824:2261.

Tachina marmorata Meigen, 1824:261.

Micropalpus analis Macquart, 1848:272.

Bonellia rustticana Robineau-Desvoidy, 1863:137.

Ophina fulvipes Robineau-Desvoidy, 1863:299.

Linnaemyia retroflexa Pandellé, 1895:350.

寄 主：*Agrotis c-nigrum* Linnaeus 八字地老虎。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(樟木、拉薩)、四川、浙江、湖北、山西、北京、青海、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、泰國、印度、尼泊爾、歐洲(英國除外)。

Linnaemya pullior Shima 暗灰短須寄蠅 (Chao et Shi, 1982:241; Hun., 1992:1199; Sun et al., 11992:636)

寄 主：

分 佈：湖南、西藏(樟木)；馬來西亞、日本、歐洲。

Linnaemya retroflexa Pandellé 短須寄蠅 (Chao, 1962:93)

Linnaemyia retroflexa Pandellé, 1895:350.

寄 主：

分 佈：四川、浙江、河北、北京、內蒙古、吉林。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) rohdendorfi Chao 洛燈短須寄蠅 (Chao, 1962:86; Chao et Shi, 1980:269; Zhang, 1987ed.(2):70)

Linnaemyia rohdendorfi Chao, 1963:86.

寄 主：

分 佈：江西。

Linnaemya rossica Zimin 俄羅斯短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2106)

Linnaemya rossica Zimin, 1954:278.

寄 主：

分 佈：黑龍江；古北區西部。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) ruficornis Chao 黃角短須寄蠅 (Chao, 1962:89; Chao et Shi, 1980:269; Liu, Xue et al., 1996, 2:2106; Zhao et al., 1998:314; Zhao et Zhou, 1992:1330)

Linnaemyia ruficornis Chao, 1962:89-90.

寄 主：

分 佈：四川、安徽(黃山)、陝西、山西、黑龍江。

Linnaemya scutellaris (Malloch) 折肛短鬚寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:313; Xue et al., 1996, 2:2106)

Palpina scutellaris Malloch, 1927:423.

Linnaemyia rohdendorfi Chao, 1962:68.

寄 主：梨星毛蟲。

分 佈：江西、山西、北京、甘肅；馬來西亞。

Linnaemya setifrons Zimin 寬額短須寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2106)

Linnaemya setifrons Zimin, 1954:276.

寄 主：

分 佈：青海；蒙古、哈薩克斯坦、以色列。

Linnaemya siamensis Shima 賽短須寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2106)

Linnaemya siamensis Shima, 1986:44.

寄 主：

分 佈：海南、貴州、西藏、四川；日本。

Linnaemya (s. str.) soror Zimin 索勒短須寄蠅 (Chao, 1962:85; Chao et Shi, 1980:269; 1982:242; Xue et al., 1996, 2:2106; Yunn., 1987:1269; Zhao et Zhou, 1992:1326)

Linnaemyia (s. str.) *soror* Zimin, 1954:266.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(樟木、吉隆、察雅、類鳥齊)、四川、青海、新疆、內蒙古；中亞、蘇聯、歐洲南部、非洲北部。

Linnaemya tessellans (Robineau-Desvoidy) 泰短鬚寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:309; Sun et al., 1992:636; Zhao et Zhou, 1992: 1330)

Bonellia tessellans Robineau-Desvoidy, 1830:56.

Bonellia lateralis Robineau-Desvoidy, 1830:57.

Linnaemya pudica Rondani, 1859:69.

Nemoraea quadratticornis Meade, 1894:160.

寄 主：

分 佈：臺灣、貴州、雲南、西藏、四川、山西、內蒙古、黑龍江；尼泊爾、日本、西伯利亞、中亞地區、意大利、法國、英格蘭、德國。

Linnaemya (Bonellimya) tuberocerca Chao et Shi 結肛短須寄蠅 (Chao et Shi, 1980:268; Xue et al., 1996, 2:2106)

Linnaemyia (*Bonellimya*) *tuberocerca* Chao et Shi, 1980:268.

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古(西烏珠穆沁旗)。

Linnaemya (s. str.) **vulpina** (Fallén) 舞短須寄蠅 (Chao, 1962:86; Chao et Shi, 1980:269; Xue et al., 1996, 2:2106; Yunn., 1987:1269)

Tachina vulpine Fallén, 1810:276.

寄 主：國外：*Agrotis strigula* Thunberg 夜蛾
Hadena porphyrea Esp.
Hemaris tityus Linnaeus
Eumichtis satura Schiffer.
Eumichtis adusta Esp.
Nonagria geminipuncta Hatchett.
Senta maritima Tausch
Sphecia bembeciformis Hb.

分 佈：臺灣、雲南、青海；俄羅斯(莫斯科)。

Linnaemya (s. str.) **vulpinoides** (Baranov) 擬舞短須寄蠅 (ASZI, 1987, 2:704; Chao et Shi, 1980:269; 1982:242; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2106; Yunn., 1987:1269)

Micropalpus vulpinoides Baravnov, 1932:2.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

分 佈：臺灣、福建、貴州、雲南、西藏(樟木、吉隆)；蒙古、越南、馬來西亞、泰國、印尼、印度、尼泊爾、幾內亞、約旦、歐洲。

Linnaemya (Bonellimya) zachvatkini Zimin 查氏短須寄蠅 (ASZI, 1987, 2:705; ASZI et al., 1978:221; Chao, 1962:92, 37; Chao et Liang, 1984:169; Chao et Shi, 1980:269; Fan, 1992:804; He et al., 1991:66; Liu, Zhao et al., 1998:317; Shi, 1981(4):33, 34; Xue et al., 1996, 2:2106; Yunn., 1987:1270; Zhao et Zhou, 1992:1328)

Linnaemyia zachvatkini Zimin, 1954:276.

寄 主：*Agrotis tokionis* Butler 地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
夜蛾科(幼蟲)。

分 佈：福建、雲南、西藏(貢覺)、四川、河南、陝西、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、國後島、西伯利亞、匈牙利、奧地利、瑞士。

Linnaemya zhangi Zhao et Zhou 張氏短鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2110; Zhao et Zhou, 1992:1329)

Linnaemyia zhangi Zhao et Zhou, 1992:1325-1326.

寄 主：

分 佈：雲南、四川、北京。

Linnaemya (Gymnochaetopsis) zimini Chao 緣毛短鬚寄蠅 (Chao, 1962:88; Chao et Shi, 1980:260; Xue et al., 1996, 2:2110)

Linnaemyia zimini Chao, 1962:88.

寄 主：

分 佈：新疆。

Lixophaga cinctella (Mesnil) 小帶利索寄蠅 (Xue et al., 11996, 1:1746)

Lomatacaantha cinctella Mesnil, 1957:24.

寄 主：

分 佈：四川；日本。

Lixophaga dyscerae Shi 象蟲利索寄蠅 (Shi, 1991:127)

Lixophaga dyscerae Shi, 1991:127.

寄 主：*Dyscerus juglons* Chao 核桃橫溝象

分 佈：陝西。

Lixophaga fallax Mesnil 僞利索寄蠅 (Hun., 1992:1172; Liu, Zhao et al., 1998:76; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 11996, 1:1746)

Lixophaga fallax Mesnil, 1963:32.

Lixophaga cinerea Yang, 1988:82.

寄 主：

分 佈：湖南、廣西、四川、山西、遼寧、吉林；日本。

Lixophaga latigena Shima 寬頰利索寄蠅 (Xue et al., 1996, 1:1746)

Lixophaga latigena Shima, 1979:308.

寄 主：

分 佈：廣西；日本。

Lixophaga parva Townsend 螟利索寄蠅 (ASZI, 1987, 2:705; Chao et Liang, 1984:77; Chen et Hung, 1958:115; Pu, 1987:60.
Fan, 1992:740; Xue et al., 1996, 1:1746)

Lixophaga parva Townsend, 1908:86.

=*Lixophaga diatraeae* Townsend, 1916:

別 名：*古巴寄蠅*。

寄 主：廣泛

甘蔗螟蟲

Sesamia inferens (Walker) 大螟

Chilo infuscatellus Snellen 二點螟

Proceras venosatas Walker 條螟。

分 佈：臺灣(1955-1957 年自國外引進)、廣東(1963, 1964, 1979-1980 年自國外引進)；日本(引進)、菲律賓(引進)、印度(引進)、古巴、牙買加、波多黎各、海地、美國、安堤瓜、瓜的羅普、圭亞那、聖盧西亞、聖基茨、蒙特塞拉特。

Lophosia angusticauda (Townsend) 狹尾羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Eupalpocyptera angusticauda Townsend, 1927:286.

寄 主：

分 佈：臺灣、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇。

Lophosia bicincta Robineau-Desvoidy 雙帶羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Duvaucelia bicincta Robineau-Desvoidy, 1830:228.

Phililppolophosia sumatrensis Townsend, 1927:

Phililppolophosia ornata Townsend, 1928:

寄 主：

分 佈：海南、廣西、雲南；菲律賓、馬來西亞、新加坡、孟加拉、印尼。

Lophosia caudalis Sun 紅尾羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Lophosia caudalis Sun

寄 主：

分 佈：江西。

Lophosia excisa (Tothill) 隔離羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Lophosia excisa (Tothill, 1918:58.)

Xenolophosia ddiversipes Villeneuve, 1926:

Zambesoides samarensis Townsend, 1927:

Duvaucelia tricinta Malloch, 1931:

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、西藏；菲律賓、馬來西亞、印度、印尼。

Lophosia fasciata Meigen 條紋羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Lophosia fasciata Meigen, 1824:216.

寄 主：據記載：*Aelia acuminata* 尖頭麥蝽

分 佈：雲南、四川；日本、外高加索、聖彼得堡、英國、德國、瑞典。

Lophosia flavicornis Sun 黃角羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2173)

Lophosia flavicornis Sun, 1995:

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Lophosia imbecilla Herting 遲緩羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia imbecilla Herting, 1983:22.

寄 主：

分 佈：臺灣、江西、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北。

Lophosia imbuta (Wiedemann) 濕地羅佛寄蠅 (Hun., 1992:1203; Xue et al., 1996, 2:2174)

Ocyptera imbuta Wiedemann, 1819:36.

Phania indica Walker, 1852:

寄 主：

分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、四川；菲律賓、印度、印尼。

Lophosia jiangxiensis Sun 江西羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia jiangxiensis Sun

寄 主：

分 佈：江西。

Lophosia lophosioides (Townsend) 雙重羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia lophosioides (Townsend, 1927:59.)

Palpocyptera annuliventris Malloch, 1931:

寄 主：

分 佈：四川；馬來西亞、印尼。

Lophosia macropyga Herting 寬尾羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia macropyga Herting, 1983:25-26.

寄 主：

分 佈：臺灣、四川、浙江。

Lophosia marginata Sun 緣鬃羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia marginata Sun

寄 主：

分 佈：四川。

Lophosia pulchra (Townsend) 麗羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia pulchra (Townsend, 1927:284.)

寄 主：

分 佈：江西、廣西、貴州、四川、浙江；菲律賓。

Lophosia scutellata Sun 小盾羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia scutellata Sun

寄 主：

分 佈：四川。

Lophosia tianmushaanica Sun 天目山羅佛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2174)

Lophosia tianmushaanica Sun

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Lydella acellaris Chao et Shi 單翎厲寄蠅 (Chao et Shi, 1982, 2:274; Chao et Zhang, 1982:274; Zhao et Zhou, 1992:1302 1996:255)

Lydella acellaris Chao et Shi, 1982, 2:274.

寄 主：

分 佈：西藏(當雄、浪卡子)。

Lydella adiscalis Chao 裸腰厲寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:272; Zhao et Zhou, 1992:1302)

Lydella adiscalis Chao, 1982:272.

寄 主：

分 佈：西藏(江達、察雅)、新疆。

Lydella grisescens Robineau-Desvoidy 玉米螟厲寄蠅 (ASZI, 1987, 2:706; ASZI et al., 1978:209; Chao et Liang, 1984:133; Chao et Shi, 1981(3):50; Chen et al., 1994, 16(1):8-9; Fan, 1992:778; He et al., 1991:67; Hun., 1992:1176; Liu et Li, 1986:93; Liu, Zhao et al., 1998:175; Shi, 1981(4): 34, 35; Sun et al., 1992:626; Wang, 1982 4(4):22-23; Wang et al., 1989:102; Xue et al., 1996, 2:1858; Yu, 1983:46; Yunn., 1987:1244; Zhang, 1987[ed.] 2:71; Zhao et Wang, 1985, 5(4):357-363; Zhao et Zhou, 1992:1303)

=*Tachina dubia* Stephens, 1829:229.
Lydella grisescens Robineau-Desvoidy, 1830:112.
=*Lydella agrestis* Robineau-Desvoidy, 1830:113.
=*Lydella myoidea* Robineau-Desvoidy, 1830:114.
=*Lydella nitida* Macquart (nec Meiger), 1850:464.
=*Masicera montium* Macquart, 1850:463.
=*Lydella nova* Perris, 1852:58.
=*Masicera laticincta* Perris, 1852:202.
=*Tachina immissa* Walker, 1853:53.
=*Tachina discrepans* Walker, 1853:54.
=*Tachina demota* Walker, 1853:61.
=*Tachina retracta* Walker, 1853:80.
=*Oodigaster fasciata* Macquart, 1854:407.
=*Masicera senilis* (Meigen) of Rondani, 1861:25.
=*Masicera juvenilis* Rondani, 1861:25.
=*Lydella fulvicornis* Robineau-Desvoidy, 1863:85 5.
=*Lydella festinans* Robineau-Desvoidy, 1863:862.
=*Lydella cauta* Robineau-Desvoidy, 1863:863.
=*Lydella fuliginosa* Robineau-Desvoidy, 1863:863.
=*Lydella fugitiva* Robineau-Desvoidy, 1863:865.
=*Lydella maesta* Robineau-Desvoidy, 1963:866.
=*Lydella cursoria* Robineau-Desvoidy, 1863:866.
=*Zorella pavida* Robineau-Desvoidy, 1863:918.
=*Paraphorocera tincta* Brauer et Bergenstamm, 1889:165.
=*Leptotachina gratiosa* Brauer et Bergenstamm (*nec* Meigen), 1891:330.

寄 主：*Archnara aerata* Bulter 蘆葦鑽心蟲(條鍬額夜蛾)
Helotropha leucostigma laevis (Butler) 玉米蛀莖夜蛾
Oligia vulgaris (Bulter) 竹筍夜蛾
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Scirpophaga incertelas (Walker) 三化螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Sylepta derogata Fabricius 棉捲葉螟
Loxostege sticticalis 草地螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟。
國外：*Cacoecia rosana* Linnaeus 薔薇捲葉螟
Hydrocampa verticalis Hübner
Nonagria neurica
Nonagria geminipuncta

Ostrinia nubilalis Hübner 歐洲玉米螟
Tapinostola elymi Weis.
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、外高加索、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、以色列、歐洲(北達英格蘭、荷蘭、德國西北和柏林)、阿爾及利亞。

Lydella stabulans (Meigen) 廄厲寄蠅 (Zhao et Zhou, 1992:1302)
Lydella stabulans (Meigen, 1824:)
寄 主：據記載：*Gortyna ochracea* Hübner 心紋蠻夜蛾
Hydroecia micaea (Esper) 馬鈴薯蛀莖夜蛾
Nonagria typhae
Nonagria geminopuncta
Helotropha leucostgma
Coenobia rufa
Tapinostola fullva
分 佈：四川；蘇聯(西伯利亞西南部、烏茲別克斯坦、外高加索、列寧格勒歐洲北達蘇格蘭、瑞典南部。

Macquartia chalconota (Meigen) 查爾葉甲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2044)
Tachina chalconota Meigen, 1824:200.
寄 主：
分 佈：青海、內蒙古、黑龍江；外高加索、聖彼得堡、瑞典。

Macquartia macularis Villeneuve 黑斑葉甲寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:287; Xue et al., 1996, 2:2044)
Macquartia macularis Villeneuve, 1926:190.
寄 主：
分 佈：山西；蒙古、突尼斯、摩洛哥、阿爾巴尼亞、瑞士。

Macquartia pubiceps (Zetterstedt) 毛肛葉甲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2044)
Musca pubiceps Zetterstedt, 1845:1333.
寄 主：據記載：*Chrysomela bifrons.*
分 佈：河北；外高加索、蘇格蘭、芬蘭。

Macquartia tenebricosa (Meigen) 陰葉甲寄蠅 (ASZI, 1987, 2:706; Chao et Liang, 1984:157; Fan, 1992: 796; Liu, Zhao et al., 1998:295; Xue et al., 1996, 2:2044; Zhao et Zhou, 1996:263)
Tachina tenebricosa Meigen, 1824:270.
Tachina tristis Meigen, 1824:271.
Minella nitida Robineau-Desvoidy, 1830:209.
Tachina nitida Zetterstedt, 1838:646.
Tachina fumata Zetterstedt, 1844:1117.
Zophomyia rufipalpis Macquart, 1854:746
Tachina umbrossa Zetterstedt, 1859:6122.
Macquartia major Schiner, 1862:531.

Macquartia affinis Schiner, 1862:531.
Macquartia carbonaria Robineau-Desvoidy, 1863:1108.
Macquartia laeta Robineau-Desvoidy, 1863:1110.
Macquartia villica Robineau-Desvoidy, 1863:1111.
Macquartia flavipalpis Robineau-Desvoidy, 1863:1116.
Macquartia clausicella Rondani, 1865:205.
寄 主：*Ambrostoma quadriimpresseum* Motschulsky 榆紫葉甲。
國外：*Chrysomela fastusa* Scop.
Chrysomela geminata Payk.
Chrysomela graminis Linnaeus
Chrysomela hyperici Förster
Chrysomela varians
分 佈：山西、北京、青海、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、西伯利亞、外高加索、以色列、意大利、法國、奧地利、英格蘭、蘇格蘭、拉普蘭、丹麥、瑞典。

Macquartia tessellum (Meigen) 腹斑葉甲寄蠅 (Chao et Shi, 1982:239; Xue et al., 1996, 2:2044)
Tachina tessellum Meigen, 1824:267.
寄 主：據記載：*Chrysomela americana* Linnaeus
Chrysomela geminata Payk.
Phytodecta olivacea Forster
分 佈：西藏(樟木)；塔吉克斯坦、外高加索、歐洲、非洲北部、巴西。

Macquartia viridana Robineau-Desvoidy 威葉甲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2044)
Macquartia viridana Robineau-Desvoidy, 1863:1104.
寄 主：
分 佈：浙江；西班牙、法國、英格蘭、瑞士、奧地利。

Maculosalia flavicercia Chao et Liu 黃肛斑腹寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:101; Liu et al., 1985:165; Xue et al., 1996, 2:1699; Zhao et Zhou, 1996:254)
Maculosalia flavicercia Chao et Liu, 1985:165-166, 172.
寄 主：
分 佈：山西、北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江。

Maculosalia grisa Chao et Liu 灰色斑腹寄蠅 (Liu, Zhao, 1998:102; Liu et al., 1985:166; Xue et al., 1996, 2:1699)
Maculosalia grisa Chao et Liu, 1985:166-168.
寄 主：
分 佈：山西、新疆。

Masocera oculata Baranov 稻苞蟲寄蠅 (Chou et al., 1994:328)
Masocera oculata Baranov
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
分 佈：臺灣。

Medina collaris (Fallén) 寬額麥寄蠅 (ASZI, 1987, 2:706; Chao et Liang, 1984:76; Chao et Zhang, 1982:263; Hun., 1992:1171; Liu, Zhao et al., 1998:73; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 2:1722)

Tachina collaris Fallén, 1820:15.
Medina cylindrica Robineau-Desvoidy, 1830:139.
Metopia cylindroidea Macquart, 1835:130.
Degeerria ornata Meigen, 1838:249.
Tachina semizonata Zetterrstedt, 1849:3235.
Degeeria fuscanipennis Macquart, 1850:450.
別 名：*白瓣麥寄蠅*。
寄 主：*Altica* sp. 委陵跳甲。
國外：*Galerucella luteola* Mueller 榆黃葉甲
Lochmaea suturalis Thomson 石南螢葉甲
分 佈：湖南、廣西、貴州、西藏(江達、察隅)、四川、浙江、江蘇、山西、北京；蒙古、日本、庫頁島、西伯利亞、外高加索、歐洲北達愛爾蘭、蘇格蘭、斯堪的那維亞半島。

Medina collaris Fallén 寬顏麥寄蠅 (Fan, 1992:740; Yunn., 1987:1212; Zhao et Zhou, 1992:1284)
Medina collaris Fallén, 1820:15.
Tachina semizonata Zetterstedt, 1849:
Degeeria fusoanipennis Macquart, 1850:
寄 主：*Altica* sp. 委陵跳甲
國外：*Galerucella luteola* Müller 榆黃螢葉甲
Lochmaea suturalis Thomson
分 佈：廣西、貴州、雲南、西藏、浙江、北京；蒙古、日本、千島群島、西伯利亞外高加索、歐洲。

Medina fuscisquama Mesnil 黑斑麥寄蠅 (Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 2:1722)
Medina fuscisquama Mesnil, 1953:105.
別 名：*褐瓣麥寄蠅*。
寄 主：
分 佈：廣西、貴州、雲南、四川、湖北、山西、北京、遼寧；緬甸、尼泊爾。

Medina malayana (Townsend) 狹顏麥寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1722; Yunn., 1987:1212; Zhao et Zhou, 1992:1284)
Mollia malayana Townsend, 1926:20.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南；印尼。

Medina melania (Meigen) 暗黑麥寄蠅 (Hun., 1992:1171; Liu, Zhao et al., 1998:75; Xue et al., 1996, 2:1722)
Tachina melania Meigen, 1824:348.
Tachina funebris Meigen, 1830:371.
寄 主：
分 佈：湖南、山西、甘肅；日本、德國、奧地利、瑞士。

Meigenia discolor Zetterstedt 離色美根寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:518)
寄 主：*Entomoscelis orientalis* Motschulsky 東方油菜葉甲
Chrysomela salicivarax Fairm. 葉甲。

分 佈：福建、雲南、西藏(墨脫)、浙江、河北、北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；馬達加斯加、歐洲。

Meigenia dorsalis (Meigen) 雜色美根寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:65; Xue et al., 1996, 2:1715; Zhao et Zhou, 1992:1283)

Tachina dorsalis Meigen, 1824:325.

Meigenia pilosa Baranov, 1926:168.

寄 主：*Entomoscelis orientalis* Motschulsky 油菜葉甲
Chrysomela salicivoras (Fairmaire) 柳葉甲。
據記載：紅足葉甲
Chrysomela varians

分 佈：福建、貴州、雲南、西藏、浙江、山西、河北、北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；西伯利亞南部、外高加索、南斯拉夫、德國、英格蘭、瑞典、馬達加斯加。

Meigenia grandigena Pandélle 雜色美根寄蠅 (ASZI, 1987, 2:705; Chao et Liang, 1984:73; Chao et Zhang, 1982:263; Fan, 1992:738; Hun., 1992:1168; Sun et al., 1992:621; Yunn., 1987:1209)

Meigenia grandigena Pandellé, 1896:49.

Erigone oxyrhina Pandellé, 1896:

Meigenia rubromaculata Strobl, 1909:

寄 主：*Chrysomela salicivarax* (Fairmaire) 柳葉甲
Entmoscelis orientalis Motsuchulsky 東方油菜葉甲
榆綠毛螢葉甲。
國外：*Phytodecta rufipes* Deg.

分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、西藏、浙江、河北、北京、青海、新疆、內蒙古、黑龍江；馬達加斯加、非洲、歐洲。

Meigenia incana (Fallén) 灰白美根寄蠅 (Yunn., 1987:1209; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183; Zhao et Zhou, 1992:1283)

Meigenia incana (Fallén, 1810:)

寄 主：*Agelastic alni* Linnaeus 榿木紫葉甲
Athlia spinarum Fabricius 葉甲
Chrysomela varians Fabricius 葉甲
Melasoma tremulae Fabricus 葉甲
Phytodecta fornicata Brüg. 葉甲
Phytodecta rufipes Deg. 葉甲
Neodiprion huizeensis 會澤新松葉蜂(幼蟲-蛹)。

分 佈：雲南；蒙古、蘇聯(西伯利亞、外高加索)、歐洲(英國除外)。

Meigenia majuscula (Rondani) 大型美根寄蠅 (ASZI, 1987, 2:707; Chao et Liang, 1984:74; Fan, 1992:738; Shi, 1981(4):36; Sun et al., 1992:622; Xue et al.., 1996, 2:1715; Yunn., 1987:1209; Zhao et Zhou, 1992:1284)

Spylosia majuscula Rondani, 1859:112.

寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、山東、河北、北京、天津、青海、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；蒙古、俄羅斯(遠東)、越南、非洲、歐洲。

Meigenia mutabilís (Fallén) 暮美根寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1715)

Tachina mutabilis Fallén, 1810:273.

寄 主：

分 佈：內蒙古? 蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、歐洲北部(包括英國)。

Meigenia mutabilis discolor Zetterstedt 雜色美根寄蠅 (ASZI et al., 1978:218)

寄 主：東方油菜葉甲(北京)

據記載為葉甲科的重要天敵

分 佈：北京。

Meigenia nigra Chao et Sun 黑色美根寄蠅 (Hun., 1992:1169; Xue et al., 1996, 2:1716; Zhao et Sun, 1992:621)

Meigenia nigra Chao et Sun, *In* Sun et al., 1992:621-622.

寄 主：

分 佈：湖南、西藏、湖北。

Meigenia tridentata Mesnil 三齒美根寄蠅 (Hun., 1992:1169; Liu, Zhao et al., 1998:66; Xue et al., 1996, 2:1716; Yunn., 1987: 1210; Zhao et Zhou, 1992:1284)

Meigenia tridentata Mesnil, *In* Lindner, 1961:703.

寄 主：

分 佈：湖南、南沙群島、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、山西、北京、黑龍江；俄羅斯遠東地區。

Meigenia velutina Mesnil 絲絨美根寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:263; Chao et Zhou, 1988:518; Hun., 1992:1170; Liu, Zhao et al., 1998:67; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 2:1716; Yunn., 1987:1210; Zhao et Zhou, 1992:1284)

Meigenia velutina Mesnil, 1952:156.

寄 主：

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、山西、北京、黑龍江；日本、緬甸、印度、尼泊爾。

Metoposisyrops scirpophagae Chao et Shi 螟腫額寄蠅 (ASZI, 1987, 2:708; Chao et Liang, 1984:130; Chao et Shi 1981(3):50; 1982:71; Fan, 1992:776; He et al., 1991:67; Shi, 1981(4):34; Yunn., 1987:1241; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

Metoposisyrops sp. Shi, 1981(4):34.

Metoposisyrops scirpophagae Chao et Shi, 1982:71-72.

寄 主：*Chilo supressalis* (Walker) 二化螟

Scirpophaga incertelas (Walker) 三化螟。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江。

Microerigone sima Zimin 斑腿微毛寄蠅 (ASZI et al., 1978:220; Chao, 1964:883)

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲。

分 佈：吉林；蘇聯。

Mikia apicalis (Matsumura) 毛緣密克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1991)
Bombyliomyia apicalis Matsumura, 1916:389.
Echinomyia rubrapex Villeneuve, 1932:
Anaeudora aureocephala Townsend, 1933:
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、貴州、浙江、陝西。

Mikia aureocephala T. T. 棒須花麗寄蠅 (Yunn., 1987:1267)
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、浙江、陝西。

Mikia japanica (Baranov) 日本密克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1991)
Tamanukia japanica Baranov, 1935:551.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南、四川、安徽、陝西、河北、吉林；日本、俄斯遠東地區。

Mikia lampros (Wulp) 大黑華麗寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1991; Yunn., 1987:1267)
Echinomyia lampros Wulp, 1896:105.
寄 主：
分 佈：雲南；寮國、馬來西亞、印尼、緬甸。

Mikia magnifica Mik 松毛蟲華麗寄蠅 (ASZI et al., 1978:222; Chao, 1964:884; Zhang, 1998, 14(2):47)
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲。
分 佈：雲南、西藏、遼寧；蘇聯。

Mikia nigribaicosta Chao et Zhou 黑鱗密克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1991)
Mikia nigribaicosta Chao et Zhou, *in* Xue et al., 1996, 2:199-1993.
寄 主：
分 佈：浙江(天目山)。

Mikia orientalis Chao et Zhou 東方密克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1993)
Mikia orientalis Chao et Zhou, *in* Xue et al., 1996, 2:1993.
寄 主：
分 佈：海南、雲南(東南河口)。

Mikia patellipalpis (Mesnil) 棘須華麗寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1991; Yunn., 1987:1268)
Anaeudora patellipalpis Mesnil, 1953:157.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、雲南、浙江、安徽；俄羅斯(遠東地區)、馬來西亞、泰國、緬甸。

Mikia tepens (Walker) 松毛蟲華麗寄蠅 (ASZI, 1987, 2:708; Chao et Liang, 1984:165; Chen, 1989:116; Fan, 1992:801; Xue et al., 1996, 2:1991; Yunn., 1987:1267)
Tachina tepens Walker, 1849:723.

Fabricia magnifica Mik, 1884:
Echinomyia dendrolimusi Matsumura, 1926:
別 名：*華麗密克寄蠅*。
寄 主：*Dendrolimus kikuchi* Walker 思茅松毛蟲
Dendrolimus latipennis Walker 雲南松毛蟲
Dendrolimus sibiricus 西伯利亞松毛蟲。
分 佈：廣西、雲南、遼寧；蘇聯、越南、馬來西亞、印度、孟加拉、不丹、尼泊爾、印尼。

Mikia yunnanica Chao et Zhou 雲南密克寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1993)
Mikia yunnanica Chao et Zhou, *in* Xue et al., 11996, 2:1993-1996.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Montuosa caura Chao et Zhou 西北高原寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2116; Zhao et Zhou, 1996:260)
Montuosa caura Chao et Zhou, 1996:
寄 主：
分 佈：西藏、青海、新疆。

Myxesoristops bicolor (Villeneuve) 雙色撵寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1922)
Exorista bicolor Villeneuve, 1908:283.
寄 主：
分 佈：雲南；德國、波蘭。

Myxexoristops blondeli (Robineau-Desvoidy) 扁尾撵寄蠅 (ASZI, 1987, 2:709; Chao et Liang, 1984:132; Fan, 1992:777; Yunn, 1987:1243)
Phryxe blondeli Robineau-Desvoidy, 1830:161.
=*Zenillia oculosa* Pandellé,1895:
別 名：*側扁撵寄蠅*，*布朗撵寄蠅*。
寄 主：*Cephalcia abietis* Linnaeus 雲杉腮扁葉蜂
Cephalcia alashanica Guss. 賀蘭腮扁葉蜂
Lygaeonematus laricis Hart. 阿拉善捲葉鋸蜂(落葉松葉蜂)
國外：*Cephalcia abietis* Linnaeus 雲杉腮扁葉蜂
Crocrus latips
Eriocampa ovata
Hemichroa crocea
Lygaeonematus laricis Hart. 阿拉善捲葉鋸蜂(落葉松葉蜂)
Mesoneura opaca
Neurotoma flaviventris 梨卷葉鋸蜂
Pristiphora erichsoni Hartig 落葉松葉蜂
Pristiphora geniculata Hartig
Pristiphora testacea
Pteronidea pavida
分 佈：雲南、青海、北京、新疆、內蒙古、黑龍江；歐洲。

Neaera laticornis (Meigen) 寬角尼寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2043)

Tachina laticornis Meigen, 1824:351.

寄 主：

分 佈：內蒙古；蒙古、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英格蘭。

Nealsomyia rufella (Bezzi) 四斑尼爾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:709; Chen et Luo, 1990:81; Hun., 1992:1190; Xue et al., 1996, 2:1919)

Exorista rufella Bezzi, 1925:119.

=*Exorista quadrimaculata* Baranov, 1934:

=*Alsomyia indica* Villeneuve, 1937:

寄 主：*Cryptothelea minusula* Butler 茶袋蛾

Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾。

分 佈：福建、湖南、廣西、安徽、湖北、山東；越南、馬來西亞、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、伊朗。

Nemoraea angustecarinata (Macquart) 雙色毛瓣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2030)

Rutilia angustecarinata Macquart, 1848:211.

Nemoraea bicolor Macquart, 1851:

寄 主：

分 佈：四川、印尼。

Nemoraea bicolor Macquart 二色毛瓣寄蠅 (Chao et Shi, 1985:164)

Nemoraea bicolor Macquart

寄 主：

分 佈：雲南、四川、河北；蒙古。

Nemoraea bifurca (Chao et Shi) 雙叉毛瓣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2030; Zhao et Zhou, 1992:1326)

Hypotachina bifurca Chao et Shi, 1982:277.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Nemoraea echinata Mesnil 棘皮毛瓣寄蠅 (Zhao et Zhou, 1992:1326)

Nemoraea echinata Mesnil, 1953:

寄 主：

分 佈：四川、陝西；緬甸、印度。

Nemoraea fasciata (Chao et Shi) 條胸毛瓣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2030; Zhao et Zhou, 1992:1326)

Hypotachina fasciata Chao et Shi, 1985:165-167.

寄 主：

分 佈：江西、雲南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽。

Nemoraea fenestrata (Mesnil) 多孔毛瓣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2030; Zhao et Zhou, 1992:1326)

Hypotachina fenestrata Mesnil, 1971:991

寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川；緬甸、尼泊爾。

Nemoraea japanica (Baranov) 日本毛瓣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2030)
Protonemoraea japanica Baranov, 1935:556.
寄 主：*Cabera schaefferi* 三帶尺蛾。
分 佈：遼寧、黑龍江；日本。

Nemoraea javana (Brauer et Bergenstamm) 爪哇毛瓣寄蠅 (Hun., 1992:1197; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2030)
Dexiomima javana Brauer et Bergenstamm, 1894:615.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、四川、浙江；馬來西亞、印尼。

Nemoraea pellucida (Meigen) 透翅毛瓣寄蠅 (ASZI, 1987, 2:710; Chao et Liang, 1984:149; Chao et Shi, 1985:163; F 1992:790; Liu, Zhao et al., 1998:280; Xue et al., 1996, 2:2030; Yunn., 1987:1250; Zhao et Zhou, 1992:1325)
Tachina pellucida Meigen, 1824:254.
=*Tachina neglecta* Meigen, 1824:253.
=*Tachina rubrica* Meigen, 1824:255.
=*Nemoraea bombylans* Robineau-Desvoidy, 1830:72.
=*Nemoraea affinis* Robineau-Desvoidy, 1830:72.
=*Nemoraea fulva* Robineau-Desvoidy, 1830:72.
=*Nemoraea conjuncta* Macquart, 1848:102.
=*Tachina vulnerata* Zetterstedt, 1849:3240.
=*Nemoraea vicina* Macquart, *in* Lucas, 1849:477.
=*Nemoraea nupta* Rondani, 1859:73.
=*Nemoraea discreta* Robineau-Desvoidy, 1863:175.
=*Nemoraea fulva* Robineau-Desvoidy, 1863:175.
=*Nemoraea sponsa* Rondani, 1865:199.
=*Nemoraea diaphana* Brauer et Bergenstamm, 1891:416.
寄 主：*Stauropus persimilis* Butler 蘋蟻舟蛾
Calospilos suspecta (Warren) 絲棉木金星尺蛾
國外：*Abraxas pantaria* Linnaeus 尺蛾
Amphidasis betularia Linnaeus 樺尺蠖
Cosymbia linearia Hübner
Demas coryli Linnaeus
Euplexia lucipara (Linnaeus) 甜菜白腎錦夜蛾
Mamestra aliena Hübner
Mamestra leineri Fr.
Orgyia gonostigma Fabricius 梨赤紋毒蛾(角斑古毒蛾)
Panosolis griseovariegata Goeze
Sesamia sp.
Sphinx ligustri Linnaeus 丁香天蛾
Spilosoma lubricipeda Linnaeus 黃腹斑燈蛾
Taeniocampa stabilis View.
Trachea atriplicis Linnaeus 白戟銅翅蛾

分 佈：廣西、雲南、四川、陝西、山西、北京、黑龍江；日本、西伯利亞、英國、瑞典、歐洲北部。

Nemoraea sapporensis Kocha 薩毛瓣寄蠅 (Chao et Shi, 1985:163; Chao et Zhou, 1988:516; Hun., 1992:1198; Liu, Zhao et al., 1998:282; Shi, 1995:538; Sun et al., 1992:636; Xue et al., 1996, 2:2035; Yunn., 1987:1251; Zhao et Zhou, 1992:1325)

Nemoraea sapporensis Kocha, 1969:352.
=*Nemoraea tropidobothra* (Brauer et Bergeenstamm) of Baranov, 1952:119.
寄 主：*Antheraea yamamai* Guerin 天蠶蛾
Stauropus fagi persimilis Butler 蘋蟻舟蛾
國外：*Phalera flavescens* (Bremer et Grey) 蘋掌舟蛾
分 佈：福建、湖南、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北、陝西、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本、歐洲。

Nemoraea titan (Walker) 巨形毛瓣寄蠅 (Chao et Shi, 1985:164; Liu, Zhao et al., 1998:283; Xue et al., 1996, 2:2035; Yunn., 1987:1250; Zhao et Zhou, 1992: 1325)

Tachina titan Walker, 1849:735.
=*Nemoraea aaurifrons* Malloch, 1935:150.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、四川、山西；緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、不丹。

Nemoraea triangulata Villeneuve 黑三角毛瓣寄蠅 (Zhao et Zhou, 1992:1326)

Nemoraea triangulata Villeneuve, 1937:
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Nemorilla chrysopollinis Chao et Shi 金粉截尾寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:267; Zhao et Zhou, 1992: 1299)

Nemorilla chrysopollinis Chao et Shi, 1982:267.
寄 主：
分 佈：西藏(昌都)。

Nemorilla floralis Fallén 橫帶截尾寄蠅 (ASZI, 2:711; Chao et Liang, 1984:105; Fan, 1992:758; Hu, 1991: 185)

Nemorilla floralis Fallén, 1810:287.
=*Aubaea campestris* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Bubaea auraulenta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Pitthaea nepulosa* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：茶谷蛾
豆卜模夜蛾。
國外：食性極廣泛，已知鱗翅目寄主有 58 科，螟蛾、卷蛾、麥蛾、娟蛾、巢蛾、袋蛾、夜蛾、枯葉蛾和弄蝶科等：
Acalla hastiana
Acrobasis consociella
Acrobasis tumidana
Agrotis c-nigrum 八字地老虎

Cacoecia costana
Cacoecia murinana
Cacoecia podana 亞麻卷葉蛾
Cacoecia rosana 薔薇卷葉蛾
Capua reticulana Hübner 桑斜紋卷葉蛾
Eumeta veriegata (Snellen) 大袋蛾
Coscinia striata
Cryptoblabas gnidiella 橘排蜜螟
Cucullia prenanthis
Dendrolimus pini 歐洲松毛蟲
Depressaria applana
Depressaria arenella
Depressaria cynarivora
Depressaria depressella 繖形花織夜蛾
Depressaria marcella
Depressaria putridella
Depressaria ultimella
Dianthoecia carpophaga
Eurryhypara urticata
Glyphodes unionalis
Hesperia malvae
Hyponomeuta malinella 蘋巢蛾
Hyponomeuta vigintipunctata
Mamestra oleracea 菜園夜蛾
Mamestra persicariae 頂羽菊夜蛾
Notocelia uddmanniana 黑莓小卷蛾
Pandenis corylana Fabricius (榛褐卷蛾)
Pandenis heparana 蘋褐卷蛾
Pandenis ribeana 醋栗褐卷蛾
Phalacropteryx praecellens
Plastenis retusa
Plusia gamma Y 紋夜蛾
Plusia festucae
Polychrosis botrana 葡萄綴穗蛾
Psammotis hyalinalis
Psecadia bipunctella
Pyrausta aurata meridionalis 薄荷野螟
Rhodophaea suavella
Rhopobota naevana
Semasia diniana
Semasia profundana
Sophronia humerella
Sparganothis pilleriana Schiff. 葡萄長須卷蛾
Sylepta ruralis Scop. 蕁麻大螟

Tachyptilia populella
Thyatira batis 薔薇波紋夜蛾
Tortrix diversana
Tortrix leofflingiana 乳黃卷葉蛾
Tortrix politana
Tortrix pronubana
Tortrix viburniana
Tortrix viridana 櫟綠卷葉蛾
分 佈：廣東、廣西、遼寧；日本、中歐、英國。

Nemorilla floralis maculosa Meigen 斑截尾寄蠅 (Liu, 1958:309)
寄 主：*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick 柑橘擬小黃捲葉蛾(蛹)。
分 佈：廣東。

Nemorilla maculosa (Meigen) 雙斑截尾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:711; Chao et Liang, 1984:106; Chao et Shi, 1981(3):50; Fan, 1992:760; He et al., 1991: 67; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Liu, 1987:148; Liu et Li, 1986:92; Liu, Zhao et al., 1998:138; Shi, 1981(4):34, 35, 37, 38; Xue et al., 1996, 2:1781; Yu, 1983:45; Zhang, 1987[ed.] 2:71; Zhao et Zhou, 1996:254; Zhu, 1981(1-2):87)
Tachina maculosa Meigen, 1824:265.
=*Tachina rubricornis* Zetterstedt, 1844:1105.
=*Exorista notata* Macquart, 1849:377.
=*Exorista pusilla* Macquart, 1849:377.
=*Nemorilla aristalis* Rondani, 1859:101.
=*Aubaea cita* Robineau-Desvoidy, 1863:186.
=*Aubaea minuta* Robineau-Desvoidy, 1863:188.
寄 主：以往認爲與橫帶截腹寄蠅同種，故均記錄在前種，國內查明寄主有：*Archips cucrosa* Diakonoff 柑橘褐捲葉蛾
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Diaphania pyloalis (Walker) 桑螟
Dioryctria splendidella Heerring-Schaffer 松梢螟
Laspeyresia pomonella (Linnaeus) 蘋果小捲蛾
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 黃綠巢蛾
Neusinoe geomatralis Guenée 茉莉螟蛾
Phytometra gamma Linnaeus 銀紋夜蛾
Plusia agnata Staudinger 銀紋夜蛾
Rondotia menciana Moore 桑蟥
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Sylepta ruralis Scopoli 豆捲葉野螟
Olethreutes sp. 桑新小捲蛾
Illiberis pruni Dyar 梨星毛蟲(梨葉斑蛾)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶
小黃
Loxostege sticticalis 草地螟
茶谷蛾。

國外據記載：Pyralidae 螟蛾科
Acrobasis consociella Hübner 寬紋巢斑螟
Acrobasis tumidana Schiffermüller 灌木巢斑蛾
Cryptoblabes gnidiella (Mill.) 橘排蜜螟
Eurrhypara urticata
Glyphodes unionalis
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 甜菜網野螟
Loxostege verticalis Linnaeus 草地網野螟
Psammotis hyalinalis meridionalis
Pyrausta aurata Scopoli 薄荷野螟
Rhodophaea suavella
Sylepta ruralis Scopoli 豆捲葉野螟(蕁麻大螟)
Tortricidae 捲蛾科
Acalla hastiana
Cacoecia costana
Cacoecia murinana
Cacoecia podana Scopoli 亞麻黃捲蛾
Cacoecia rosana Linnaeus 薔薇黃捲蛾
Capua reticulana Hübner 斜紋捲葉蛾
Notocelia uddmanniana 黑莓小捲蛾
Pandemis corylana (Fabricius) 榛褐捲蛾
Pandemis heparna (Denis et Schiffermüller) 蘋褐捲蛾
Pandemis ribeana (Hübner) 醋栗褐捲蛾
Pollychrosis borana
Rhopobota naevana (Hübner) 蘋黑痣小捲蛾
Semasai diniana
Semasia profundana
Sparganothis pilleriana Denis et Schiffermüller 葡萄長鬚捲蛾
Tortrix loefflingiana 乳黃捲葉蛾
Tortrix politana
Tortrix pornubana Denis et Schiffermüller 葡萄小捲蛾
Tortrix viburniana (Schiffermüller) 覆盆子捲蛾
Tortrix viridana Linnaeus
Gelechiidae 麥蛾科
Depressaria applana
Depressaria arenella
Depressaria cynarivora
Depressaria depressella Hübner 傘形花織蛾
Depressaria marcella
Depressaria putridella
Depressaria ultimella
Psecadia bipuncteella
Sophronia humerella

Tachyptilia populella
Scythididae 絹蛾科
Scythris inspersella
Hyponomeutidae 巢蛾科
Hyponomeuta malinella Zeller 稠李巢蛾
Hyponomeuta vigintipuctata
Phalacropteryx praecellens 袋蛾
Noctuidae 夜蛾科
Agrotis c-nigrum Linnaeus 八字地老虎
Cucullia prenanthis
Dianthoecia carpophaga
Mamestra oleracea 菜園夜蛾
Mamestra perssicariae 頂羽菊夜蛾
Plastenis retusa
Plusia festucae
Plusia gamma Linnaeus Y 紋夜蛾
Thyatira batis Linnaeus 波紋蛾
Coscinia striata
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Hesperia malvae
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山西、河北、天津、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；琉球、蒙古、西伯利亞、中亞地區、外高加索、以色列、意大利、法國、德國、瑞典、加拿利群島(大西洋)、北美洲。

Nemosturmia amoena Meigen 松毛蟲小盾寄蠅 (ASZI, 2:711; ASZI et al., 1978:202; Chao et Cui, 1992:292; Chen, 1989:113; Guo et al., 1993, 15(2):95; Liang, 1984:105)
寄 主：*Dendrolimus* spp. 松毛蟲 重要天敵(東北)
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 草地螟
國外：*Amphidasis beti;aroa* Linnaeus
Catocala nupta Linnaeus 楊裳夜蛾
Dasychira selenitica Esp.
Dianthoecia capsincola Hübner
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustria testacea Motschulksy 黃褐天幕毛蟲
Ortholintha cervinata Schiff.
Panolis griseovarigata Goeze
Panolis flammea Schiff.
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾
分 佈：浙江、山西、遼寧、吉林、黑龍江；歐洲、美洲北部。

Neophryxe basalis Baranov 棒鬚新怯寄蠅 (Xue et al., 1996:1688)
Neophryxe basalis Baranov, 1932:86.

=*Exorista cephalopalpis* Chao, 1964:
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、雲南。

Neophryxe exserticercus Liang et Chao 隆肛新怯寄蠅 (Xue et al., 1996:1688)
Neophryxe exserticercus Liang et Chao, 1992:224-226.
寄 主：
分 佈：海南、雲南。

Neophryxe psychidis Townsend 筒須新怯寄蠅 (Fan, 1992:730; Hun., 1992:1167; Shi, 1981(4):35, 36; Xue et al., 1996:1688; Zhao et Zhou, 1992:1278)
Neophryxe psychidis Townsend, 1916:318.
=*Exorista humilis* Mesnil, 1946:
寄 主：*Chalioides kondonis* Matsumura 橘白袋蛾
Cryptothelea minuscula Butler 茶袋蛾
Eumeta variegata (Snellen) 大袋蛾
Mahasena colena Sonan 茶褐大袋蛾
分 佈：江西、湖南、廣西、四川、浙江、江蘇、上海、河北；日本、俄羅斯遠東。

Nilea anatolica Mesnil 安娜尼羅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1867; Zhao et Zhou, 1992:1303)
Nilea anatolica Mesnil, *In* Lindner, 1954:362-363.
寄 主：
分 佈：四川、山西；外高加索、土耳其。

Nilea breviunguis Chao et Li 短爪尼里寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:185)
Nilea breviunguis Chao et Li
寄 主：
分 佈：山西。

Nilea hortulana (Meigen) 立毛尼里寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:187)
Tachina hortulana Meigen, 1824:330.
=*Exorista major* Macquart, 1849:381.
=*Exorista acronyctarum* Macquart, 1849:404.
=*Huebneria acronyctae* Robineau-Desvoidy, 1850:167.
=*Exorista noctuicida* Rondani, 1859:126.
=*Himera meigenii* Robineau-Desvoidy, 1863:1126.
=*Parexorista blephripoda* Brauerr et Bergenstamm, 1891:322.
寄 主：*Acronycta strigosa* Fabricius 蘋劍紋夜蛾
據記載：*Acronycta alni* Linnaeus 樺劍紋夜蛾
Acronycta tridens Schiff. 三齒劍紋夜蛾
Acronycta rumicis (Linnaeus) 梨劍紋夜蛾
Acronycta leporina Linnaeus 白劍紋夜蛾
Cucullia artemisiae
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Melacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲

Pieris brassicae Linnaeus 大菜白蝶
Taeniocampa stabilis
分 佈：陝西、山西、遼寧；日本、西伯利亞、外高加索、英國、瑞典。

Nowickia atripalpis (Robomeai-Desvoidy) 肥須諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:254; Liu, Zhao et al., 1998:268; Xue et al., 1996, 2:1998; Zhao et Zhou, 1992: 1316)
Fabricia atripalpis Robomeai-Desvoidy, 1863:627.
Echinomyia nigripalpis Giglio-Tos, 1890:460.
Echinomyia deludans Villenuve, 1936:4.
Fabriciella extrema Herting, 1963:108.
Nowickia deflexa Zimin, 1980:218.
寄 主：
分 佈：西藏(聶拉木、吉隆、類烏齊)、四川、浙江、山西、青海、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯(西伯利亞、帕米爾、烏拉爾山脈、塞米巴拉金斯克、克里米亞、外高加索、高加索)、意大利、法國、南斯拉夫、比利牛斯山脈。

Nowickia brevipalpis Zhao et Zhou 短鬚諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1998; Zhao et Zhou, 1992:1314)
Nowickia brevipalpis Zhao et Zhou, 1992:1314-1315.
寄 主：
分 佈：四川(康定)。

Nowickia funebris (Villeneuve) 亮黑諾寄蠅 (Yunn., 1987:1268; Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1313)
Eudoromyia funebris Villeneuve, 1936:1.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Nowickia heifu Chao et Shi 黑腹諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:254; Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Nowickia heifu Chao et Shi, 1982:254.
寄 主：
分 佈：西藏(普蘭巴噶、江達)、四川、青海。

Nowickia hinstoniae Mesnil 短腹諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:254; Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Nowickia hinstoniae Mesnil, 1970:935-936.
寄 主：
分 佈：西藏(江達、芒康、昌都)、四川。

Nowickia latilinea Chao et Zhou 寬帶諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1315)
Nowickia latilinea Zhao et Zhou, 1993:1315-1316.
寄 主：
分 佈：西藏、青海(玉樹)。

Nowickia marklini (Zetterstedt) 窄角諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2005)
Tachina marklini Zetterstedt, 1838:634.

寄 主：
分 佈：黑龍江；歐洲中部和北部。

Nowickia mongolica (Zimin) 蒙古諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:254; Liu, Zhao et al., 1998:271; Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Fabriciella mongolica Zimin, 1935:598.
寄 主：
分 佈：西藏(江達)、四川、山西、河北、北京、內蒙古；蒙古、哈薩克斯坦。

Nowickia nigrovillosa (Zimin) 黑角諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:253; Xue et al., 1996, 2:2005; Yunn., 1987:1268; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Rohdendorfiola nigrovillosa Zimin, 1935:589.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(芒康、普蘭巴噶、江達、察雅)、四川、青海、黑龍江；蒙古、尼泊爾。

Nowickia polita Zimin 光亮諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2005; Yunn., 1987:1268; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Nowickia polita Zimin, 1935:590.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川、江蘇、甘肅、新疆、內蒙古；印度、哈薩克斯坦、費爾干納。

Nowickia rondanii (Giglio-Tos) 筒須諾寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:254; Chao et Zhou, 1988:516; Liu, Zhao et al., 1998:269; Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1992:1316)
Echinomyia rondanii Giglio-Tos, 1890: 459.
Echinomyia camerani Giglio-Tos, 1891:4.
Echinomyia latimargo Pandellé, 1896:76.
Fabriciella nigricornis (Robineau-Desvoidy); Zimin, 1935:595.
Giglioomyia stackelbergi Zimin, 1951:39.
Nowickia gussakovskyi Zimin, 1980:221.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫、聶拉木、八宿然)、四川、山西、新疆、內蒙古；蒙古、西伯利亞、塔吉克斯坦、烏拉爾、哈薩克斯坦、外高加索、馬其頓、西班牙、意大利、瑞士、德國。

Nowickia spectanda (Villeneuve) 黃鱗諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2005)
Echinomyia spectanda Villleneuve, 1930:102.
寄 主：
分 佈：內蒙古。

Nowickia strobeli (Rondani) 蘆斑諾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2005; Zhao et Zhou, 1996:259)
Echinomyia strobeli Rondani, 1865:198.
寄 主：
分 佈：西藏、青海、新疆；蒙古、西伯利亞、烏拉爾山脈、烏茲別克斯坦、德國、瑞典。

Onychogonia cervini (Bigot) 瑟氏縞寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1950)

Germaria cervini Bigot, 1881:365.
Onchogonia flaviceps (Zetterstedt); Mesnil, 1956:
寄 主：
分 佈：青海；法國、奧地利、瑞典、挪威。

Opsomeigenia orientalis Yang 東方單寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1723)

Opsomeigenia orientalis Yang, 1989:464-467.
寄 主：
分 佈：廣西。

Oswaldia eggeri (Brauer-Bergenstamm) 筒腹刺脛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1742; Zhao et Zhou, 1992:1288)

Dexodes eggeri Brauer-Bergenstamm, 1889:128, 169.
別 名：*筒腹奧斯渥寄蠅*。
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川、浙江；西伯利亞、聖彼得堡、德國、奧地利。

Oswaldia illiberis Chao et Zhou 梨星毛蟲奧斯渥寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1744)

Oswaldia illiberis Chao et Zhou, 1996, 2:1744.
寄 主：梨星毛蟲(梨葉斑蛾)
山楂粉蝶。
分 佈：甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江。

Oswaldia issikii (Baranov) 短爪刺脛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1742; Zhao et Zhou, 1992:1287)

Arrhinomyia issikii Baranov, 1935:557.
別 名：*短爪奧斯渥寄蠅*。
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川；日本。

Oswaldia micronychia Mesnil 短爪刺脛寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:264)

寄 主：
分 佈：雲南、西藏(察隅)、四川；日本。

Oswaldia muscaria (Fallén) 姆斯刺脛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1742; Yunn., 1987:1218)

Tachina muscaria Fallén, 1810:272.
別 名：*振翅奧斯渥寄蠅*。
寄 主：國外：*Abraxas marginata* Linnaeus
Calymnia trapezina Linnaeus 肉食黃夜蛾
Hybernia rupicapraria Schiff.
Taeniocmpa stabilis Schiff.
Taeniocampa incerta Hübn.
Taeniocampa pulverulenta Esp.
分 佈：雲南、遼寧、黑龍江；歐洲。

Pales angustifrons Mesnil 狹頰櫛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:268; Chao et Zhou, 1988:521)
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)；日本。

Pales carbonata Mesnil 炭黑櫛寄蠅 (Chao et Liang, 1984:116; Chao et Zhang, 1982:270; Chao et Zhou, 1988:521; Fan, 1992:766; Xue et al., 1996, 2:1896)
Pales carbonata Mesnil, 1970:89.
寄 主：*Locastra muscosalis* Walker 核桃綴葉螟。
分 佈：臺灣、江西、西藏(墨脫)、浙江、上海、北京、甘肅；日本、印尼。

Pales longicernis Chao et Shi 長角櫛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:269; Yunn., 1987:1234; Zhao et Zhou, 1992:1291)
Pales longicornis Chao et Shi, 1982:269.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南、西藏(察隅)、四川、浙江、陝西、河北、甘肅；印尼。

Pales medogensis Chao et Shi 墨脫櫛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:268; Chao et Zhou, 1988:521)
Pales modogensis Chao et Shi, 1982:268.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

Pales murina Mesnil 慕櫛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:270; Chao et Zhou, 1988:521)
寄 主：*Quercus dilatata*
分 佈：雲南、西藏(墨脫)、浙江；巴基斯坦。

Pales pavida (Meigen) 藍黑櫛寄蠅 (ASZI, 1987, 2:712; Chao et Liang, 1984:115; Chen, 1995, 21(4):25; Fan, 1992:765; He et al., 1991:67; Hun., 1992:1191; Liu, Zhao et al., 1998:204; Shi, 1981(4):38, 39; Shu et Yu, 1985:93; Sun et al., 1992:633; Yu, 1983:45; Yunn., 1987:1233; Zhao et Zhou, 1992:1290)
Tachina pavida Meigen, 1824:398.
=*Tachina apicalis* Stephens, 1829:298.
=*Tachina plumbea* Stephens, 1829:298.
=*Pales florae* Robineau-Desvoidy, 1830:155.
=*Pales petrosa* Robineau-Desvoidy, 1830:155.
=*Pales vernalis* Robineau-Desvoidy, 1830:156.
=*Phorocera aestuans* Meigen, 1838:261.
=*Tachina pumicata* (Meigen); Zetterstedt, 1844:1128.
=*Tachina squamosa* Zetterstedt, 1844:1164.
=*Tachina internexa* Walker, 1853:62.
=*Tachina infensans* Walker, 1853:88.
=*Phorocera cilipeda* Rondani, 1859:167.
=*Zenillia pumicata* Meigen, 1859:
=*Pales bellierella* Robineau-Desvoidy, 1863:591.
=*Pales coerulescens* Robineau-Desvoidy, 1863:529.
=*Zenillia pumicata* (Meigen) of Pndellé, 1895:337.
=*Gaedia puellae* Nishikawa, 1930:118, 259.
=*Gaedia ignavus* Nishikawa, 1930:
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(蛹)

Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐天幕毛蟲
Narosoideus flavidorsalis (Staudinger) 梨刺蛾
Nygmia phacorrhaca Don. 棕尾毒蛾
Parasa consocia Walker 青刺蛾(褐邊綠刺蛾)
Stilpnotis salicis Linnaeus 柳毒蛾
Locastra muscosalis Walker 綴葉叢螟(幼蟲、蛹)
杠柳螟蛾
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(蛹)
國外：有 60 多種鱗翅幼蟲等：
Abraxas grossulariata 醋栗尺蠖
Acalla ferrugana
Acalla hastiana
Acleris ferrugana Schiffermüller 銹長翅捲蛾
Aclla hastiana Linnaeus
Acosmetia caliginosa
Acromycta tridens (Schiffermüller) 蘋三齒劍紋夜蛾
Agrotis apec
Agrotis crassa
Agrotis pronuba
Agrotis segetum Schiff. 黃地老虎
Agrotis stigmatica
Agrotis xanthographa
Acalla hastiana Linnaeus
Acleris ferrugana Schiff. 葉蜂
Acronycta tridens Schiff. 葉蜂
Allantus cingillum Kl. 葉蜂
Alsophila aescularia
Amathes rhomboidea Esp.
Amathes xanthographa Schiffermüller
Artis caja 豹燈蛾
Attacus cynthia Linnaeus
Attacus lunula Walker
Autographa gramma (Linnaeus)
Bombyx mori Linnaeus 家蠶
Calymnia trapezina
Calocampa solidaginis
Charaeas graminis
Cirphis unipuncta (Howorth) 一星粘蟲
Crocallis tusciaria
Cucullis asteris
Cucullis verbasci
Dasychira selenitica Esp.

Dendroliimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Diloba coerulecocephala
Dryobota pryobota
Ennomos quercinaria
Eriogaster catax Linnaeus
Eriogaster lanestria Linnaeus 絨毛枯葉蛾
Euplexia lucipara 白臀錦夜蛾
Euproctis chrysorrhoea
Gonodontis bieentata
Heliothis dipsacea
Hyphantria cunea
Larentia montanata
Loxostege sticticalis Linnaeus 草地螟(黃綠條螟)
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 模舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐幕毛蟲
Mamestra oleracea
Nola sp.
Nygmia phaeorrhaea Donden 棕尾毒蛾
Ocnogyna baeticum
Orgyia antiqua 古毒蛾
Orgyia ericae Germ. 灰斑古毒蛾
Panolis flammea Schiff. 小眼夜蛾
Plusia gamma
Polia oleracea Linnaeus 菜園夜蛾
Potyhrytis diapae Linnaeus
Senta maritima
Sparganothis pillerians Schiff. 葡萄長須卷葉蛾(葡萄卷蛾)
Stilpnotia salicis (Linnaeus) 柳毒蛾
Taeniocampa gracilis Fabricius
Taeniocampa miniosa
Thaumetopoea precessioneae (Linnaeus) 櫟異舟蛾
Thaumetopoea pinivora Tr.
Thaumatopoea processioneae Linnaeus 歐洲帶蛾
Tortrix viridana Linnaeus 櫟綠卷蛾
Vanessa sp.
Zygaena filipendulae
Zygaena lonicerae

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、陝西、山西、河北、北京、青海、遼寧、黑龍江；蒙古、日本、千島、西伯利亞南部、聖彼得堡、外高加索、以色列、意大利、法國、英格蘭、德國、瑞典。

Palesisa aureola Richter 草地螟帕寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:202)

Palesisa aureola Richter, 1874:406.

寄 主：*Loxostege sticticalis* 草地螟

Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟。

分 佈：山西；蒙古、西伯利亞。

Palesisa bodenheimeri Mesnil 博丹琶寄蠅 (Liu et Li, 1986:93)

寄 主：*Loxostege sticticalis* 草地螟。

分 佈：山西；巴斬斯坦。

Palesisa maulosa (Villeneuve) 黑斑帕寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1892)

Micropales maculosa Villeneuve, 1936:155.

寄 主：

分 佈：山西；以色列。

Palesisa nudioculata Villeneuve 黑條帕寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1892)

Palesisa nudioculata Villeneuve, 1929:101.

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、土耳其、以色列。

Paradrino atrisetosa Shima 黑毛類贅寄蠅 (Hun., 1992:1177)

寄 主：*Ilattia punctum* Fabricius 斑坑翅夜蛾

Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟。

分 佈：湖南；馬來西亞。

Paradrino laevicula Mesnil 直肘類贅寄蠅 (Sun et al., 1992:626)

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南；馬來西亞、尼泊爾、印尼、新不列顛、澳洲。

Parasetigena bicolor (Chao) 異色毒蛾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1702)

Phorocera bicolor Chao, 1964:293-296.

=*Parasetigena takaonis* Herting, 1984: (*nec* Mesnil)

寄 主：

分 佈：吉林；日本(鹿兒島)。

Parasetigena jilinensis Chao et Mao 吉林毒蛾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1702)

Parasetigena jilinensis Chao et Mao, 1990:301-302.

寄 主：

分 佈：吉林。

Parasetigena silvestris Robineau-Desvoidy 毒蛾側行寄蠅 (Fan, 1992:726; Xue et al., 1996, 2:1702)

Parasetigena silvestris Robineau-Desvoidy, 1863:531.

Phorocera agilis (Robineau-Desvoidy), 1924:

別 名：*毒蛾蜉寄蠅*。
寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾
Antheraea pernyi Guér. 柞蠶。
國外：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾(美國引進)
Lymantria monacha Linnaeus 模舞毒蛾(僧尼舞毒蛾)
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、歐洲(南部和中部)、美國(引進)。

Paratryphera barbatula (Rondani) 鬃側盾寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:119; Xue et al., 1996, 1:1760; Yunn., 1987:1191; Zhao et Zhou, 1992:1299)
Exorista barbatula Rondani, 1859:145.
Exorista nemestrina (Meigen); Rondani, 1859:146. (misident.)
Parexorista trifasciata Brauer et Bergeenstamm, 1891:323.
Exorista hirtipilis Pandellé, 1896:12.
Exorista nemestrina (Meigen); Stein, 1924:79. (misident.)
寄 主：據記載：*Conchylis roseana* Hw.
Pristophora geniculata Htg.
分 佈：廣東、廣西、雲南、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、西伯利亞、外高加索、以色列、歐洲(北至德國南部、柏林、和聖彼得堡一線)。

Paratryphera bisetosa Brauer-Bergenstamm 雙鬃側盾寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:268; Zhao et Zhou, 1992:1299)
Paratryphera bisetosa Brauer-Bergenstamm, 1891:321.
寄 主：國外：*Geometra vernaria* Hb.
Acronycta psi Linnaeus 梨劍紋夜蛾
Acronycta alni Linnaeus 樺劍紋夜蛾
分 佈：廣東、廣西、貴州、西藏(昌都)、河北、遼寧；日本、烏克蘭、西班牙、法國南部、意大利、瑞士、奧地利。

Paratryphera palpalis (Rondani) 黃鬚側盾寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:121; Xue et al., 1996, 1:1760)
Chaetina palpali Rondani, 1859:98.
=*Chaetina soror* Rondani, 1859:98.
=*Paratryphera handlirschi* Brauer et Bergenstamm, 1891:329.
寄 主：
分 佈：西藏、山西、遼寧、吉林；意大利。

Paratryphera yichengensis Chao et Liu 翼城側盾寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:118)
Paratryphera yichengensis Chao et Liu
寄 主：
分 佈：山西。

Parerigone aurea Brauer 金黃俏飾寄蠅 (Xue et al., 1996:2167)
Parerigone aurea Brauer, 1898:540.
寄 主：
分 佈：黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(烏蘇里)。

Parerigone brachyfurca Chao et Zhou 短叉俏飾寄蠅 (Xue et al., 1996:2167; Zhao et Zhou, 1992:1343)

Parerigone brachyfurca Chao et Zhou, 1990:234-235.

寄 主：

分 佈：四川、陝西。

Parerigone tianmushana Chao et Sun 天目俏飾寄蠅 (Xue et al., 1996:2167)

Parerigone tianmushana Chao et Sun, 1990:230-234.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Parerigonesis flavihirta Chao et Sun 黃毛擬俏飾寄蠅 (Xue et al., 1996:2170; Zhao et Zhou, 1992:1343)

Parerigonesis flavihirta Chao et Sun, 1990: 237-238.

寄 主：

分 佈：雲南。

Peleteria acutiforceps Zimin 尖尾長須寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2009; Yunn., 1987:1260; Zhao et Zhou, 1992:1318)

Peleteria acutiforceps Zimin, 1961:274.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、青海；哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Peleteria bidentata Chao et Zhou 雙齒長須寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5:209-210; Yunn., 1987:1261; Xue et al., 1996, 2:2009; 1987:1261; Zhao et Zhou, 1992:1322)

Peleteria bidentata Chao et Zhou, 1987, 5:201-202.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Peleteria chaoi (Zimin) 片肛長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2009)

Hemipeleteria chaoi Zimin, 1961:253.

寄 主：

分 佈：吉林；俄羅斯(遠東地區)。

Peleteria curtiunguis Zimin 短爪長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2009; Zhao et Zhou, 1996:259)

Peleteria curtiunguis Zimin, 1961:271.

寄 主：

分 佈：西藏、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Peleteria ferina (Zetterstedt) 凶猛長鬚寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:275; Xue et al., 1996, 2:2009)

Echinomyia ferina Zetterstedt, 1844:998.

寄 主：據記載：*Arctia aulica* Linnaeus

Parasemia plantaginis (Linnaeus) 車前燈蛾

分 佈：山西、河北、北京、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、哈薩克斯坦、外高加索、亞洲東部及中部、歐洲。

Peleteria flavobasicosta Chao et Zhou 黃鱗長須寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5:211-212; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1322)

Peleteria flavobasicosta Chao et Zhou, 1987, 5:203-204.

寄 主：

分 佈：西藏。

Peleteria frater (Chao et Shi) 紅尾長須寄蠅 (Yunn., 1987:1261; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Cupphocera frater Chao et Shi, 1982:248

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Peleteria fuscata (Chao) 褐色長須寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2016)

Hemipeleteria fuscata Chao, 1963:221-224.

寄 主：

分 佈：雲南。

Peleteria honghuang Chao 紅黃長須寄蠅 (Chao, 1979:157; Liu, Zhao et al., 1998:276; Xue et al., 1996, 2:2016; Yunn., 1987:1260; Zhao et Zhou, 1992:1320)

Peleteria honghuang Chao, 1979:157-159.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(芒康)、山西、河北、北京。

Peleteria kuanyan (Chao) 寬額長須寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2016)

Cupphocera kuanyan Chao, 1979:156, 160.

寄 主：

分 佈：廣東、海南、雲南。

Peleteria lianghei Chao 亮黑長須寄蠅 (Chao, 1979:159; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Peleteria lianghei Chao, 1979:159, 190.

寄 主：

分 佈：西藏、青海(玉樹)。

Peleteria manomera Chao 針毛長須寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:249; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Peleteria manomera Chao, 1982:249.

寄 主：

分 佈：西藏(江達、芒康)。

Peleteria maura Chao et Shi 暗色長須寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:252; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Peleteria maura Chao et Shi, 1982:252.

寄 主：

分 佈：西藏(昌都、類烏齊)。

Peleteria melania Chao et Shi 黑頂長須寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:251; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1321; 1996:260)

Peleteria melania Chao et Shi, 1982, 2:251.

寄 主：

分 佈：西藏(察雅)、新疆。

Peleteria nitella Chao 光亮長鬚寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:250; Xue et al., 1996, 2:2016; Zhao et Zhou, 1992:1320)

Peleteria nitella Chao, 1982:250.

寄 主：

分 佈：西藏(察雅)。

Peleteria pallida Zimin 蒼白長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2016)

Peletieria pallida Zimin, 1935:612.

Hemipeletieria pallida Zimin, 1963:

寄 主：

分 佈：雲南、甘肅；蘇聯。

Peleteria placuna Chao 平肛長鬚寄蠅 (Yunn., 1987:1260; Xue et al., 1996, 2:2022; Zhao et Zhou, 1992: 1319)

Peleteria placuna Chao, 1982, 2:250.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏

Peleteria popelii (Portschinsky) 波氏長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022)

Echinomyia popelii Portschinsky, 1882:9.

Echinomyia bellardii Giglio-Tos, 1890:

寄 主：

分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、西伯利亞、聖彼得堡、烏克蘭、德國、丹麥、瑞典。

Peleteria prompta (Meigen) 敏捷長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022; Zhao et Zhou, 1996:259)

Tachina prompta Meigen, 1824:39.

寄 主：

分 佈：新疆(喀拉昆侖)；歐洲(阿爾卑斯山脈)、澳洲(施泰馬克)。

Peleteria propinqua (Zimin) 鈍突長鬚寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022)

Hemipeletiera propinqua Zimin, 1961:250.

寄 主：

分 佈：遼寧；日本、俄羅斯遠東地區。

Peleteria qutu Chao 曲突長鬚寄蠅 (Chao, 1979:160; Xue et al., 1996, 2:2022; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Peleteria qutu Chao, 1979:160-161.

寄 主：

分 佈：青海(玉樹)。

Peleteria riwogeensis Chao et Shi 類烏齊長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022; Zhao et Zhou, 1992:1321)

Peleteria riwogeensis Chao et Shi, 1982, 2:252:

寄 主：

分 佈：西藏。

Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy) 黑角長鬃寄蠅 (ASZI et al., 1978:221; Chao et Liang, 1984:159; Fan, 1992:797; He et al., 199':67; Shi, 1981(4):34; Xue et al., 1996, 2:2022; Zhao et Zhou, 1996:259)

Echinomyia rubescens Robineau-Desvoidy, 1830:46.

Echinomyia nigricornis Meigen, 1838:

Peletieria pulverulenta Robineau-Desvoidy, 1863:

Echinomyia nigricornis (Robineau-Desvoidy); Giglio-Tos, 1891:

Peletteria prompta (Meigen) of Bezzi, 1907:

寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎。

國外：*Agrotis cursoria* Hufnagl

Agrotis obelisca

Agrotis segetum Schiff. 黃地老虎

Agrotis vestigialis (Hufnnegal) 射水地老虎

Papilo machaon Linnaeus 茴香金鳳蝶

分 佈：雲南、新疆、內蒙古、黑龍江；古北區、西伯利亞、中亞、巴勒斯坦、聖彼得堡、英格蘭、瑞典、北美。

Peleteria rubihirta Chao et Zhou 紅毛長鬃寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5:210-211; Xue et al., 1996, 2:2022; Yunn., 1987:1261; Zhao et Zhou, 1992:1322)

Peleteria rubihirta Chao et Zhou, 1987, 5:210-211.

寄 主：

分 佈：雲南。

Peleteria semiglabra (Zimin) 腮長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022)

Hemipeletieria semiglabra Zimin, 1961:251.

寄 主：

分 佈：日本、俄羅斯遠東地區。

Peleteria sibirica (Smirnov) 西伯利亞長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2022)

Peleteria sibirica (Smirnov, 1922:177.)

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Peleteria sphyrocera (Macquart) 短翅長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2023)

Echinomyia sphyrocera Macquart, 1835:78.

=*Echinomyia brevipalpis* Portschinsky, 1881:

寄 主：

分 佈：河北、北京、內蒙古、遼寧、黑龍江；庫頁島、西伯利亞、外高加索、烏克蘭、意大利、瑞士。

Peleteria trifurca (Chao) 三叉長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2023)

Hemipeletieria trifurca Chao, 1963:222.

寄 主：

分 佈：雲南。

Peleteria triseta Zimin 黑頭長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2023; Zhao et Zhou, 1992:1318; 1996:259)

Peleteria triseta Zimin, 1961:298.

寄 主：

分 佈：青海、新疆、遼寧；蒙古、蘇聯。

Peleteria varia (Fabricius) 粘蟲長須寄蠅 (ASZI et al., 1978:221; Liu, Zhao et al., 1998:273; Xue et al., 1996, 2:2023)

Musca varia Fabricius, 1794:327.
Tachina javana Wiedemann, 1819:24.
Peleteria javanica Robineau-Desvoidy, 1830:40.
Echnomyia argyrocephala Macquart, 1845:272.
Jurinia angustiventris Macquart, *in* Lucas, 1849:476.
Tachina dorsalis Walker, 1852:275.
Cyphocera pyrrogaster Rondani, 1859:61.
Echinomyia sarcophagoides Walker, 1861:303.
Acuphocera sumatrensis Townsend, 1926:37.

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、內蒙古；西伯利亞、阿 穆爾、哈薩克斯坦、克里米亞、庫爾多維亞、外高加索、菲律賓、馬來西亞、泰國、尼泊爾、錫金、印尼、巴布亞新幾內亞、大洋洲、歐洲地中海至奧地利中部、意大利、阿爾及利亞，廣泛分布熱帶非洲地區、東洋區、澳洲區北部。

Peleteria versuta (Loew) 微長鬃寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:250; Liu, Zhao et al., 1998:278; Xue et al., 1996, 2:2023; Zhao et Zhou, 1992:1318; 1996:260)

Echinomyia versuta Loew, 1871:307.
=*Tetrachaeta obscura* Breauer et Bergenstamm, 1894:614.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(昌都、江達、類烏齊、吉隆)、四川、山西、河北、青海、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、日本、西伯利亞、哈薩克斯坦、荷蘭。

Peleteria xenoprepes (Loew) 克三長鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2023; Zhao et Zhou, 1996:259)

Echinomyia xenoprepes Loew, 1874:418.
=*Echinomyia balassogloi* Portshinsky, 1882:

寄 主：

分 佈：海南(南沙)、西藏、青海、新疆；蒙古、西伯利亞、哈薩克斯坦、伊朗。

Periarchiclops scutellaris (Fallén) 小盾派寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:161)

Tachina scutellaris Fallén, 11820:19.
寄 主：
分 佈：山西；西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、瑞典。

Peribaea aegyptia (Willeneuve) 埃及等鬃寄蠅 (ASZI, 1987, 2:712; Chao et Liang, 1984:52; He et al., 1991:67; Sun et al., 1984:110; Yunn., 1987:1193; Zhang, 1987[ed.] 2:71)
寄 主：*Brachmia macroscopa* Meyrick 甘薯麥蛾(湖北)
Mythimnia separata (Walker) 粘蟲
國外：夜蛾科各屬：
Earias 金鋼鑽屬
Laphygna 貪夜蛾屬
Spodoptera 斜紋夜蛾屬.
灰翅夜蛾屬
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、雲南、湖北；亞洲、巴勒斯坦、埃及、非洲中部、大西洲。

Peribaea fissicornis (Strobl) 長芒等鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2047)
Peribaea fissicornis (Strobl, 1909:139.)
寄 主：據記載：*Angerona prunaria* 李尺蠖
接骨木尺蠖
Himera ppennaria
Boarmia consortaria
Boarmia bistortata
Phigalia pedaria
Poecilocampa populi
松尺蠖
分 佈：浙江、歐洲。

Peribaea orbata (Wiedemann) 埃及等鬃寄蠅 (Fan, 1992:722; Xue et al., 1996, 2:2047)
Tachina orbata Wiedemann, 1830:336.
=*Gymnopareia aegyptia* Villeneuve, 1912:
寄 主：*Brachmia macroscopa* Meyrick 甘薯麥蛾
Mythimnia separata (Walker) 粘蟲
國外：
Earias 金鋼鑽屬
Laphygna 貪夜蛾屬
Prodenia
Spodoptera 斜紋夜蛾屬.
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、湖北；日本、印度、東洋區、巴勒斯坦、埃及、非洲區、澳洲、智利。

Peribaea palaestina (Villeneuve) 巴勒斯坦等鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2047; Yunn., 1987:1193; Zhao et Zhou, 1992:1288)

Actia palaestina Villeneuve, 1934:57.
寄 主：
分 佈：雲南；塔吉克斯坦、伊朗、以色列、埃及。

Peribaea similata (Malloch) 錫米等鬃寄蠅 (Yunn., 1987:1193; Xue et al., 1996, 2:2047; Zhao et Zhou, 1992:1288))
Strobliomyia similata Malloch, 1930:
寄 主：
分 佈：雲南、內蒙古；日本、馬來西亞。

Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy) 黃脛等鬃寄蠅 (Hun., 1992:1201; Liu, Zhao et al., 1998:289; Sun et al., 1992:637; Xue et al., 1996, 2:2047)
Herbstia tibialis Robineau-Desvoidy, 1851:185.
Thryptocera exoleta (Meigen) of Schiner, 1862:520.
Peribaea apicalis Robineau-Desvoidy, 1836:721.
Peribaea flavicornis Robineau-Desvoidy, 1836:721
Strrobliomyia mitis Curran, 1927:323.
寄 主：據記載：*Asticta pastinum* Tr.
Anarta myrtilli Linnaeus
Lasiocampa gradis (Kugler)
Orgyia dubia Dup.
Prosopolopha jourdanaria Vill.
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、貴州、浙江、山西、北京、黑龍江；蒙古、日本、烏茲別克斯坦、外高加索、巴勒斯坦、非洲、法國、德國、奧地利，古北區。

Periscepsia carbonaria (Panzer) 黑頭裸盾寄蠅 (ASZI, 1987, 2:713; Chao et Liang, 1984:154; Fan, 1992:792; Shi, 1981(4):35; Xue et al., 1996, 2:2137; Zhao et Zhou, 1992:1337)
Musca carbonaria Panzer, 1798:15.
Phorichaeta fuliginaria Rondani, 1861:
Wagneria nigrans Meigen, 1826:
寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎
Agrotis ipsilon (Rottemberg) 小地老虎
國外：*Agrotis* sp. 地老虎
Euxoa segetum Schiffermüller (黃地老虎)具條切根蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
分 佈：雲南、西藏、四川、北京、寧夏、甘肅、新疆；外高加索、巴勒斯坦、英國南部、瑞典、芬蘭。

Periscepsia handlirschi (Brayer-Bergenstamm) 漢氏裸盾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2137; Zhao et Zhou, 1992:1337; 1996:264)
Phorichaeta handlirschi Brayer-Bergenstamm, 1891:356.
寄 主：*Cosmotriche saxosimilis* Lajonquiere 高山小毛蟲(雲南)
分 佈：雲南、西藏、四川、新疆；巴勒斯坦、西班牙、意大利。

Periscepsia meyeri Villeneuve 麥爾裸盾寄蠅 (Yunn., 1987:1255)

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
國外：*Cerocala scapulosa* Hb.
分 佈：雲南；非洲北部。

Periscepsia misella (Villeneuve) 貧裸盾寄蠅 (Chao et Shi, 1982:238; Xue et al., 1996, 2:2137; Zhao et Zhou, 1992:1337)
Wagneria misella Villeneuve, 1937:13.
寄 主：*Cosmotriche saxosimilis* Lajonquiere 高山小毛蟲。
分 佈：西藏、四川。

Periscepsia umbrinervis (Villeneuve) 暈脈裸盾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2137)
Wagneria umbrinervis Villeneuve, 1937:13.
寄 主：
分 佈：西藏。

Peteina erinaceus (Fabricius) 刺拍寄蠅 (ASZI, 1987, 2:713; ASZI et al., 1978:219; Chao et Liang, 1984:156; Fan, 1992:794; He et al., 1991:67; Li, 1987:29; Liu, Zhao, 1998:336; Xue et al., 1996, 2:2136)
Musca erinaceus Fabricius, 1794:328.
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Mythimna separata Walker 粘蟲。
國外：*Cucullia asteris* Schiffermüller 菊冬夜蛾
Plusia gamma Linnaeus
分 佈：陝西、山西、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、歐洲中北部、瑞典。

Peteina hyperdiscalis Aldrich 粗鬃拍寄蠅 (Chao et Liang, 1984:156; Chao et Shi, 1982: Chao et Zhou, 1988:514; Xue et al., 1996, 2:2136; Zhao et Zhou, 1992:1338)
Peteina hyperdiscalis Aldrich, 1926:19.
寄 主：
分 佈：西藏(波密)、四川、青海、內蒙古。

Peteteria rubescens Robineau-Desvoidy 黑角長須寄蠅 (ASZI, 1987, 2:714)
寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller 黃地老虎
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：新疆、內蒙古、黑龍江；古北區、北美。

Pexopsis aprica (Meigen) 日梳寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:212; Xue et al., 1996, 2:1904)
Tachina aprica Meigen, 1824:384.
=*Tachina austera* Meigen, 1924:383.
=*Eurigaster tibialis* Robineau-Desvoidy, 1848:435.
=*Frontinaa tibialis* Macquart, 1850:435.
寄 主：據記載：*Melolontha vulgaris* Linnaeus 西方五月鰓金龜
Melolontha hippocastani Fabricius 東方五月鰓金龜
Rhizotrogus aestivus Oliver 夏切根鰓金龜

分 佈：上海、山西；西伯利亞、烏克蘭、法國、德國、歐洲。

Pexopsis aurea Sun et Chao 金黃梳寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:214; Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis aurea Sun et Chao, 1993:447-448.
寄 主：
分 佈：山西、遼寧。

Pexopsis buccalis Mesnil 頰梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis buccalis Mesnil, *in* Lindner, 1952:210.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇、上海、遼寧。

Pexopsis capitata Mesnil 凱梳寄蠅 (ASZI, 1987, 2:715; Chao et Liang, 1984:122; Fan, 1992:769; Hun., 1992: 1192; Liu, Zhao et al., 1998:213; Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis capitata Mesnil, *in* Lindner, 1952:210.
寄 主：國外：*Holotrichia diomphalia* Bates　大黑鰓金龜(成蟲)
Popillia japonica Newman　日本弧麗金龜
分 佈：湖南、廣東、海南、雲南、浙江、江蘇、上海、山西、北京、遼寧、吉林；日本、俄羅斯遠東地區。

Pexopsis clauseni (Aldrich) 柯勞氏梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1904)

Trophops clauseni Aldrich, 1932:22.
寄 主：據記載：*Popillia japonica* Newman　日本弧麗金龜
分 佈：浙江、安徽；日本。

Pexopsis dongchuanennsis Sun et Chao 東川梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis dongchuanennsis Sun et Chao, 1993:447-458.
寄 主：
分 佈：雲南。

Pexopsis flvipsis Sun et Chao 黃足梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis flvipsis Sun et Chao, 1993:446-458.
寄 主：
分 佈：河北(東陵)。

Pexopsis kyushuensis Shima 九州梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1904)

Pexopsis kyushuensis Shima, 1968:12.
寄 主：
分 佈：廣東、雲南、四川、浙江、安徽。

Pexopsis longicornis Sun et Chao 長角梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis longicornis Sun et Chao, 1993:446, 451, 454.
寄 主：
分 佈：上海。

Pexopsis orientalis Sun et Chao 東方梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis orientalis Sun et Chao, 1993:446-458.

寄 主：

分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇。

Pexopsis pollinis Sun et Chao 厚粉梳寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:210; Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis pollinis Sun et Chao, 1993:450.

寄 主：

分 佈：山西(翼城)。

Pexopsis rasa Mesnil 拉沙梳寄蠅 (Sun et al., 1992:633; Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis rasa Mesnil, 1870:107.

寄 主：

分 佈：貴州、雲南、浙江；菲律賓、馬來西亞。

Pexopsis shanghaiensis Sun et Chao 上海梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis shanghaiensis Sun et Chao, 1993:446, 451, 454.

寄 主：

分 佈：上海。

Pexopsis shanxiensis Sun et Chao 山西梳寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:210; Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis shanxiensis Sun et Chao, 1993:451-452, 454-455.

寄 主：

分 佈：山西(翼城)。

Pexopsis trichifacialis Sun et Chao 毛顏梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis trichifacialis Sun et Chao, 1993:452, 455.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Pexopsis yakushimana Shima 野氏梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis yakushimana Shima, 1968:9.

寄 主：

分 佈：浙江；日本(富山)。

Pexopsis zhangi Sun et Chao 張氏梳寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1910)

Pexopsis zhangi Sun et Chao, 1993:452-453.

寄 主：

分 佈：雲南(維西)。

Phasia barbifron (Girschner) 鬃堤突顏寄蜂 (Liu, Zhao et al., 1998:348)

Alophora barbifrons Girschner, 1887:410.

寄 主：

分 佈：西藏、山西；俄羅斯、波蘭、奧地利、德國、瑞士、法國。

Phasioormia pallida Townsend 淡色異相寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1955)

Phasioormia pallida Townsend, 1933:448.

寄 主：

分 佈：海南；新加坡。

Phebellia agantella Mesnil 艾格菲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1861; Yunn., 1987:1243; Zhao et Zhou, 1992: 1302)

Phebellia agantella Mesnil *In* Lindner, 1955:458.

寄 主：

分 佈：雲南、上海、山西、河北、遼寧；日本、越南。

Phebellia carceliaeformis (Villeneuve) 擬狹頰菲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1861)

Aplomyia carceliaeformis Villeneuve, 1937:3.

寄 主：

分 佈：四川。

Phebellia clavellariae (Brauer et Bergenstamm) 葉蜂菲寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:178)

Parexorista clavellariae Brauer et Bergenstamm, 1891:326.

寄 主：

分 佈：山西、北京、青海、吉林；西伯利亞、捷克、波蘭、德國、奧地利。

Phebellia glirina (Rondani) 截尾菲寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1861; Yunn., 1987:1244; Zhao et Zhou, 1992: 1301)

Exorista glirina Rondani, 1859:129.

Aettylia laeta Robineau-Desvoidy, 1863:

寄 主：據記載：*Abia sericea*

Acronycta tridens Schiff.

分 佈：雲南、內蒙古；日本、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、列寧格勒、意大利、法國、蘇格蘭。

Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy) 黑鬚菲寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:180; Xue et al., 1996, 2:1861)

Huebneria nigripalpis Robineau-Desvoidy, 1847:612.

=*Huebneria fuscipennis* Robineau-Desvoidy, 1847:611. (missident.)

=*Exorista agnata* Rondani, 1859:144.

=*Exorista congnata* Rondani, 1859:144.

=*Exorista pareens* Rondani, 1859:145.

=*Parexorista raiblensis* Brauer et Bergenstamm, 1891:324.

=*Parexorista setosa* Brauer et Bergenstamm, 1891:325.

寄 主：

分 佈：山西、新疆?；日本、西伯利亞、中亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、德國、瑞典。

Phonomyia aristata (Rondani) 曲脈發音寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:183; Xue et al., 1996, 2:1867)

Phorocera aristata Rondani, 1861:162.

Phorocera curvinervis Portshinsky, 1881:275.

Phonomyia micronyx Brauer et Bergenstamm, 1893:203.
寄 主：
分 佈：山西、青海；蒙古、西伯利亞、烏克蘭、哈薩克斯坦、捷克和斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利、奧地利、瑞士、意大利。

Phorinia aurifrons Robineau-Desvoidy 黃額蚤寄蠅 (Hun., 1992:1168; Liu, Zhao et al., 1998:108; Sun et al., 1992:621; Xue et al., 1996, 2:1706; Yunn., 1987:1202; Zhao et Zhou, 1992:1279)
Phorinia aurifrons Robineau-Desvoidy, 1830:118.
=*Phorinia delecta* Meigen, 1838:262.
=*Diria nigripalpis* Rondani, 1859:174.
=*Eretria excitata* Robineau-Desvoidy, 1863:492.
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、德國、歐洲北部。

Phorinia pruinovitta Chao et Liu 粉額蚤寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:109; Liu et al., 1985:168; Xue et al., 1996, 2:1706)
Phorinia pruinovitta Chao et Liu, 1985:168-169, 172-173..
寄 主：
分 佈：山西。

Phorocera agilis Robineau-Desvoidy 毒蛾蜉寄蠅 (ASZI, 1987, 2:715; ASZI et al., 1978:216; Choa et Liang, 1984:56 Shi, 1981(4):36; Shi, 1995:537)
Phorocera agilis Robineau-Desvoidy, 1830:
寄 主：*Antheraea pernyi* Guér 柞蠶
Lymantria dipar (Linnaeus) 舞毒蛾。
國外除 *Lymantria dipar* 外,
尚有 *Lymantria monacha* 模舞毒蛾(僧尼舞毒蛾)
分 佈：浙江、遼寧、黑龍江；日本、歐洲中南部。

Phorocera assimilis (Fallén) 勻肛蜉寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:112; Xue et al., 1996, 2:1704)
Tachina assimilis Fallén, 1819:282.
Phorocera agilis Robineau-Desvoidy, 1830:283.
Metopia rapida Macquart, 1835:663.
Tachina munita Walker, 1853:82.
Setigena gradis (Rondani) of Brauer et Bergeenstamm, 1889:94. (missident.)
Phorocera gramma (Meiger) of Mesnil, 1946:79. (missident.)
寄 主：*Lymantria dispae* (Linnaeus) 舞毒蛾。
據記載爲夜蛾科和尺蛾科幼蟲，如：
Abrostlola tripartita
Taeniocampa pulverulenta
八字地老虎
菜園夜蛾
淺灰尺蛾
分 佈：山西、遼寧、吉林、黑龍江；日本、亞洲中部、歐洲(南部和中部)。

Phorocera grandis Rondani 錐肛蜉寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1704)

Phorocera grandis Rondani, 1859:178.
=*Leotochaeta ptilopareeia* Brauer et Bergenstamm, 1889:
=*Phorocera carmelitana* Kugler, 1963:
寄 主：據記載：棕尾毒蛾
分 佈：遼寧；日本、俄羅斯、法國、德國、奧地利、捷克、斯洛伐克。

Phorocera obscura Fallén 昏暗蜉寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1704)

Phorocera obscura Fallén, 1810:281.
寄 主：據記載爲尺蛾幼蟲的重要天敵：
松白條尺蛾
暗點赭尺蛾
樺枝尺蛾
H. leucophaearia
三月尺蛾
樺秋尺蛾
分 佈：黑龍江；日本、俄羅斯(聖彼得堡)、英格蘭、瑞典、歐洲北部。

Phorocerosoma anomala Baranov 毛斑裸板寄蠅 (Yunn., 1987:1229)

寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、上海；非洲。

Phorocerosoma aurea Sun et Chao 金黃裸板寄蠅 (Sun et Chao, 1994:120; Sun et al., 1992:625; Xue et al., 1996, 1:1758)

Phorocerosoma aurea Sun et Chao, 1994:119-121.
寄 主：
分 佈：貴州。

Phorocerosoma forte Townsend 簇纓裸板寄蠅 (ASZI, 1987, 2:715; Yunn., 1987:1192, 1229)

寄 主：*Hieroglyphus annulicornis* Shiraki 短角蔗蝗(甘蔗青蝗)。
分 佈：福建、江西、廣西、雲南、四川、浙江、上海、遼寧、黑龍江；日本、印尼。

Phorocerosoma pilipes Villeneuve 毛裸板寄蠅 (Sun et Chao, 1994:119; Sun et al., 1992:626; Xue et al., 1996, 1:1758)

Phorocerosoma pilipes Villeneuve 1916:483.
寄 主：
分 佈：臺灣、貴州、浙江、安徽；馬達加斯加。

Phorocerosoma pilipes anomala Baranov 毛斑裸板寄蠅 (Yunn., 1987:1193)

寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、上海；馬來西亞、尼泊爾、巴布亞新幾內亞、澳洲、非洲。

Phorocerosoma postulans (Walker) 毛斑裸板寄蠅 (Hun., 1992:1174; Sun et Chao, 1994:119; Sun et al., 1992:625; Xue et al., 1996, 2:1758)

Nemoraea postulans Walker, 1861:240.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；馬來西亞、尼泊爾、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、非洲摩鹿加。

Phorocerosoma vicaria (Walker) 簇纓裸板寄蠅 (Chao, 1994:119; Chao et Zhou, 1997:1535; Hun., 1992:1174; Sun e al., 1992:626; Xue et al., 1996, 1:1758)

Phorocerosoma vicaria (Walker, 1856:20.)

寄 主：*Hieroglyphus annulicornis* (Shiraki) 斑角蔗蝗。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、遼寧、黑龍江；日本、馬來西亞、新加坡、印尼。

Phryno vetula (Meigen) 拱頭芙蕊寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1928)

Tachina vetula Meigen, 1824:399.

寄 主：據記載：肉食黃夜蛾

Taeniocampa mimiosa

Taeniocampa stabilis

Larentia ruberata

模舞毒蛾

Phigalia pedaria 尺蛾

分 佈：浙江、河北；西伯利亞、外高加索、英國、丹麥。

Phryno yichengica Chao et Liu 翼城芙蕊寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:231)

Phryno yichengica Chao et Liu

寄 主：

分 佈：山西。

Phryxe heraclei (Meigen) 赫氏怯寄蠅 (Sun et al., 1992:626; Xue et al., 1996, 2:1882; Zhao et Zhou, 1992:1305)

Tachina heraclei Meigen, 1824:339.

Lydella terminalis Macquart, 1834:

Melibaea zonaria Robineau-Desvoidy, 1847:

Tachina amphiro Walker, 1849:

Tachina fulvifrons Zetterstedt, 1859:

Phryxe activa Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe sortita Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe boscorum Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe atrabilis Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe silvestris Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe ancilla Robineau-Desvoidy, 1863:

Phryxe latiloata Wainwright, 1940:

寄 主：松線小捲蛾。

據記載：牧草枯葉蛾

分 佈：貴州、雲南、西藏、四川、寧夏；蒙古、日本、千島群島、西伯利亞南部、外高加索、歐洲北達英格蘭和瑞典南部。

Phryxe magnicornis (Zetterstedt) 巨角怯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1882)

Tachina magnicornis Zetterstedt, 1838:644.
Tachina pusilla Zetterstedt, 1859:
Phryxe longicauda Wainwright, 1940:
寄 主：菜粉蝶。
分 佈：遼寧；蒙古、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、英格蘭、瑞典、挪威。

Phryxe nemea (Meigen) 獅頭怯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1882)

Tachina nemea Meigen, 1824:644.
=*Tachina popularis* Meigen, 1924:
=*Tachina bimaculata* Stephens, 1829:
=*Tachina quadricincta* Stephens, 1829:
=*Tachina urbana* Meigen, 1833:
=*Tachina sstraminifrons* Zetterstedt, 1844:
=*Exorista parvula* Macquart, 1849:
=*Exorista acris* Macquart, 1849:
=*Masicera montana* Macquart, 1850:
=*Tachina quadricincta* Walker, 1853:
=*Phryxe spreta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe aurea* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe aurifrons* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe socia* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe aurocincta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe binotata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe pupivora* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Exorista vivax* Rondani, 1868:
=*Catachaeta depressariae* Brauer et Bergenstamm, 1891
=*Blepharidopsis hartigii* Mik et Wachtl, 1895:
寄 主：據記載：醋栗尺蠖
Bistoon hirtaria
Cacoecia murinana
榆兜夜蛾
槭兜夜蛾
波紋夜蛾
Depressaria heydeni
Eurhiparia urticae
黑點赭尺蠖
Habrynthis scita
黃褐天幕毛蟲
Mamestra oleracea
Phlogopphora meticulosa
小菜粉蝶
大西洋赤蛺蝶
Taeniocampa incerta

分 佈：青海；日本、庫頁島、西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英國、愛爾蘭、瑞士、德國、奧地利、瑞典。

Phryxe patruelis Mesnil 帕蜍怯寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:274: Sun et al., 1992:626; Yunn., 1987:1245; Zhang, 1998, 14(2):46; Zhao et Zhou, 1992:1304)

Phryxe patruelis Mesnil, 1953:

寄 主：*Mamestra brassicae* Linnaeus 甘藍夜蛾。

分 佈：貴州、雲南、西藏(吉隆、亞東、樟木)、四川；緬甸、印度(喜馬拉雅山地區)。

Phryxe vulgaris (Fallén) 普通怯寄蠅 (ASZI, 1987, 2:716; ASZI et al., 1978:209; Chao et Liang, 1984:135; Chao et Zhang, 1982:274; Cui, 1992:292; Fan, 1992:779; He et al., 1991: 67; Hu, 1983:288; Liu, Zhao et al., 1998:195; Shi, 1981(4):33, 38; Xue et al., 1996, 2:1883; Zhao et Huang, 1989:138; Zhao et Zhou, 1992:1304; Zhao et al., 1986:42)

Tachina vulgaris Fallén, 1810:275.
=*Tachina aratoria* Meigen, 1824:338.
=*Tachina familiaris* Meigen, 1824:359.
=*Tachina temera* Meigen, 1824:392.
=*Lydella scutellaris* Robineau-Desvoidy, 1830:115.
=*Phryxe ciliata* Robineau-Desvoidy, 1830:159.
=*Phryxe subrotundata* Robineau-Desvoidy, 1830:161.
=*Phryxe depressa* Robineau-Desvoidy, 1830:162.
=*Phryxe athaliae* Robineau-Desvoidy, 1830:167.
=*Exorista prominens* Meigen, 1838:256.
=*Tachina praetervisa* Zetterstedt, 1844:1123.
=*Tachina rotundaticornis* Zetterstedt, 1844:1143.
=*Tachina mobilis* Zetterstedt, 1844:1165.
=*Tachina tyche* Walker, 1849:738.
=*Exorista vivida* Macquart, 1849:385.
=*Exorista inclinata* Macquart, 1849:386.
=*Exorista audax* Macquart, 1849:388.
=*Exorista brevis* Macquart, 1849:388.
=*Exorista insinuans* Macquart, 1849:395.
=*Exorista singularis* Macquart, 1849:396.
=*Exorista griseifrons* Macquart, 1849:399.
=*Exorista elliptica* Macquart, 1849:408.
=*Exorista florida* Macquart, 1849:409.
=*Exorista cita* Macquart, 1849:412.
=*Exorista crassistylum* Macquart, 1849:412.
=*Exorista diffusa* Macquart, 1849:412.
=*Exorista diffusa* Macquart, 1849:413
=*Exorista habilis* Macquart, 1849:413
=*Phryxe vanassae* Robineau-Desvoidy,. 1850:171
=*Phryxe pieridis* Robineau-Desvoidy,. 1850:172.
=*Tachina distermina* Walker, 1853:61.
=*Tachina constans* Walker, 1853:75.
=*Tachina neglecta* Walker, 1853:79.
=*Tachina collecta* Walker, 1853:298.
=*Phryxe stimulata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe lavata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe tranquilla* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe cognata* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe proxima* Robineau-Desvoidy, 1863:

=*Phryxe compos* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe praefixa* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Phryxe valida* Robineau-Desvoidy, 1863:354.
=*Phryxe provida* Robineau-Desvoidy, 1863:355.
=*Phryxe obsequens* Robineau-Desvoidy, 1863:356.
=*Phryxe integra* Robineau-Desvoidy, 1863:360.
=*Phryxe volatilis* Robineau-Desvoidy, 1863:362.
=*Phryxe cauta* Robineau-Desvoidy, 1863:375.
=*Phryxe quadriguttata* Robineau-Desvoidy, 1863:378.
=*Phryxe sororella* Robineau-Desvoidy, 1863:381.
=*Phryxe cinerea* Robineau-Desvoidy, 1863:387.
=*Phryxe lusoria* Robineau-Desvoidy, 1863:387.
=*Phryxe serva* Robineau-Desvoidy, 1863:388.
=*Phryxe miniata* Robineau-Desvoidy, 1863:389.
=*Phryxe tristis* Robineau-Desvoidy, 1863:389.
=*Phryxe rubrella* Robineau-Desvoidy, 1863:390.
=*Phryxe appellate* Robineau-Desvoidy, 1863:391.
=*Phryxe misera* Robineau-Desvoidy, 1863:391.
=*Phryxe muscidea* Robineau-Desvoidy, 1863:392.
=*Phryxe vesana* Robineau-Desvoidy, 1863:392.
=*Phryxe conducta* Robineau-Desvoidy, 1863:393.
=*Phryxe neglecta* Robineau-Desvoidy, 1863:393.
=*Phryxe cita* Robineau-Desvoidy, 1863:395.
=*Phryxe timida* Robineau-Desvoidy, 1863:395.
=*Phryxe jussa* Robineau-Desvoidy, 1863:396.
=*Phryxe innoxia* Robineau-Desvoidy, 1863:397.
=*Phryxe consentanea* Robineau-Desvoidy, 1863:400.
=*Phryxe judicata* Robineau-Desvoidy, 1863:401.
=*Phryxe grata* Robineau-Desvoidy, 1863:402.
=*Phryxe vafra* Robineau-Desvoidy, 1863:403.
=*Phryxe morose* Robineau-Desvoidy, 1863:404.
=*Phryxe obtenta* Robineau-Desvoidy, 1863:404.
=*Phryxe sereena* Robineau-Desvoidy, 1863:406.
=*Phryxe stimulata* Robineau-Desvoidy, 1863:406.
=*Phryxe lavata* Robineau-Desvoidy, 1863:407.
=*Phryxe tranqulla* Robineau-Desvoidy, 1863:407.
=*Phryxe cognata* Robineau-Desvoidy, 1863:408.
=*Phryxe proxima* Robineau-Desvoidy, 1863:408.
=*Phryxe compos* Robineau-Desvoidy, 1863:409.
=*Phryxe praefixa* Robineau-Desvoidy, 1863:409.
=*Phryxe fugitiva* Robineau-Desvoidy, 1863:411.
=*Phryxe vernalis* Robineau-Desvoidy, 1863:411.
=*Pseudophorocera setigera* Brauer et Bergenstamm, 1889:92 .
寄 主：*Aporia crataegi* Linnaeus 山楂粉蝶
Malacosoma neustria testacea Linnaeus 天幕毛蟲
Nymphalis vau-album Schiff. 白斑樺蛺蝶
Pieris rapae (Linnaeus) 菜白蝶
Mythimna separata Walker 粘蟲
Loxostege sticticalis (Linnaeus) 草地螟
Polia illoba (Butler) 紅棕灰夜蛾。

據記載國外 80 餘種鱗翅目昆蟲和一種葉蜂：

Abraxas asclepiadis Schiff. 白前隱金夜蛾
Abraxas grossulariata Linnaeus 醋栗尺蠖
Acronycta auricoma Fabricius
Acronycta psi Linnaeus 賽劍紋夜蛾
Adopaea lineola Ochs.
Agrotis paecox Linnaeus 翠地老虎
Agrotis segetum Schiff. 黃地老虎
Anthocharis cardmines Linnaeus
Aporia crataegi Linnaeus 山楂粉蝶
Araschnia levana Linnaeus 赤斑蛺蝶
Araschnia prorsa Linnaeus 夏型赤斑蛺蝶
Arctia caja (Linnaeus) 豹燈蛾(甘藍褐燈蛾
Arctia hebe Linnaeus
Arctia plantaginis Linnaeus
Argynnis lathonia Linnaeus
Biston zonarius Linnaeus
Boarmia bistortata Geoze
Brotolomia meticulosa Linnaeus 瑪瑙夜蛾
Calymnia trapezina Linnaeus 肉食黃夜蛾
Chesias spartiata Herbst
Cosmotriche potatoria Linnaeus 牧草枯葉蛾
Cucullia anthemidis Gn.
Cucullia asteris Schiff. 菊冬夜蛾
Cucullia verbasei Linnaeus 具條冬夜蛾
Dasychira pudibunda Linnaeus 蘋紅尾毒蛾
Dendrolimus pini Linnaeus 歐洲松毛蟲
Dianthoecia cucubali Fuessl.
Diphthera alpium Osb. 苔蛾
Diprion pini Linnaeus 松葉蜂
Dryobota protea Bork.
Ephyra linearia Hübner
Epineuronia cespitis Fabricius
Euplexia lucipara Linnaeus 甜菜夜蛾
Evergestis extimalis Scop. 萊菔螟
Evetria buoliana Schiff. 松梢小卷蛾
Hadena ochroleuca Schiff.
Halias (Hylophila) prasinana Linnaeus 山毛櫸青實蛾
Hybernia defoliaria Linnaeus
Hydriomera dotata Linnaeus
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Hyponomeuta padella Linnaeus 蘋果巢蛾
Laspeyresia pomonella Linnaeus 蘋小卷蛾

Leucania albipuncta Fabricius
Leucania lithargyrea Esp.
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲
Mamestra advena Fabricius
Mamestra dissimilis Knoch 草木樨夜蛾
Mamestra persicariae Linnaeus
Mamestra reticulata Vill.
Melitaea athalia Fabricius
Metopsilus porcellus Linnaeus
Naenia typica Linnaeus
Neodiprion sertifer G. 松銹鋸角葉蜂
Notolophus antiquus Linnaeus
Nygmia phacorrhaea Linnaeus 棕尾毒蛾
Ophinsa pastinum Tr.
Operophthera brumata Linnaeus 松白條尺蠖
Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾
Panolis flammea Schiff. 松夜蛾
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶
Pieris daplidice Linnaeus
Pieris napi Linnaeus 冬油菜粉蝶
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶
Procrustes coriaceus Linnaeus
Plusia gamma Linnaeus Y 紋夜蛾
Pyrameis cardui Linnaeus 小苧麻赤蛺蝶
Pyrrhidium sanguineum Linnaeus
Rhyparia purpurata Linnaeus 黃燈蛾
Tephroclystia innotata Hufn.
Thamnonoma wauaria Linnaeus
Vanessa antipa Linnaeus 長吻蛺蝶
Vanessa jo Linnaeus
Vanessa polychloros Linnaeus 雜色蛺蝶
Vanessa urticae Linnaeus 蕁麻蛺蝶
Vanessa xanthomelas Esp. 櫸蛺蝶
Zeiraphera griseana Hübner
Zygaena achilleae Esp.
Zygaena filipendulae Linnaeus 珍珠梅斑蛾
Zygaena fausta Linnaeus
Zygaena lonicerae Schiff.

分 佈：雲南、西藏(雪巴)、陝西、山西、河北、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、千島、西伯利亞、中亞、外高加索、以色列、歐洲以地中海向北達愛爾蘭、蘇格蘭、拉普蘭、瑞士、奧地利、瑞典。

Phyllomyia albipila Shima et Chao 白毛駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2149)
Phyllomyia albipila Shima et Chao, 1992:633-645.
寄 主：
分 佈：四川。

Phyllomyia angusta Shima et Chao 狹顏駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2149)
Phyllomyia angusta Shima et Chao, 1992:633-645.
寄 主：
分 佈：雲南。

Phyllomyia annularis (Villeneuve) 環形駝背寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:345; Xue et al., 1996, 2:2152; Zhao et Zhou 1992:1342)
Macquartia annularis Villeneuve, 1937:8.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川、山西、內蒙古(滿洲里)。

Phyllomyia elegans Villeneuve 標致駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2152)
Phyllomyia elegans Villeneuve, 1937:13.
寄 主：
分 佈：四川。

Phyllomyia formosana Shima 臺灣駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2152)
Phyllomyia formosana Shima, 1988:11-13.
寄 主：
分 佈：臺灣

Phyllomyia gymnops (Villeneuve) 吉姆駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2152; Zhao et Zhou, 1992:1341)
Macquartia gymnops Villeneuve, 1937:7.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川。

Phyllomyia palpalis Shima et Chao 紅鬚駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2152)
Phyllomyia palpalis Shima et Chao, 1992:63-645.
寄 主：
分 佈：雲南。

Phyllomyia rufiventris Shima et Chao 紅腹駝背寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2152)
Phyllomyia rufiventris Shima et Chao, 1992:633-645.
寄 主：
分 佈：雲南。

Plagiomima sinaica Villeneuve 西奈擬緣寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2132)
Plagiomima sinaica Villeneuve, 1909:81.
寄 主：據記載：*Carcharodes ramses*

分 佈：內蒙古；蘇聯、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞。

Platymyia antennata (Brauer et Bergeenstamm) 短芒扁寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1918; Zhao et Zhou, 1996:256)

Parexorista antennata Brauer et Bergeenstamm, 1891:325.
寄 主：
分 佈：新疆；西伯利亞、外高加索、以色列。

Platymyia fimbriata (Meigen) 林蔭扁寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:215; Xue et al., 1996, 2:1918; Zhao et Zhou, 1992:1289)

Tachina fimbriata Meigen, 1824:337.
=*Tachina nemestrina* Meigen, 1824:336.
=*Tachina arvensis* Meigen, 1824:
=*Platymyia aestivalis* Robineau-Desvoidy, 1830:117.
=*Phryxe consobrina* Robineau-Desvoidy, 1830:160.
=*Tachina brevipennis* Meigen, 1838:193.
=*Tachina hyalinippennis* Zetterstedt, 1838:645.
=*Tachina tricingulata* Zetterstedt, 1838:646.
=*Tachina hyalinata* Zetterstedt, 1844:1187.
=*Tachina commixta* Zetterstedt, 1849:3244.
=*Platymyia nitida* Robineau-Desvoidy, 1863:192.
=*Phryxe levis* Robineau-Desvoidy, 1863:331.
=*Phryxe concolor* Robineau-Desvoidy, 1863:334.
=*Phryxe quaesita* Robineau-Desvoidy, 1863:336.
=*Phryxe aprica* Robineau-Desvoidy, 1863:337.
=*Platymyia genibarbis* Mesnil, *in* Lindner, 1954:375.
寄 主：據記載：*Thalpochares rosea* Hb.
Thamnonoma wauaria Linnaeus
Acronicta psi Linnaeus 梨劍紋夜蛾
Clavellaria amerinae Linnaeus 大青楊葉蜂
Nematus cheilon Brischke
Pteronides oligospilus (Brauer)
分 佈：雲南、西藏、山西、黑龍江；朝鮮、蒙古、千島群島、庫頁島、西伯利亞、外高加索、中亞、法國、愛爾蘭、英格蘭、蘇格蘭、德國、瑞典、挪威。

Platymyia hortulana (Meigen) 立毛扁寄蠅 (ASZI, 1987, 2:716; Chao et Liang, 1984:137; Fan, 1992:781; Shi, 1981(4):35; Xue et al., 196, 2:1918)

Tachina hortulana Meigen, 1824:330.
=*Platymyia nana* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Platymyia scutellaris* Robineau-Desvoidy, 1836:
=*Carcelia hilaris* Robineau-Desvoidy, 1847:
=*Parexorista blepharipoda* Brauer et Bergenstamm, 1891:
=*Platymyia ingens* Stein, 1924:
寄 主：*Acronycta incretata* Hampson 蘋劍紋夜蛾
Cosmotriche monotona (F. Daniel) 秦小毛蟲
蘋果透翅蛾。
國外：*Acronycta alni* Linnaeus
Acronycta leporina Linnaeus 白劍紋夜蛾

Acronycta psi Linnaeus
Acronycta tridens Schiff. 三齒劍紋夜蛾
Cucullia artemisiae
Dendroliimus pini Linnaeus
Hyloicus pinastri Linnaeus 松天蛾
Malacosoma neustria Linnaeus 天幕毛蟲
Panolis flammea Schiff.
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶
Porthetria dispar Linnaeus
Taeniocampa stabilis
分 佈：陝西、山西、北京、內蒙古、遼寧；歐洲。

Platymyia melancholica Mesnil 黑斑扁寄蠅 (ASZI, 1987, 2:717)
寄 主：櫟斜紋夜蛾。
分 佈：江蘇；印度。

Platymyia mitis Meigen 柔毛扁寄蠅 (ASZI, 1987, 2:717; Chao et Liang, 1984:138; Fan, 1992:781; Shi, 1981(4):38; Xue et al., 1996, 2:1918)
Platymyia mitis Meigen, 1824:335.
=*Phryxe nigrita* Robineau-Desvoidy, 1836:
=*Platymyia linearicornis* Zetterstedt, 1844:
=*Hubneria nitida* Robineau-Desvoidy, 1847:
=*Exorista ardens* Macquart, 1849:
=*Phryxe nigrita* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：*Spilonota laricana* Heineman 松白小卷蛾
國外：*Calymnia trapezina* Linnaeus 肉食黃夜蛾
Cydia (*Carpocapsa*) *pononella* Linnaeus 蘋小捲蛾
Loxostege sticticalis Linnaeus 草地螟
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Ostrinia nubilalis Hübner 歐洲玉米螟
Taeniocampa gracilis Fabricius
分 佈：遼寧、黑龍江；歐洲。

Platymyia nemestrina Meigen 林蔭扁寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:275; Yunn., 1987:1245)
寄 主：國外鱗翅目：
Clavellaria amerianae Linnaeus
Hymenoptera tenthred
Nematus cheilon Brischke
Pteronidea oligospilus (Brauer)
Thalpochares rosea Hb.
Thamnonoma wawarial Linnaeus
分 佈：雲南、西藏(雪巴)；歐洲。

Platymyia westermanni (Zetterstedt) 韋斯扁寄蠅 (Liu et Li, 1986:94; Xue et al., 1996, 2:1919; Yunn., 1987:1245)

Tachina westermanni Zetterstedt, 1844:1120.
寄 主：*Loxostege sticticalis* 草地螟。
據記載：*Cucullia prenanthis* 榆兜夜蛾
分 佈：雲南、山西；丹麥。

Prodegeeria chetopygidiale (Townsend) 二鬃毛芒蕤蠅 (Chao te Zhang, 1982:263; Xue et al., 1996, 2:1720)
Euthelairosoma chaetopygialis Townsend, 1926:33.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、西藏(墨脫)；馬來西亞、印尼、索羅門群島。

Prodegeeria japonica (Mesnil) 日本纖寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1536; Xue et al., 1996, 2:1720; Yunn., 1987:1209; Zhao et Zhou, 1992:1284)
Promedina japonica Mesnil, 1957:26.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、浙江、北京；朝鮮、日本、俄羅斯(遠東)。

Prosopea nigricans (Egger) 染黑前寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1933)
Frontina nigricans Egger, 1861:214.
Frontina instabilis Rondani, 1861:
寄 主：
分 佈：北京、新疆、遼寧、黑龍江；蒙古、西伯利亞、烏克蘭、哈薩克斯坦、外高加索、巴勒斯坦、意大利、捷克斯洛伐克、奧地利。

Prosopofrontina bicolor (Villeneuve) 異色裸背寄蠅 (Yunn., 1987:1208)
寄 主：
分 佈：雲南、四川；日本、緬甸。

Prosopofrontina grossa (Chao) 粗大裸背寄蠅 (Yunn., 1987:1208)
寄 主：
分 佈：雲南、浙江。

Prosopofrontina luteipes (Mesnil) 污黃裸背寄蠅 (Yunn., 1987:1208)
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸。

Pseudogonia rufifrons (Wiedemann) 黃額擬滕芒寄蠅 (Fan, 1992:748; He et al., 1991:67; Liu, Zhao et al., 1998:243; Xue et al., 1996, 2:1952)
Tachina rufifrons Wiedemann, 1830:318.
=*Latreillia lalandii* Robineau-Desvoidy, 1830:106.
=*Gonia javana* Macquart, 1848:203.
=*Gonia exigua* Doleschall, 1858:196.
=*Gonia cinerascens* Rondani, 1859:34.
=*Gonia minuta* Wulp, 1881:35.
=*Gaediogonia jacobsoni* Townsend, 1927:71.
=*Gonia munroi* Curran, 1927:339.

別 名：*灰等腿寄蠅，紅額擬膝芒寄蠅。*
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Spodoptera litula (Fabricius) 斜紋夜蛾
葉蟲。
國外：*Cirphis loreyi* Dup. 蔗夜蛾
Plecoptera reflexa Guenée
Spodoptera litula (Fabricius) 斜紋夜蛾
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、吉林；蒙古、日本、西伯利亞、外高加索、中亞、巴勒斯坦、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、所羅門群島、馬達加斯加、非洲、意大利、捷克、斯洛伐克、丹麥。

Pseudoperichaeta insidiosa 稻苞蟲賽寄蠅 (Yu, 1995, 17(3):138)
寄 主：*Parnara gutatta* 稻苞蟲。
分 佈：浙江。

Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker) 稻苞蟲賽寄蠅 (ASZI, 1987, 2:717; ASZI et al., 1978:206; Chao et Liang 1984:124; Chao et Shi, 1981(3):50; Fan, 1992:771; He et al., 1991:67; Hun., 1992:1176; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu, Zhao et al., 1998:181; Shi, 1981(4):33, 34, 35; Xue et al., 1996, 2:1864; Yu, 1983:45; Zhang, 1987[ed.] 2:71; Zhu, 1981(1-2):86)
=*Tachina nigrolineata* Stephens, 1829:299. (nom nudum.)
Tachina nigrolineata Walker, 1853:85.
=*Phorrocera nigripalpis* Rondani, 1861:161.
=*Phryxe insidiosa* Robineau-Desvoidy, 1863:336.
=*Phryxe consecuta* Robineau-Desvoidy, 1863:339.
=*Exorista stridens* Rondani, 1865:208.
=*Phorocera atripalpis* Rondani, 1868:161.
=*Myxexorista roseanae* Brauer et Bergenstamm, 1891:332.
=*Phorrocera pumicta* (Meiger) of Meade, 1894:159. misident.
=*Pseudoperichaeta major* (Brauer et Bergenstamm);Stein, 1924:89. misident.
=*Phorcera pumilio* Aldrich, 1933:22.
寄 主：*Chilo supressalis* (Walker) 二化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
Grapholitha molesta Busck 梨小食心蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Maruca testulalis Geyer 大豆捲葉螟(豇豆蛀螟)
Nephopteryx pirivorella Matsumura 梨大食心蟲
蘋果小捲蛾
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Phytometra gamma Linnaeus 銀紋夜蛾
Sesamia inferens (Walker) 大螟

Sylepta derogata Fabricius　棉大捲葉螟
大豆螟
桑螟
松巢螟
堆沙袋蛾
松捲螟
頂梢捲葉蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey)　稻苞蟲(蛹)。
國外：山楂捲蛾
Cacoecia murinana Hübner
Cacoecia pronubana Matsumura　石竺捲蛾
Cacoecia rosana Linnaeus　薔薇捲葉蛾
Cacoecia sp.
Etiella zinckenella Tr.　豆莢螟
Euryhypara urticata (Nielsen)
Glyphodes unionialis Hübner
Grapholitha molesta Busck　梨小食心蟲
Ostrinia nubilalis (Hübner)　玉米螟
Phalonia roseana Haw.
Sarrothripus undulata (Lundbeck)
Tholera polygonalis Hübner
Tortrix viridana Linnaeus　櫟綠捲蛾
稻苞蟲
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、遼寧；日本、西伯利亞南部、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英格蘭、瑞典。

Pseudoperichaeta palesoides (Robineau-Desvoidy) 帕萊賽寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1964)
Phryxe palesoides Robineau-Desvoidy, 1830:169.
寄 主：松線小捲蛾(寧夏)。
據記載：*Depressaria hercleana*　織蛾
Zygaena carniolica　斑蛾
Heterrogynis penella gezogene
Anoxycampta hirta
覆盆子捲蛾
分 佈：寧夏、吉林；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、以色列、歐洲北部到挪威、瑞典、芬蘭。

Pujolina leucania Chao et Jin 粘蟲璞寄蠅 (Chao et Jin, 1984:285; He et al., 1991:68; Xue et al., 1996, 2:1910; Yunn., 1987:1235)
Pujolina leucania Chao et Jin, 1984:285-287.
寄 主：*Mythimna separata* Walker　粘蟲。
分 佈：雲南(隴川)。

Ramonda delphinensis (Villeneuve) 德爾拉寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2139)

Wagneria delphinensis Villeneuve, 1922:515.

寄 主：

分 佈：北京；蒙古、歐洲(阿爾卑斯山脈)。

Ramonda prunaria (Rondani) 裸背拉寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:339; Xue et al., 1996, 2:2139)

Phorichaeta prunaria Rondani, 1861:100.
=*Tachina carbonaria* (Panzer) of Megien, 1824:420.
Ateria ntitda Robineau-Desvoidy, 1863:810.
Ramonda heterocera Robineau-Desvoidy, 1863:811.

寄 主：據記載：*Agrotis praecox* Linnaeus
Agrotod fimbira Linnaeus
Leuconia comma Linnaeus
Grammesia trigrammica Hufn.
Caradrina alsines Brehn.
Caradrina taraxaci Hb.
Orthosia circellaris Hufn.
Hylophila prasinana Linnaeus

分 佈：山西、青海、新疆、內蒙古；歐洲。

Ramonda spathulata (Fallén) 狹帶拉寄蠅 (Chao et Shi, 1982:238; Liu, Zhao et al., 1998:337; Xue et al., 1996, 2:2139; Zhao et Zhou, 1992:1337)

Tachina spathulata Fallén, 1820:7.
Tachina lentis Meigen, 1824:317.
Tachina suffusa Meigen, 1824:368.
Tachina seticeps Zetterstedt, 1844:1032.
Phorichaeta tricinta Rondani, 1861:7.
Petinops tiefii Strobl, 1901:226.
Wagneria fressa Villenuve, 1937:14.

寄 主：據記載：*Amathes helvola* Linnaeus
Agrotis collina Boisd.
Agrotis xanthographa Schiff.
Hadena rurea Fabricius
Leucania lithargyria Esp.

分 佈：雲南、西藏(察雅)、山西、青海、新疆；日本、西伯利亞、高加索、歐洲，古北區。

Redia atra Meigen 深黑雷迪寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:276; Chao et Zhou, 1988:522; Yunn., 1987:1249)

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(米林、芒康、左貢)、青海、河北、甘肅、內蒙古；印尼、亞洲北非、歐洲南部。

Rhinaplomyia nasuta (Villeneuve) 犀鼻寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1784; Yunn., 1987:1242; Zhao et Zhou, 1992:1301)

Carcelia nasuta Villeneuve, 1937:2.

寄 主：

分 佈：雲南、四川；緬甸。

Salmacia bimaculata Wiedemann 雙斑撒寄蠅 (ASZI et al., 1978:210; Shi, 1981(4):34)

寄 主：*Agrotis ipsilon* 小地老虎。

國外：

黃地老虎

美國白蛾

桑灰尺蠖

棉鈴蟲

幹杏尺蠖

分 佈：山東、河北、北京、青海、甘肅、新疆；亞洲東部、蘇聯、歐洲南部、非洲。

Salmacia sicula Robineau-Desvoidy 黑腹撒寄蠅 (ASZI et al., 1978:210; Shi, 1981(4):34)

寄 主：地老虎。

國外：

小眼夜蛾

Charaeas graminis Linnaeus

Leucnia comma Linnaeus

Podalirius retusus Kirby

分 佈：四川、江蘇、安徽、北京、遼寧；歐洲中部及北部(包括英國)。

Salmacia vacua Meigen 白霜撒寄蠅 (Shi, 1981(4):34)

寄 主：地老虎。

分 佈：

Scaphimyia castanea Mesnil 栗色舟寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1858)

Scaphimyia castanea Mesnil, *in* Lindner, 1955:422.

寄 主：

分 佈：廣西、浙江、北京；越南。

Scaphimyia nigrobasicasta Chao et Shi 黑鱗舟寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:272; Chao et Zhou, 1988:522)

Scaphimyia nigrobasicasta Chao et Shi, 1982:272.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)。

Scaphimyia takanoi Mesnil 蝙蝠蛾舟寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:173; Xue et al., 1996, 2:1858)

Scaphimyia takanoi Mesnil, 1967:43.

寄 主：*Phassus excrescens* Butler 日本蝙蝠蛾(瀋陽)。

分 佈：福建、雲南、山西、遼寧、吉林；日本。

Schineria tergestina Rondani 榆毒蛾嗜寄蠅 (ASZI, 1987, 2:718; ASZI et al., 1978:219; Chao et Liang, 1984:166; Chen, 1989:116; Fan, 1992:802; Liu, Zhao et al., 1998:266; Shi, 1995:538; Xue et al., 1996, 2:1989)

Schineria tergesina Rondani, 1859:46.

Schineria setinervis Zimin, 1974:467.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* Walker 馬尾松毛蟲
Stilpnotia ochropoda Eversmann 榆毒蛾。
分 佈：廣西、浙江、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；東亞、蘇聯。

Servillia amurensis Zimin 阿穆茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):55; He et al., 1991:68)
Servillia amurensis Zimin, 1929:218.
寄 主：*Mythimna separata* Walker 粘蟲。
分 佈：四川、內蒙古(滿洲里)。

Servillia anguisipennis Chao 蛇肛茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:8; Yunn., 1987:1262; Zhao et Zhou, 1992:1308)
Servillia anguisipennis Chao, 1987:8.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏、四川。

Servillia apicalis Chao 粗端鬃茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):58; Chao et Zhou, 1988:514; Yunn., 1987:1263; Zhao et Zhou, 1992:1313)
Servillia apicalis Chao, 1962(suppl.):58.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(墨脫)。

Servillia ardens Zimin 火紅茸毛寄蠅 (ASZI, 1987, 2:718; ASZI et al., 1978:222; Chao, 1962(Suppl.):57; Chao, 1964:884; Chao et Liang, 1984:162; Chao et Zhou, 1988:514; Chen, 1989:115; Fan, 1992:799; He et al., 1991:68; Hun., 1992:1194; Sun et al., 1992:634; Zhao et Zhou, 1992:1310)
Servillia ardens Zimin, 1929:219.
別 名：*火紅寄蠅*。
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲。
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北、陝西、山西、甘肅、遼寧；蘇聯(遠東)。

Servillia aurulenta Chao 金黃茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:9; Yunn., 1987:1264; Zhao et Zhou, 1992: 1308)
Servillia aurulenta Chao, 1987:9.
寄 主：
分 佈：雲南。

Servillia bombidifroma Chao 擬熊蜂茸毛寄蠅 (Chao, 1987:4; Yunn., 1987:1261; Zhao et Zhou, 1992: 1305)
Servillia bombidiforma Chao, 1987:4.
寄 主：
分 佈：雲南。

Servillia bombylia Villeneuve 擬蜂虻茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):49; Yunn., 1987:1261; Zhao et Zhou, 1992:1312)
Servillia bombylia Villeneuve, 1936:7.

寄 主：
分 佈：雲南、四川；尼泊爾。

Servillia breviala Chao 短翅茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:5; Zhao et Zhou, 1992:1307)
Servillia breviala Chao, 1987:5.
寄 主：
分 佈：四川、青海。

Servillia breviceps Zimin 寬頭茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):48; Chao et Zhang, 1982:257; Zhao et Zhou, 1992:1312)
Servillia breviceps Zimin, 1929:214.
寄 主：
分 佈：福建(建陽)、雲南、西藏(樟木)、四川、山西、北京、青海、黑龍江；日本、蘇聯(東部)。

Servillia chaoi Mesnil 趙氏茸毛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:258; Yunn., 1987:1264; Zhao et Zhou, 1992:1312)
Servillia chaoi Mesnil, 1966:
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(昌都)、四川、浙江、陜西、山西、北京、哈爾濱；日本、蘇聯(遠東)。

Servillia cheni Chao 陳氏茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:10; Zhao et Zhou, 1992:1310)
Servillia cheni Chao, 1987:10.
寄 主：
分 佈：雲南、北京。

Servillia elongata Zimin 長茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):62)
Servillia elongata Zimin, 1929:220.
寄 主：
分 佈：黑龍江(烏蘇里江沿岸)。

Servilla furcipennis Chao et Zhou 叉肛茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:5; Zhao et Zhou, 1992:1306)
Servillia furcipennis Chao et Zhou, 1987:5.
寄 主：
分 佈：雲南。

Servillia gibbiforceps Chao 膝且茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):52; Yunn., 1987:1263)
Servillia gibbiforceps Chao, 1962(suppl.):52
寄 主：
分 佈：福建、雲南、四川。

Servillia haemorrhoa Mesnil 棕茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):49; Yunn., 1987:1262)
Servilla haemorrhoa Mesnil, 1953:159.
寄 主：

分 佈：雲南(景東)。

Servillia jakovlevi Portsh. 捷柯茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):56)

Servillia jakovlevi Portsh., 1883:5.

寄 主：

分 佈：河北、內蒙古、吉林。

Servillia laterolinea Chao 側條茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):50; Chao et Zhang, 1982:257; Yunn., 1987: 1262; Zhao et Zhou, 1992:1313)

Servillia laterolinea Chao, 1962(suppl.):50.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(八宿然)、四川、河北(紅松坑)。

Servillia lateromaculata Chao 艷斑茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):59; Hun., 1992:1195; Shi, 1995:538; Sun et al., 1992:634; Yunn., 1987:1266; Zhang, 1987[ed.] 2:71; Zhao et Zhou, 1992:1313)

Servillia lateromaculata Chao, 1962(suppl.):59.

寄 主：

分 佈；福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、山西；越南、阿富汗。

Servillia linabdomenalis Chao 斑腹茸毛寄蠅 (Yunn., 1987:1264)

寄 主：

分 佈：雲南。

Servillia longiventris Chao 長腹茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):59)

Servillia longiventris Chao, 1962(Suppl.):59.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Servillia luteola Coquill. 廣茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):61)

Servillia luteola Coquill., 1898:330.

寄 主：

分 佈：四川、浙江、黑龍江(哈爾濱)。

Servillia medogensis Chao et Zhou 墨脫茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1988:515)

Servillia medogensis Chao et Zhou, 1988:515.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)。

Servillia nigrocastanea Chao 黑栗茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):48; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

Servillia nigrocastanea Chal, 1962(Suppl.):48.

寄 主：

分 佈：福建、江西、廣西、浙江(天目山)。

Servillia paniforceps Chao 扁肛茸毛寄蠅 (Shi, 1981(4):33)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：

Servillia planiforceps Chao 扁肛茸毛寄蠅 (ASZI et al., 1978:222; Chao, 1962:37, (Suppl.):53; Chao et Liang, 1984:161; Chao et Zhang, 1982:257; Chao et Zhou, 1988:514; Fan, 1992:798; He et al., 1991:68; Hun., 1992: 1195; Lu et Lan, 1983:247; Sun et al., 1992:635; Yunn., 1987:1263 Zhao et Zhou, 1992:1311)

Servillia planiforceps Chao, 1962(suppl.):53-59.

別 名：*扁肛寄蠅*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、波密、吉隆、聶拉木、樟木)、四川、江蘇、陝西、河北、北京、新疆、吉林。

Servillia pubiventris Chao 毛腹茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):54; Yunn., 1987:1263)

Servillia pubiventris Chao, 1962(suppl.):54.

寄 主：

分 佈：雲南。

Servillia pulvera Chao 鬃顏茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):61; Chao et Zhou, 1988:514; Zhao et Zhou, 1992: 1312)

Servillia pulvera Chao, 1962(Suppl.):61.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏(墨脫)、四川(南川金佛山)。

Servillia puncto-cincta Willeneuve 細稜茸毛寄蠅 (Hun., 1992:1195; Sun et al., 1992:635)

=*Servillia nigrocastanea* Chao

寄 主：

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江、湖北；蘇聯。

Servillia qingzangensis Chao 青藏茸毛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:257; Zhao et Zhou, 1992:1313)

Servillia qingzangensis Chao, 1982:257.

寄 主：

分 佈：西藏(八宿然)、四川、青海(玉樹)。

Servillia rohdendorfi Chao 洛燈茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):51; Chao et Zhang, 1982:257)

Servillia rohdendorfi Chao, 1962(Suppl.):51.

寄 主：

分 佈：福建、雲南、西藏(樟木)。

Servillia ruficauda Chao 紅尾茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:11; Yunn., 1987:1266; Zhao et Zhou, 1992: 1310)

Servillia ruficauda Chao, 1987:11.

寄 主：

分 佈：雲南、四川。

Servillia ruhdendorifi Chao 洛燈茸毛寄蠅 (Yunn., 1987:1262)

寄 主：
分 佈：雲南、西藏、福建；亞洲中部、蘇聯。

Servillia sinerea Chao 缺端鬃茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):60; Hun., 1992:1196; Sun et al., 1992:635; Yunn., 1987:1266; Zhao et Zhou, 1992:1312)
Servillia sinerea Chao, 1962(Suppl.):60
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏、四川、湖北。

Servillia spina Chao 刺腹茸毛寄蠅 (Chao et Zhou, 1987:7; Yunn., 1987:1262; Zhao et Zhou, 1992:1307)
Servillia spina Chao, 1987:7.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、青海。

Servillia stackelbergi stackelbergi Zimin 什塔茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):57; Hun., 1992:1196; Sun et al., 1992:635; Yunn., 1987:1264)
Servillia stackelbergi Zimin, 1929:216-218.
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、湖北、河北、吉林；日本、蘇聯(東部)。

Servillia stackelbergirufa Chao 淡紅茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):57; Zhang, 1987[ed.] 2:71)
Servillia stackelbergi rufa Chao, 1962(Suppl.):57.
寄 主：
分 佈：江西、廣西、雲南、四川、浙江。

Servillia ursinoidea Tothill 蜂茸毛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:258; Chao et Zhou, 1988:514; Hun., 1992:1196; Sun et al., 1992:635; Yunn., 1987:1264; Zhao et Zhou, 1992:1313)
Servillia ursinoidea Tothill, 1918:
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏(察雅、察隅、樟木)、四川、浙江、湖北、華北；泰國、緬甸、印度、尼泊爾、印尼。

Servillia xizangensis Chao 西藏茸毛寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:257; Chao et Zhou, 1988:515; Zhao et Zhou, 1992:131?
Servillia xizangensis Chao, 1982:257.
寄 主：
分 佈：西藏(米林)。

Servillia zimini Chao 濟氏茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):55; Sun et al., 1992:635)
Servillia zimini Chao, 1962(Suppl.):55.
寄 主：
分 佈：貴州、雲南、浙江、遼寧。

Setalunula blepharipoides Chao et Yang 擬飾腹鬃月寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1873)

Setalunula blepharipoides Chao et Yang, *in* Xue et al., 1996, 2:1873.
寄 主：
分 佈：江西、廣西、雲南。

Simoma grahami Aldrich 黑鱗西寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1914; Yunn., 1987:1239)
Simoma grahami Aldrich, 1926:21.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、雲南、四川、上海、遼寧；日本、越南、馬來西亞、印度、以色列。

Siphona boreata Mesnil 北方長喙寄蠅 (ASZI, 1987, 2:719; Chao et Zhang, 1982:264; Fan, 1992:720; He et al., 1991:68; Lu et Lan, 1983:247; Xue et al., 1996, 2:2056)
Siphona boreata Mesnil, 1960:190.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：廣東、貴州、西藏(樟木)；庫頁島、歐洲(中部、北部)、英國。

Siphona confusa Mesnil 閃斑長喙寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:266; Chao et Zhou, 1988:520; Xue et al., 1996, 2:2056; Yunn., 1987: 1195; Zhao et Zhou, 1992:1289; 1996:264)
Siphona confusa Mesnil, 1961:201.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(雲南)。
國外：*Mythimna littoralis* Curt.
分 佈：福建、雲南、西藏(米林、聶拉木)、四川、青海、甘肅、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、列寧格勒、巴勒斯坦、加那利群島(西班牙)、歐洲向北達英格蘭南部、瑞典南部和聖彼得堡。

Siphona cristata (Fabricius) 冠毛長喙寄蠅 (ASZI, 1987, 2:719; ASZI et al., 1978:211; Chao, 1962:37; Chao et Shi, 1981(3):51; Chao et Zhang, 1982: 266; Fan, 1992:721; He et al., 1991:68; Shi, 1981(4):33; Shi, 1995:538; Xue et al., 1996, 2:2056)
Stomoxys cristata Fabricius,1805:281.
Siphona palpina Zetterstedt, 1859:
Siphona chetoliga Rondani, 1865:
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Euxoa tritici Linnaeus 小麥夜蛾
Mamestra brasicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾
瑪瑙夜蛾
藍目天蛾
Erannis (*Hibernia*) *defeliaria* Cl. 暗點赭尺蠖
大蚊。
國外：*Euxoa tritici* Linnaeus 小麥夜蛾
Charaea grminis
Mamestra brasicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾
豌豆夜蛾
瑪瑙夜蛾
藍目天蛾
Erannis (*Hibernia*) *defeliaria* Cl. 暗點赭尺蠖

Caradrina morpheus
Chareas graminis
Collix sparsata
Eupithecis succenturiata
Leucania obsoleta
Leucania littoralis
Leucanis lythargyria
Mamestra pisi
Mamestra oleracea
Polia chi
Tipula irrotata 大蚊

分 佈：臺灣、福建、廣西、貴州、雲南、西藏(貢覺)、四川、浙江、陝西、河北、天津、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、歐洲(包括英國)。

Siphona delicatula Mesnil 呆長喙寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:264)

寄 主：

分 佈：西藏(江達、察雅、昌都)；歐洲。

Siphona geniculata (De Geer) 大蚊長唇寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2056)

Musca geniculata De Geer, 1776:38.

寄 主：大蚊的有效天敵、幼蛆在大蚊幼蟲體內越冬。

分 佈：臺灣、青海、黑龍江；蒙古、西伯利亞、外高加索、歐洲忠部達愛爾和拉普蘭。

Siphona paludosa Mesnil 濕地長喙寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2057; Yunn., 1987:1194; Zhao et Zhou, 1992:1288)

Siphona paludosa Mesnil, 1960:188.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、新疆；蒙古、千島、庫頁島、西伯利亞、聖彼得堡、歐洲比利時、德國、瑞典、芬蘭。

Siphona pauciseta Rondani 袍長唇寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2057)

Siphona pauciseta Rondani, 1865:193.

寄 主：

分 佈：廣東、西藏；蒙古、西伯利亞、歐洲北部。

Sisyropa aberrans Rondani 單刺脛皮寄蠅 (Yunn., 1987:1233)

寄 主：茶斑蛾。

分 佈：雲南、北京、遼寧。

Sisyropa formosa Mesnil 臺灣皮寄蠅 (Hun., 1992:1175; Sun et al., 1992:626; Xue et al., 1996, 2:1865)

Sisyropa formosa Mesnil, 1944:14.

寄 主：*Acontia* sp. 麗夜蛾

Anomis flava (Fabricius) 小造橋蟲
Anomis sabulifera Guenée 黃麻橋夜蛾
Spodoptera littoralis (Boisduva) 海灰翅夜蛾。
分 佈：臺灣、江西、湖南、貴州、上海；印度、斯里蘭卡。

Sisyropa prominens (Walker) 雙刺皮寄蠅 (Fan, 1992;767; Hun., 1992:1176; Xue et al., 1996, 2:1865)
Eurygaster prominens Walker, 1859:127.
Zenillia taylori Curran, 1938:
Sisyropa soror Mesnil, 1944:
寄 主：*Cocytredes caerulea* Guenée 苧麻夜蛾
Hypena iconicalis 長喙夜蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、河南；馬來西亞、印度、印尼、巴布亞新幾內亞、新不列顛、所羅門群島、澳洲、英國。

Sisyropa soror Mesnil 隻刺皮寄蠅 (ASZI, 1987, 2:720; Chao et Liang, 1984:116)
寄 主：*Cocytredes caerulae* Guenée 苧麻夜蛾。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、浙江、河南；巴布亞新幾內亞。

Smidtia conspersa (Meigen) 長鬃錐腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1766)
Tachina conspersa Meigen, 1824:263.
寄 主：葉蜂
據記載：*Taeniocampa cruda*
Taeniocampa pulverulenta
Taeniocampa stabilis
分 佈：黑龍江；歐洲。

Solieria pacifica (Meigen) 太平洋索寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2088)
Tachina pacifica Meigen, 1824:342.
寄 主：據記載：蘋果異形小捲蛾
蕁麻蛺蝶
分 佈：山東、北京；外高加索、聖彼得堡、英國、德國。

Spallanzania hebes (Fallén) 梳飛躍寄蠅 (ASZI, 1987, 2:720; ASZI et al., 1978:210; Chao et Liang, 1984:90; Chao et Zhang, 1982:276; Fan, 1992:749; Liu, Zhao et al., 1998:245; Shi, 1981(4):34; Xue et al., 1996, 2:1950; Zhao et Zhou, 1992:1292; 1996:254)
Tachina hebes Fallén, 1820:11.
Tachina bucephala Meigen, 1824:252.
Spallanzania gallica Robineau-Desvoidy, 1830:79.
Gonia nudifacies Macquart, 1834:315.
Cnephalia bisetosa Brauer et Bergenstamm, 1891:353.353.
Cnephaliedes perversus Brauer et Bergenstamm, 1891:
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Agrotis segetum Schiffermüller 黃地老虎
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。

國外：*Agrotis segetum* Schiffermüller　黃地老虎
Agritus exclamationis Linnaeus　警紋鳴夜蛾
Heliothis dipsacea Linnaeus　苜蓿夜蛾(亞麻夜蛾)
Phragmatobia fuliginosa Linnaeus　亞麻燈蛾
分 佈：湖南、廣東、海南、西藏(江達、察雅)、浙江、江蘇、上海、山西、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；亞洲東部、印度、日本、俄羅斯遠東、西伯利亞、烏克蘭、中亞、聖彼得堡、外高加索、歐洲南部、奧地利、北非。

Spallanzania multisetosa (Rondani) 多鬃飛躍寄蠅 (Xue et al., 11996, 2:1950)
Cnephalia multisetosa Rondani, 1859:43.
Cnephalia albisquama Rondani, 1850:
Cnepphalis montana Rondani,1859:
Cnephalia fuscisquama Rondani, 1859:
寄 主：
分 佈：遼寧；西班牙、意大利、法國、瑞士。

Spallanzania rectistylum MacGuart 阿飛躍寄蠅 (He et al., 1991:68)
=*Spallanzania alpestris* Rondani
寄 主：*Naranga aenescens* Moore　稻螟蛉。
分 佈：江西。

Spallanzania sparipruinatus Chao et Shi 亮黑飛躍寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:276; Xue et al., 1996, 2:1950)
Spallanzania sparipruinatus Choa et Shi, 1981:276.
寄 主：
分 佈：西藏(江達、察雅)。

Sphona cristata Fabricius 冠毛長喙寄蠅 (Chao et Liang, 1984:50)
寄 主：*Mythimna separata* Walker　粘蟲
大蚊。
國外：小麥夜蛾
Barathra (*Mamestra*) *brassicae* Linnaeus 甘藍夜蛾
瑪瑙夜蛾
藍目天蛾
Caradrina morpheus
Charaeas graminis
Collix sparsat
Erannis (*Hibernia*) *defeliaria* Cl.　暗點赭尺蛾)
Eupithecia succenturiata
Euxoa tritici Linnaeus
Leucania obsoleta
Leucania littoralis
Leucania lythargyria
Mamestra pisi

Mamestra oleracea
Polia chi
Tipula irrorata
分佈：臺灣、福建、西藏、四川、貴州、河北(北京、天津)、新疆、吉林。

Spiniabdomina flava Shi 黃櫛腹寄蠅 (Shi, 1991:129)
Spiniabdomina flava Shi, 1991:129.
寄 主：
分 佈：內蒙古(額濟納)。

Spoggosia echinura Robineau-Descoidy 多刺孔寄蠅 (ASZI et al., 1978:215)
寄 主：草原毛蟲。
國外：櫟枯葉蛾
大天蠶蛾
Eurranthis pennigeraria chrysitaria Hg.
Lasiocampa trifolii Esp.
Ocneria baetica Rb.
Trachea atriplicis Linnaeus
分 佈：青海；日本、歐洲(英國除外)、北非。

Spoggosia hirsuta Mesnil 粗毛孔寄蠅 (Shi, 1981(4):37)
寄 主：*Bhima idiota* Graeser 白楊枯葉蛾。
分 佈：

Steiniomyia elata Meigen 矮飾苔寄蠅 (ASZI et al., 1978:220)
寄 主：棕尾毒蛾。
國外：桑毒蛾
分 佈：浙江、上海、北京、黑龍江；德國北部。

Steleoneura minuta Yang et Chao 小柄脈寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1719)
Steleoneura minuta Yang et Chao, 1990:310-313.
寄 主：
分 佈：廣西。

Stomina tachinoides (Fallén) 并眼拱嘴寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:354)
Musca tachinoides Fallén, 1816:244.
Stinubaa rubricornis Robineau-Desvoidy, 1830:411.
Tachina circumflexa Zetterstedt, 1844::1174.
Dexia ppellucens Egger, 1860:799.
Arisbaea lateralis Robineau-Desvoidy, 1863: 291.
寄 主：
分 佈：山西；蒙古、巴勒斯坦。

Sturmia bella (Meigen) 麗叢毛寄蠅 (Hun., 1992:1193; Sun et al., 1992:633; Xue et al., 11996, 2:1896; Yunn., 1987:1231; Zhao et Zhou, 1992:1291)

Tachina bella Meigen, 1824:371.

寄 主：國外：*Acronicta auricoma*

Acronica rumicis 梨劍紋夜蛾

Arashnia levana

Doritis apollinus

Carcharodus alceae

Gastropacha quercifolia

Miselia oxyacanthae

Pyraumeis atalanta

Pyraumeis cardui

Stilpnotia salicis

Vanessa antiopa

Vanessa L-album

Vanessa polychlor

Vanessa urticae

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；日本、尼泊爾、西伯利亞、中亞、外高加索、聖彼得堡、巴勒斯坦、比利時、德國。

Sturmiopsis inferens Townsend 大螟擬叢毛寄蠅 (ASZI, 1987, 2:721; Chao et Liang, 1984:123; Chen et Hung, 1964:165-167; Fan, 1992:771; He et al., 1991:68; Xue et al., 1996, 2:1864; Yunn., 1987:1238)

Sturmiopsis inferens Townsend, 1916:313.

寄 主：*Chilo infuscatellus* (Snellen) 甘蔗二點螟

Chilo supressalis (Walker) 二化螟

Sesamia inferens Walker 大螟。

國外：*Chilo supressalis* (Walker) 二化螟

Sesamia inferens (Walker) 大螟

分 佈：臺灣(1963 由印度引進)、雲南；印尼、馬來西亞、印度、孟加拉、尼泊爾。

Tachina albidopilosa (Portschinsky) 白毛寄蠅 (ASZI, 1987, 2:721; Fan, 1992:799; Xue et al., 1996, 2:1965; Zhao et Liang, l984:164; Zhao et Zhou, 1996:258)

Echinomyia albidopilosa Portschinsky, 1882:8.

寄 主：桑夜蛾(白刺毛蟲)。

分 佈：寧夏、新疆、內蒙古；蒙古、中亞、烏茲別斯坦、土庫曼斯坦。

Tachina alticola (Malloch) 深色寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1965)

Servillia alticola Molloch, 1932:201.

寄 主：

分 佈：雲南；馬來西亞。

Tachina amurensis (Zimin) 阿穆爾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1965)

Servillia amurensis Zimin, 19229:218.

寄 主：粘蟲。

分 佈：四川、內蒙古；日本、俄羅斯遠東地區。

Tachina anguisipennis (Chao) 蛇虻寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1965)

Servillia anguisipennis Chao, 1987:8-9.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Tachina ardens (Zimin) 火紅寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1546; Liu, Zhao et al., 1998:261; Xue et al., 1996, 2:1965)

Servillia ardens Zimin, 1929:219.

寄 主：*Dendrolimus sibiricus* Tschetwerikow 西伯利亞松毛蟲

分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山西、甘肅、遼寧；俄羅斯(遠東地區)。

Tachina aurulenta (Chao) 金黃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia aurulenta Chao, 1978:9.

寄 主：

分 佈：雲南。

Tachina bombidiforma (Chao) 擬熊蜂寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia bombidiforma Chao, 1978:4.

寄 主：

分 佈：雲南。

Tachina bombylia (Villeneuve) 擬蜂虻寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia bombylia Villeneuve, 1936:7.

寄 主：

分 佈：雲南、四川。

Tachina breviala (Chao) 短翅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia breviala Chao, 1987:5-6.

寄 主：

分 佈：四川、青海。

Tachina breviceps (Zimin) 短頭寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:256; Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia breviceps Zimin, 1929:214.

Servillia pallidohirta Zimin, 1929:215.

寄 主：

分 佈：福建、雲南、四川、山西、北京、內蒙古、黑龍江；日本、蒙古、俄羅斯遠東地區。

Tachina chaoi Mesnil 趙氏寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:264; Xue et al., 1996, 2:1971)

Tachina chaoi Mesnil, *in* Lindner, 1966:910.

Servillia lluteeola Coquillett, 1935:576.

寄 主：

分 佈：四川、浙江、山西、黑龍江；蒙古、日本、俄羅斯(遠東地區)。

Tachina cheni (Chao) 陳氏寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:258; Xue et al., 1996, 2:1971)

Servillia cheni Chao, 1987:10-11.

寄 主：

分 佈：雲南、山西、北京。

Tachina corsicana (Villeneuve) 亮腹寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:255; Xue et al., 1996, 2:1971; Zhang, 1998, 14(2):47; Zhao et Zhou, 1992:1305; 1996:258)

Echinomyia corsicana Villeneuve, 1931:48.

寄 主：

分 佈：西藏(類烏齊、察雅、八宿然)、四川；外高加索、土耳其、法國、南歐、突尼斯。

Tachina excisa Fall 松毛蟲原寄蠅 (Yie et Hsu, 1967:9)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。

分 佈：臺灣。

Tachina fera (Linnaeus) 黃跗寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:250; Xue et al., 1996, 2:1971; Zhao et Zhou, 1996:258)

Musca fera Linnaeus, 1761:453.
Musca reccumbo Haarris, 1776:35.
Tachina virgo Meigen, 1824:243.
Echinomyia intermedia Robineau-Desvoidy, 1830:47.
Echinomyia fulviceps Meigen, 1838:183.
Echinomyia ruficornis Meigen, 1838:183.
Echinomyia algira Macquart, *in* Lucas, 1849:475.
Echinomyia tetramera Zetterstedt, 1849:3216.
Echinomyia autumnalis Giglio-Tos, 1890:460.
Echinomyia ligustica Giglio-Tos, 1891:1.
Echinomyia cenisia Giglio-Tos, 1891:2.
Echinomyia meeigeni Giglio-Tos, 1891:7.
Echinomyia macquarti Giglio-Tos, 1891:9.
Tachina imitatrix Zimin, 1967:468.
Tachina ppamirica Zimin, 1967:474.

寄 主：據記載：*Acronycta aceris* Linnaeus 銳劍紋夜蛾
Amathes (*Agrotis*) *g;arepsa* Esper
Arctia aulica Linnaeus
Brotolomia (*Phlogophra*) *meticulosa* Linnaeus 瑪瑙夜蛾
Cloantha (*Calocampa*) *solidainis* Hübner
Cucullia xeraanthemi Boisd.
Dasychira pudibunda Linnaeus 茸毒蛾
Dichonia (*Xylocampa*) *areola* Esper
Euproctis phaeorrhaea Don.
Heliothis peltigera (Schiffermüller) 大棉鈴蟲
Leucania obsoleta Hübner
Litosia quadra Linnaeus 松苔蛾

Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Lymantria monacha Linnaeus 僧尼舞毒蛾
Mamestra pisi Linnaeus
Panolis flammea Schiffermüller 小眼松夜蛾
Panolis griseovariegata Goeze 松夜蛾
Polyphaenis sericata Esper
分 佈：山西、河北、新疆；蒙古、日本、西伯利亞、中亞、外高加索、巴勒斯坦、愛爾蘭、英格蘭、瑞典。

Tachina flavosquama Chao 黃粉寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:256; Liu, Zhao et al., 1998:255; Xue et al., 1996, 2:1971)
Tachina flavosquama Chao, 1982:256.
寄 主：
分 佈：西藏、山西。

Tachina furcipennis (Chao et Zhou) 杈肛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)
Servillia furcipennis Chao et Zhou, 1987:5.
寄 主：
分 佈：雲南。

Tachina gibbiforceps (Chao) 膝肛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)
Servillia gibbiforceps Chao, 1962:52.
寄 主：
分 佈：福建、雲南、四川。

Tachina grossa (Linnaeus) 大黑寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)
Musca grossa Linnaeus, 1758:592.
寄 主：據記載：歐洲松毛蟲
Haemorrhagia fusiformis
Euproctis phaeorrhaea
松天蛾
櫟枯葉蛾
Lasiocampa trofolii
樹莓枯葉蛾
分 佈：新疆、內蒙古、黑龍江；俄羅斯遠東地區直到英國、歐洲南部和北部。

Tachina haemorrhoa Mesnil 棕紅寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)
Tachina haemorrhoa Mesnil, 1953:159.
寄 主：
分 佈：雲南；緬甸。

Tachina iota Chao et Arnaud 小寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981)
Tachina iota Chao et Arnaud, 1933:48-49.
Servillia minuta Chao, 1962:
寄 主：

分 佈：內蒙古；日本、蒙古。

Tachina jakovlevi (Portschinsky) 毛肋寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:262; Xue et al., 1996, 2:1976)

Echinomyia jakovlevi Portschinsky, 1882:7.

寄 主：

分 佈：山西、河北、北京、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、日本、俄羅斯(遠東地區)。

Tachina kunmingensis Chao et Arnaud 扁肛寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)

Tachina kunmingensis Chao et Arnaud, 1993:49.

Servillia planiforceps Chao, 1962:

寄 主：粘蟲。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、新疆。

Tachina laterolinea (Chao) 側條寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:257; Xue et al., 1996, 2:1976)

Servillia laterrolinea Chao, 11962:50.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川、山西、河北、北京。

Tachina lateromaculata (Chao) 艷斑寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:263; Xue et al., 1996, 2:1976)

Servillia lateromaculata Chao, 1962:59.

寄 主：

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、山西；越南、阿富汗。

Tachina longiventris (Chao) 筒腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)

Servillia longiventris Chao, 1962:59.

寄 主：

分 佈：四川；泰國。

Tachina luteola (Coquillett) 黃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1976)

Servillia luteola Coquillett, 1898:329.

寄 主：

分 佈：烏蘇里江沿岸；日本、俄羅斯遠東地區。

Tachina macropuchia Chao 巨爪寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:255; Chao et Zhou, 1988:516; Liu, Zhao et al., 1998:252; Xue et al., 1996, 2:1980; Zhao et Zhou, 1992:1305)

Tachina macropuchia Chao, 1982:255.

寄 主：

分 佈：西藏(察雅)、山西、河北、內蒙古(西烏旗)、吉林、黑龍江；朝鮮。

Tachina magnicornis (Zetterstedt) 黑尾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1980)

Echinomyia magnicornis Zetterstedt, 1844:996.

寄 主：黃地老虎

牧草夜蛾

Cucullia vebasci 冬夜蛾
Eumichtis adusta 蛾
Euproctis phaeorrhaea 黃毒蛾
小麥夜蛾
Euxoa tritici 黑麥切夜蛾
甜菜夜蛾
舞毒蛾
Mythimna caecimacula 光腹夜蛾
松夜蛾。
分 佈：北京、新疆、黑龍江；帕米爾高原和高加索、土耳其至非洲北部、古北區(包括英國)。

Tachina medogensis (Chao et Zhou) 墨脫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1980)
Servillia medogensis Chao et Zhou, 1988:515.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

Tachina metatarsa Chao et Zhou 黑跗寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1980)
Tachina metatarsa Chao et Zhou, *in* Xue et al., 1996:1980-1981.
寄 主：
分 佈：新疆、黑龍江(伊春)。

Tachina micado Kirby 彌寄蠅 (ASZI, 2:722; Chao et Liang, 1984:164; Chao et Zhang, 1982:25; Yu, 1983:46; Yunn., 1987:1261)
寄 主：*Parastichtis basilinea* Fabricius 麥穗夜蛾(甘肅南部)。
分 佈：雲南、西藏(拉薩、聶拉木、澤當、察雅)、浙江、陝西、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞。

Tachina nupta (Rondani) 怒寄蠅 (ASZI, 1987, 2:722; Chao et Liang, 1984:163; Chao et Zhou, 1997:1544; Chen, 1989:116; Fan, 1992:799; He et al., 1991:68; Liu, Zhao et al., 1998:253; Sun et al., 1992:634; Xue et al., 1996, 2:1981; Yunn., 1987:1261; Zhao et Zhou, 1992:1305)
Echinomyia nupta Rondani, 1859:55.
Echinomyia micado Kirby, 1884:459.
Tachina orientalis Zimin, 1935:559.
Echinomyia trigonata Villeneuve, 1936:3.
Tachina nigriventris Zimin, 1967:473.
Tachina turanica Zimin, 1980:213.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* Walker 馬尾松毛蟲
西伯利亞松毛蟲
油松毛蟲
Parastichtis basilinea Fabricius 麥穗夜蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：廣西、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西、山西、河北、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、西伯利亞、烏茲別克斯坦、外高加索、意大利、法國、德國、瑞典。

Tachina persica (Porishinsky) 波斯寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981; Zhao et Zhou, 1996:258)

Echinomyia persica Porishinsky, 1873:293.

寄 主：

分 佈：新疆；蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。

Tachina pingbian Chao et Arnaud 屏邊寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981)

Tachina pingbian Chao et Arnaud, 1993:49.

Servillia apicalis Chao, 1962:

寄 主：

分 佈：雲南。

Tachina praeceps Meigen 峭寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981)

Tachina praeceps Meigen, 1824:241.

寄 主：據記載：苜蓿夜蛾
鼠尾草夜蛾
Diacrisia purpurata
Euproctis pphaeorrhaea
Haemorrhagia fuciformis
Malacosoma franconica
天幕毛蟲
褐斑燈蛾
艾夜蛾

分 佈：新疆；蘇聯、伊朗、歐洲南部、北非。

Tachina pubiventris (Chao) 毛腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981)

Servillia pubiventris Chao, 1962:54.

寄 主：

分 佈：雲南。

Tachina punctocincta (Villeneuve) 細棱寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1546; Xue et al., 1996, 2:1981)

Echinomyia punctocincta Villeneuve, 1936:4.

Servillia nigrocastanea Chao, 1962:

別 名：*栗黑寄蠅*。

寄 主：

分 佈：福建、江西、湖南、海南、廣西、四川、浙江、湖北；蘇聯。

Tachina pulvera (Chao) 鬃顏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1981)

Servillia pulvera Chao, 1962:61.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Tachina qingzangensis (Chao) 青藏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987)
Servillia qingzangensis Chao, 1982:275.
寄 主：
分 佈：西藏、青海。

Tachina rohdendorfi Zimin 中亞寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987)
Tachina rohdendorfi Zimin, 1935:556.
寄 主：
分 佈：新疆；中亞、蘇聯南部(布哈拉、費爾干納)。

Tachina rohdendorfiana Chao et Arnaud 洛燈寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987; Zhao et Zhou, 1996:258)
Servillia rohdendorfi Chao, 1962:51-52.
Tachina rohdendorfiana Chao et Arnaud, 1993:49-50.
寄 主：
分 佈：福建、雲南、新疆。

Tachina ruficauda (Chao) 紅尾寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987)
Servillia ruficauda Chao, 1987:11-12.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Tachina sinerea (Chao) 缺端鬃寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:263; Xue et al., 1996, 2:1987)
Servillia sinerea Chao, 1962:60.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、山西。

Tachina spina (Chao) 刺腹寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987)
Servillia spina Chao, 1987:7-8.
寄 主：
分 佈：雲南、四川、青海。

Tachina stackelbergi (Zimin) 什塔寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1545; Liu, Zhao et al., 1998:259; Xue et al., 1996, 2:1987)
Servillia stackelbergi Zimin, 1935:216.
寄 主：*Dendrolimus sibiricus* Tschetweerikow 西伯利亞松毛蟲
Dendrolimus spectbilis Butler 赤松毛蟲
Dendrolmus tabulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲。
分 佈：福建、湖南、西藏、四川、浙江、湖北、山西、河北、北京、甘肅、青海、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯(遠東)、日本。

Tachina tienmushan Chao et Arnaud 黃脛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):52; Xue et al., 1996, 2:1987)
Tachina tienmushan Chao et Arnaud, 1993:50.
Servillia flavipes Chao, 1962:
寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Tachina trigonata Villeneuve 黑斑寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:256)

寄 主：

分 佈：西藏(察雅、江達)。

Tachina ursina Meigen 黃白茸毛寄蠅 (Chao, 1962(Suppl.):51; Liu, Zhao et al., 1998:257; Xue et al., 1996, 2:1987; Yunn.1987:1262; Zhao et Zhou, 1992: 1311)

Tachina ursina Meigen, 1824:245.

Tachina echinata Meigen, 1824:245.

Servillia pilosa Robineau-Desvoidy, 1830:50.

Servillia strenua R.-D.

Servillia subpilosa R.-D.

Echinomyia pedemontana Macquart, 1845:266.

Servillia argyrostoma Schrank, 1871:

Servillia nigrohirta Stein, 1924:42.

Servillia stroouhali Czerny, 1939:68.

別 名：*黃白寄蠅*。

寄 主：*Nach* (*Herting*) *unbekannt.*

分 佈：雲南、四川、浙江、山西、北京、甘肅、遼寧；西伯利亞、聖彼得堡、烏拉爾、意大利、法國、英格蘭、德國、奧地利、丹麥。

Tachina ursinoides (Tothill) 蜂寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1547; Xue et al., 1996, 2:1987)

Servillia ursinoides Tothill, 1918:50.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、河北、吉林；俄羅斯(遠東)、日本、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、印尼。

Tachina xizangensis (Chao) 西藏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1987)

Servillia xizangensis Chao, 1982, 2:257-258.

寄 主：

分 佈：西藏。

Tachina zimini (Chao) 濟氏寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1989)

Servillia zimini Chao, 1962:55.

寄 主：

分 佈：雲南、浙江、遼寧。

Tachina sp. 菜粉蝶寄蠅 (Zhou et Zou, 1993:166-169)

寄 主：*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜粉蝶。

分 佈：湖北。

Takanomyia scutellata Mesnil 小盾塔卡寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1914; Yunn., 1987:1239; Zhao et Zhou, 1992:1290)

Takanomyia scutellata Mesnil, 1957:10.

寄 主：

分 佈：雲南；印度、尼泊爾、日本。

Thecocarcelia acutangulata Macquart 尖舌鞘寄蠅 (He et al., 1991:68)

=*Thecocarcelis incedens* (Rondani)
=*Thecocarcelia hainanensis* Chao, 1976:
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣西。

Thecocarcelia apta Walker 黃斑鞘寄蠅 (ASZI, 2:722; Chao et Shi, 1981(3):50; Shi, 1981(4):33; Yu, 1983:45; Yu, 1995, 17(3):139)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：福建、湖南、浙江、安徽；馬來西亞、印度。

Thecocarcelia aureipollinosa Chao et Zhou 黃粉鞘寄蠅 (Hun., 1992:1189; Xue et al., 1996, 2:1821)

Thecocarcelia aureipollinosa Chao et Zhou, 1992:1189.
Thecocarcelia tianpingensis Sun et Chao, 1992:
寄 主：
分 佈：湖南、貴州。

Thecocarcelia hainanensis Chao 海南鞘寄蠅 (ASZI, 1987, 2:723; Liang et Chao, 1990:363; Xue et al., 1996, 2:1821)

Thecocarcelia hainanensis Chao, 1976:337-338.
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣東、海南、廣西。

Thecocarcelia hirtmacula Liang et Chao 毛斑鞘寄蠅 (Liang et Chao, 1990:363; Xue et al., 1996, 2:1821)

Thecocarcelia hirtmacula Liang et Chao, 1990:363-367.
寄 主：
分 佈：海南。

Thecocarcelia interfrons Sun et Chao 窄額鞘寄蠅 (Hun., 1992:1189; Sun et al., 1992:633; Xue et al., 1996, 2:1821)

Thecocarcelis interfrons Sun et Chao, 1992；1189.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州。

Thecocarcelia melanohalterata Chao et Jin 黑棒鞘寄蠅 (Chao et Jin, 1984:284)

Thecocarcelia melanohalterata Chao et Jin, 1984:284-285.
寄 主：*Sylepta luctuosalis* Guenée 葡萄捲葉野螟。
分 佈：北京。

Thecocarcelia nigrotibialis (Baranov) 黑脛鞘寄蠅 (Chao et Shi, 1981(3):50; He et al., 1991:69; Shi, 1981(4):33; Sun et al., 1980(4):22; Xue et al., 1996, 2:1821; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、內蒙古；馬來西亞。

Thecocarcelia oculata Baranoff 稻苞蟲鞘寄蠅 (ASZI, 1987, 2:724; ASZI et al., 1978:202; Chao et Liang, 1984:91; He et al., 1991:69; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Shi, 1981(4):33; Sun et al., 1980(4):22; Xie, 1993, 9(1):21; Yu, 1983:45; Zhang, 1987[ed 2:71)

寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Parnara ganga Evans 曲紋稻苞蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Susumia exigua 稻顯紋縱捲水螟。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、吉林、黑龍江；馬來西亞、印尼、印度、尼泊爾。

重寄生蜂：*Brachymeria lasus* Walker 廣闊小蜂。

Thecocarcelia parnarae Chao 稻苞蟲鞘寄蠅 (Chao et Shi, 1981(3):50; Fan, 1992:750; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Liang et Chao, 1990:363; Xue et al., 1996, 2:1827; Yu, 1995, 17(3):138; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

Thecocarcelia parnarae Chao, 1976:335.

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲
稻縱捲葉螟。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼。

Thecocarcelia phoeda (Townsend) 黃脛鞘寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1821)

Argyrophylax phoeda Townsend, 1927:63.

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：福建、湖南、浙江、安徽；馬來西亞、印度。

Thecocarcelia setula Liang et Chao 多徑鬃鞘寄蠅 (Liang et Chao, 1990:367; Xue et al., 1996, 2:1827)

Thecocarcelia setula Liang et Chao, 1990:367-368.

寄 主：

分 佈：海南。

Thecocarcelia thirx Townsend 黃角鞘寄蠅 (ASZI, 1987, 2:723; Chao et Liang, 1984:91; Chou et al., 1994:328; Fan, 1992:750; Hun., 1992:1189; He et al., 1991:69; Liang et Chao, 1990:363; Xue et al., 1996, 2:1821; Yunn., 1987:1221; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

=*Thecocarcelis laticornis* Chao, 1976:

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、湖北、陝西；朝鮮、日本。

Thecocarcelia tianpingensis Sun et Chao 天平鞘寄蠅 (Hun., 1992:1190; Sun et al., 1992:633)

Thecocarcelis tianpingensis Sun et Chao, 1992；1190.

寄 主：

分 佈：湖南。

Thecocarcelia trichops Herting 毛眼鞘寄蠅 (Liang et Chao, 1990:362; Xue et al., 1996, 2:1827)
Thecocarcelia trichops Herting
寄 主：
分 佈：遼寧；日本、希臘、南斯拉夫、法國。

Thelaira chrysopruinasa Chao et Shi 金粉柔寄蠅 (Chao et Shi, 1985:170; Chao et Zhou, 1988:514; Xue et al., 1996, 2:2141; Yunn., 1987:1256; Zhao et Zhou, 1992:1340)
Thelaira chrysopruinasa Chao et Shi, 1985:170-171.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江。

Thelaira claritriangla Chao et Zhou 亮三角柔寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2141; Zhao et Zhou, 1992: 1338)
Thelaira claritriangla Zhao et Zhou, 1993, 2:1338-1339.
寄 主：
分 佈：雲南、四川。

Thelaira ghanii Mesnil 寬體柔寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2141; Zhao et Zhou, 1992:1339)
Thelaira ghanii Mesnil, 1968:186.
寄 主：
分 佈：雲南；巴基斯坦。

Thelaira hohxilica Chao et Zhou 可可西里柔寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2141)
Thelaira hohxilica Chao et Zhou, 1966:
寄 主：
分 佈：青海。

Thelaira leucozona (Panzer) 白帶柔寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2141)
Musca leucozona Panzer, 1809:19.
寄 主：據記載：豹燈蛾
分 佈：山西、新疆、黑龍江；日本、蘇聯、意大利、瑞士。

Thelaira macropus (Wiedemann) 巨形柔寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2141; Zhao et Zhou, 1992:1340)
Dexia macropus Wiedemann, 1830:375.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、山東、山西、北京、吉林；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼(蘇門答臘)、新幾內亞。

Thelaira nigripes (Fabricius) 暗黑柔寄蠅 (Chao et Shi, 1982:240; Chao et Zhou, 1988:513; Hun., 1992: 1202; Xue et al., 1996, 2:2147; Yunn., 1987:1255; Zhao et Zhou, 1992:1340)
Musca nigripes Fabricius, 1794:319.
Musca lateralia Fallén, 1816:
Musca nigrina Fallén, 1816:
寄 主：國外：Noctuidae 夜蛾科

Cucullia scrophulariae Esp.
Dianthoecia capsincola Hb. 灰夜蛾
Dianthoecia carpophaga Bkh.
Euplexia lucipara (Linnaeus) 白腎錦夜
Mamestra persicariae Linnaeus
Mamestra thalassina Rott.
Arctiidae 燈蛾科
Arctia caja (Linnaeus) 豹燈蛾
Arctia hebe Linnaeus
Arctia vilia Linnaeus
Arctinia caesarea Goeze
Ocnogyna corsicana Ramb.
Phragmatobia fuliginosa Linnaeus 亞麻燈蛾
Spilosoma lubricipeda Linnaeus 黃腹斑燈蛾
Lasiocampidae 枯葉蛾科
Lasiocampa trifolii Esp.
Macrothylacia rubi Linnaeus 樹莓枯葉蛾
Sphingidae 天蛾科
Chaerocampa elpenor Linnaeus
Metopsilus porcellus Linnaeus
Smerinthus populi Linnaeus
Notodontidae 舟蛾科
Notodonta trepida Esp. 櫟顫舟蛾

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、內蒙古、吉林、黑龍江、日本、蘇聯(赤塔、外高加索)、歐洲中部和北部。

Thelaira occelaris Chao et Shi 單眼鬃柔寄蠅 (Chao et Shi, 1985:172; Chao et Zhou, 1988:514; Hun., 1992:1202; Xue et al., 1996, 2:2147; Yunn., 1987:1257; Zhao et Zhou, 1992:1340)
Thelaira occelaris Chao et Shi, 1985:172.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江(天目山)。

Thelaria solivaga (Harris) 撒拉柔寄蠅 (Chao et Shi, 1982:240; Xue et al., 1996, 2:2147; Zhao et Zhou, 1992:1340)
Musca solivaga Harris, 1780:85.
Thelaira abdominalis Robineau-Desvoidy, 1839:
寄 主：據記載：*Actia villica* Linnaeus 燈蛾
分 佈：雲南、西藏(江達、察雅、芒康)、四川、黑龍江；外高加索、歐洲、北美洲

Thelymorpha marmorata (Fabricius) 脈紋雌寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1935)
Musca marmorata Fabricius, 1805:300.
=*Tachina vertiginosa* Fallén, 1820:
=*Latreillia silvestris* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Latreillia minor* Robineau-Desvoidy, 1830:

=*Latreillia rubetra* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Phorocera vereunda* Rondani, 1859:
=*Latreillia rubetra* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：據記載：*Phytodecta rufipes* 甲蟲
Phytodecta pallipes 甲蟲
Arctia quenselii 燈蛾
Arctia villica 燈蛾
具條冬夜蛾
舞毒蛾
模舞毒蛾
黃褐天幕毛蟲
黃毒蛾
分 佈：新疆；蒙古、西伯利亞、哈薩克斯坦、外高加索、聖彼得堡、以色列、意大利、法國、英國、瑞典。

Thelymyia saltuum (Meigen) 飛舞蔭寄蠅 (ASZI, 1987, 2:724; Liu et Li, 1986:92; Xue et al., 1996, 2:1859)
Tachina saltuum Meigen, 1824:329.
Tachina fauna Meigen, 1824:
Tachina demens Zetterstedt, 1844:
Tachina argentigera Zetterstedt, 1944:
Thellymyia loeewii Brauer et Bergenstamm, 1891:
寄 主：*Loxostege sticticalis* 黃緣條螟(草地螟)。
據記載：*Caticaka soibsa* 樹莓裳夜蛾
分 佈：山西、甘肅、內蒙古；中亞、保加利亞、捷克、斯洛伐克、德國、瑞典。

Therobia composita Séguy 文靜野寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1955)
Therobia composita Séguy, 1925:439.
Proxystomima bouvieri Séguy, 1926:
寄 主：
分 佈：海南；越南。

Therobia vesiculifera Bezzi 氣囊野寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1955)
Therobia vesiculifera Bezzi, 1928:203.
寄 主：
分 佈：廣西；馬來西亞、所羅門群島、斐濟。

Timavia amoena (Meigen) 松毛蟲盾寄蠅 (Chao et Zhou, 1997:1540; Fan, 1992:758; Liu, Zhao et al., 1998: 126; Xue et al., 1996, 1:1766)
Tachina amoena Meigen, 1824:264.
=*Smidtia flavipalpis* Robineau-Desvoidy, 1847:596.
=*Tachina delitescens* Walker, 1853:73.
=*Tachina cetans* Walker, 1853:73.
=*Chaetolyga pilifera* Rondani, 1859:110.
=*Nemosturmia amurensis* Borisova, 1962:
寄 主：*Dendrolimus* spp. 松毛蟲的重要天敵(東北地區)

落葉松毛蟲
赤松毛蟲
油松毛蟲
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾
Lymantria dispae Linnaeus 舞毒蛾。
國外：*Amphidasis betularia* Linnaeus
Catocala nupta Linnaeus 楊裳夜蛾
Dasychira selenitica Esp.
Dianthoecia capsincola Hb.
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 黃褐天幕毛蟲
Ortholintha cervinata Schiff.
Panolis flammea Schiff.
Panolis griseovarigata Goeze
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾

分 佈：浙江、湖北、山東、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞、中亞、歐洲。

Tlephusa cininna (Rondani) 雙帶四鬃寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1881)

Exorista cincinna Rondani, 1859:141.
=*Tlephusa honesta* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Parexorista intermedia* Brauer et Bergenstamm, 1891:
=*Parexorista latifrons* Brauer et Bergenstamm, 1891:
=*Exorista diligens* (Zetterstedt) of Ringdahl, 1945:

寄 主：據記載：松天蛾
Mamestra perssicriae

分 佈：吉林、黑龍江；西伯利亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英國、瑞典、挪威。

Torocca munda Walker 亮胸刺須寄蠅 (Hun., 1992:1201; Sun et al., 1992:637; Xue et al., 1996, 2:2119; Yunn., 1987:1254)

Torocca munda Walker, 1856:131.

寄 主：國外：*Lygropis quaternalis* Zeller 扶桑四點野螟
Lygropis obrinusalis

分 佈：福建、湖南、雲南、浙江；日本、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦、加里曼丹、印尼。

Tothillia sinensis Zhao et Zhou 中華托蒂寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1959; Zhao et Zhou, 1992:1323)

Tothillia sinensis Zhao et Zhou, 1992:1323-1325.

寄 主：

分 佈：雲南、西藏、四川。

Trichopareia blanda Fallén 裸顏毛顏寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:262;Yunn., 1987:1207)

寄 主：國外：*Pachyrrhina pratensis*
Tipula nubeculosa Miegen

分 佈：雲南、西藏(昌都)、內蒙古、新疆；歐洲中部及北部(包括英國)。

Trichopareia gracilipes Mesnil 長角毛顏寄蠅 (Yunn., 1987:1207)

寄 主：

分 佈：雲南、四川；緬甸。

Trichopareia grandicornis Meigen 巨角毛顏寄蠅 (Yunn., 1987:1207)

寄 主：

分 佈：雲南；歐洲北部、阿爾卑斯山。

Trichopareia podomyia Brauer et Bergenstamm 波多毛顏寄蠅 (Yunn., 1987:1206)

寄 主：

分 佈：雲南。

Trigonospila ludio (Zetterstedt) 蘆地三角寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:71; Sun et al., 1992:623, Xue et al., 1996, 2:1717)

Tachina ludio Zetterstedt, 1849:3233.

Trigonospila picta Pokorny, 1886:191.

寄 主：

分 佈：貴州、山西；日本、蘇聯、奧地利、意大利。

Trigonospila transvittata (Pandellé) 橫帶三角寄蠅 (Hun., 1992:1170; Xue et al., 1996, 2:1717)

Succingulum transvittata Pandellé, 1896:148.

寄 主：

分 佈：臺灣、湖南、貴州、浙江；日本、泰國、印度、西班牙、法國。

Trischidocera yunnanensis Chao et Zhou 雲南鞭角寄蠅 (Chao et Zhou, 1987, 5:208-209; Xue et al., 1996, 2:1957; Yunn., 1987:1250; Zhao et Zhou, 1992:1343)

Trischidocera yunnanensis Chao et Zhou, 1987:208-209.

寄 主：

分 佈：雲南。

Tritaxys braueri (de Meijere) 長芒三鬃寄蠅 (ASZI, 1987, 2:724; Xue et al., 1996, 2:1891; Yunn., 1987:1230)

Goniophana braueri de Meijere, 1924:924.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、西藏；印尼。

Trixomorpha indica Brauer et Bergenstamm 印度三色寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1892; Yunn., 1987:1231)

Trixomorpha indica Brauer et Bergenstamm, 1889:163.

寄 主：

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；印度。

Turanogonia chinensis Wiedemann 夜蛾土藍寄蠅 (ASZI, 1987, 2:725; Chao et Liang, 1984:85; Chao et Shi, 1981(3):50; Chao et Zhang, 1982:275; Chao et Zhou, 1988:522; He et al., 1991:69; Shi, 1981(4):33, 34; Yunn., 1987:1248; Zhang, 1987[ed.] 2:71)

Turanogonia chinensis Wiedemann
=*Turanogonia smirnovi* Rohdendorf
寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎(蛹)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(樟木、亞東、雪巴)、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、吉林；日本、蘇聯、菲律賓、越南、印度、錫金、尼泊爾、巴基斯坦。

Turanogonia klapperichi Mesnil 黃毛土藍寄蠅 (ASZI, 1987, 2:725; Chao et Liang, 1984:84; Shi, 1981(4):34; Yunn., 1987:1248)

寄 主：*Agrotis segetum* (Schiffermüller) 黃地老虎
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
國外：*Agrotis segetum* (Schiffermüller) 黃地老虎
Phragmatobia fulifinosa Linnaeus 亞麻燈蛾
分 佈：福建、廣西、雲南、浙江、青海、遼寧、新疆；緬甸、印度、北非、歐洲(英國除外)。

Turanogonia smirnovi Rondani 夜蛾土蘭寄蠅 (ASZI et al., 1978:210; Chao, 1962:43)

寄 主：*Agrotis ipsilon* (Rottemberg) 小地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、山東、河北；蘇聯、越南。

Urodexia penicillum Osten-Sacken 柄尾寄蠅 (Hun., 1992:1170; Sun et al., 1992:623; Xue et al., 1996, 2:1720)

Urodexia penicillum Osten-Sacken, 1882:14.
寄 主：
分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江；馬來西亞、泰國、斯里蘭卡、印尼

Urophyllina grossa Chao 巨裸背寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:262; Chao et Zhou, 1988:520)

Urophylina grossa Chao, 1982:262.
寄 主：
分 佈：西藏(墨脫)。

Urophyllina shanxiensis Chao et Liu 山西裸背寄蠅 (Liu et al., 1985:169)

Urophyllina shanxiensis Chao et Liu, 1985:169.
寄 主：
分 佈：山西。

Vibrissina debilitata (Pandellé) 軟鬃寄蠅 (Hun., 1992:1173; Liu, Zhao et al., 1998:82; Xue et al., 1996, 1:1754))

Latreeillia debilitata Pandellé, 1896:110.
=*Degeeria muscaria* (Meigen) of Villeneuve, 1907:248, 261. missident.
=*Oswaldia villeneuve* Wainwright, 1940:428.
寄 主：
分 佈：湖南、山西；日本、聖彼得堡、法國。

Vibrissina turrita (Meigen) 長角髭寄蠅 (ASZI, 1987, 2:726; Chao et Liang, 1984:83; Fan, 1992:744; Hun., 1992:1173; Liu, Zhao et al., 1998:81; Shi, 1981(4):36; Shi,1995:538; Sun et al., 1992:625; Xue et al., 1996, 1:1754; Yunn., 1987:1216; Zhao et Zhou, 1992:1286)
Tachina turrita Meigen, 1824:401.
=*Masicera minor* Perris, 1852:203.
=*Vibrissina demissa* (Meigen) of Rondani, 1861:37. Misident.
=*Myobia pruinossa* (Meigen) of Padellé, 1894:98. Misident.
寄 主：樹葉蜂
玫瑰葉蜂。
國外葉蜂科：*Arge enodis* Linnaeus 古北葉蜂
Arge fuscipes Fallén 柳三節葉蜂
Arge pagana Panz. 薔薇三節葉蜂
Arge ustutata Linnaeus
Croesus varus Villar. 榿葉蜂
Empria abdominalis Fabricius
Eriocampa ovata Linnaeus 榿木蠟葉蜂
Macrophya albicincta Schr.
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山西、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、外高加索、歐洲(向北達德國北部)、德國北部、波蘭北部、法國。

Voria micronychia Chao et Zhou 短爪蝸寄蠅 (Chao et Zhou, 1992:1335; Xue et al., 1996, 2:2129)
Voria micronychia Zhao et Zhou, 1992:1335-1336.
寄 主：
分 佈：雲南、西藏。

Voria ruralis (Fallén) 茹蝸寄蠅 (ASZI, 1987, 2:726; Chao et Liang, 1984:152; Fan, 1992:791; Liu, Zhao et al., 1998:331; Xue et al., 1996, 2:2129; Yunn., 1987:1254; Zhao et Zhou, 1992:1335)
Tachina ruralis Fallén, 1810:265.
=*Tachina ambigua* Fallén, 1810:275.
=*Tachina verticalis* Meigen, 1824:299.
=*Voria latifrons* Robineau-Desvoidy, 1830:196.
=*Tachina arcuata* Macquart. 1834:264.
=*Tachina interrupta* Zetterstedt. 1844:1020.
=*Plagia trasversa* Macquart, 1848:96.
=*Voria operosa* Robineau-Desvoidy, 1863:827.
=*Tachina spinocosta* Palm, 1876:419.
=*Voria americana* Wulp, 1890:102.
=*Voria aurifrons* Townsend, 1892:67.
=*Voria brasiliana* Townsend, 1929:380
=*Voria edentata* Baranov, 1932:83. (臺灣)

=*Voria ciliata* d'Aguilar, 1957:261.

寄 主：*Plusia gamma* Linnaeus　Y紋夜蛾
Argyrogramma agnata Staudinger　銀紋夜蛾。
國外：*Arctia caja* Linnaeus　豹燈蛾(甘藍褐燈蛾)
Arctia hebe Linnaeus
Cirphis unipuncta Haw.　一星粘蟲
Laphygma exigua Hübner　甜菜夜蛾
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Mamestra brassicae Linnaeus　甘藍夜蛾
Mamestra oleracea Linnaeus
粘蟲
Plusia chrysitis Linnaeus　金夜蛾
Plusia chryson Esp.　紫金翅夜蛾
Plusia deaurata Esp.
Plusia gamma Linnaeus　Y 紋夜蛾
Plusia gutta Gn.
Plusia interrogationis Linnaeus
Plusia jota Linnaeus
Vanessa atalanta Linnaeus　紅紋麗蛺蝶(海軍蛺蝶)
Vanessa cardui Linnaeus　小苧麻赤蛺蝶

分 佈：臺灣、雲南、西藏、四川、陝西、山西、北京、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、印度、尼泊爾、巴勒斯坦、非洲、美洲、澳洲，古北區。

Voria ruralis (Fallén) 茹蝸寄蠅 (Chao et Shi, 1982:237; Chao et Chou, 1988:513; Zhao et Zhou, 1996:265)

Voria ruralis (Fallén, 1810:165.)

寄 主：*Phytometra agnata* Staudinger　銀紋夜蛾
Plusia gamma Linnaeus　Y紋夜蛾。
國外：Lymantriidae　毒蛾科
Arctiidae　燈蛾科
Noctuidae　夜蛾科
Nymphalidae　蛺蝶科

分 佈：雲南、西藏(墨脫、察隅、樟木、吉隆)、四川、陝西、北京、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、印度、尼泊爾、巴勒斯坦、歐洲、非洲、澳洲、埃塞俄比亞、北美(墨西哥)。

Viviania cinerea Fellén 步甲萎寄蠅 (ASZI et al., 1978:218)

寄 主：*Carabus* spp.　步甲(內蒙古)。
國外：網紋步甲
庭園步甲
麥步甲
Amara aulica

Calathus erratus
Calathus fuscipes
Carabus cancellatus
Carabus coriaceus
Carabus glabratus
Carabus monilis
Carabus rugosus
Carabus violaceus
Broscus cephalotes
Harpalus rubripes
Ophonus pubescens
Pterostichus niger
分 佈：內蒙古；英國南部、瑞典中部、芬蘭。

Wagneria depressa Herting 蒙古阿費寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2136; Zhao et Zhou, 1992:1337)
Wagneria depressa Herting 1973:34.
寄 主：
分 佈：四川、青海；蒙古、西伯利亞。

Wagneria nigrans Meigen 黑頭猛寄蠅 (ASZI et al., 1978:220)
寄 主：黃地老虎
Agrotis ipsilon (Rottemberg) 小地老虎。
國外記載有：
地老虎
分 佈：西藏、甘肅、新疆；英國南部、瑞典、芬蘭。

Weingaertneriella longiseta (Wulp) 長鬃威寄蠅 (Hun., 1992:1180)
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南；日本、印尼。

Winthemia angusta Shima, Chao et Zhang 狹肛溫寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:136; Xue et al., 1996, 2:1769)
Winthemia angusta Shima, Chao et Zhang, 1992:219-222.
寄 主：*Dolbina tancrei* Staudinger 絨星天蛾(日本)
Smerinthus planus Walker 藍目天蛾(日本)
分 佈：雲南、山東、山西、北京、遼寧；日本。

Winthemia aquilonalis Chao 北方溫寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:130; Xue et al., 1996, 2:1769)
Winthemia aquilonalis Chao, *in* Xue et al., 1996:1769-1771.
寄 主：
分 佈：山西。

Winthemia aurea Shima, Chao et Zhang 黃粉溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1771)
Winthemia aurea Shima, Chao et Zhang, 1992:217.
寄 主：

分 佈：雲南。

Winthemia beijingensis Chao et Liang 北京溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1771)

Winthemia beijingensis Chao et Liang, 1996, 2:1771-1772.

寄 主：

分 佈：北京(西山)。

Winthemia brevicornis Shima, Chao et Zhang 短角溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1772)

Winthemia brevicornis Shima, Chao et Zhang, 1992:225.

寄 主：

分 佈：雲南。

Winthemia cruentata (Rondani) 凶猛溫寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:132; Xue et al., 1996, 2:1772; Zhao et Zhou, 1992:1399)

Chaetolyga cruentata Rondani, 1859:106.

Winthemia ligustri Stein, 1924:59.

寄 主：據記載：*Acherontia atropos* Linnaeus 鬼臉天蛾
Catocala fraxini (Linnaeus) 縞裳夜蛾
Catocala sponsa Linnaeus 樹莓勛綬夜蛾
Chhaerocampa elpenor
Dasychira pudibunda Linnaeus 茸毒蛾
Deilephila euphorbiae
Dilina tiliae
Hyloicus pinastri
Saturnia pyri Schiff. 大天蠶蛾
Smerinthus populi
Sphinx ligustri Linnaeus 丁香天蛾
Deilephila elpenor

分 佈：四川、山西、北京、內蒙古、吉林；蒙古、日本、西伯利亞、外高加索、歐洲北達瑞典。

Winthemia diversa Malloch 裸腹溫寄蠅 (Chao te Zhang, 1982:268; Shii, 1981(4):37)

寄 主：*Oligia vulgaris* (Butler) 竹筍夜蛾。

分 佈：臺灣、江西、西藏(墨脫)、浙江、北京。

Winthemia diversitrica Chao 多樣溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1772)

Winthemia diversitrica Chao, *in* Xue et al., 1996, 2:1772-1774.

寄 主：

分 佈：湖南(永順)、廣西。

Winthemia diversoides Baranov 巨角溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1774)

Winthemia diversoides Baranov, 1932:47.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Winthemia emeiensis Chao et Liang 峨嵋溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1774)

Winthemia emeiensis Chao et Liang, *in* Xue et al., 1996,2:1774-1775.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Winthemia javana (Bigot) 爪哇溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1775)

Winthemia javana (Bigot, 1885:201-202.)

寄 主：

分 佈：廣西；印尼。

Winthemia mallochi Baranov 邁洛溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1775)

Winthemia mallochi Baranov, 1932:46.

寄 主：

分 佈：臺灣；斯里蘭卡。

Winthemia marginalis Shima, Chao et Zhang 緣鬃溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1775)

Winthemia marginalis Shima, Chao et Zhang, 1992:223.

寄 主：

分 佈：雲南、遼寧、吉林。

Winthemia neowinthemioides Townsend 變異溫寄蠅 (ASZI, 1987, 2:727; ASZI et al., 1978:202; Chao et Liang, 1984:108; Chao et Zhou, 1988:521; Fan, 1992:761; Yunn., 1987:1228)

Winthemia neowinthemioides Townsend, 1928:394.

Winthemia diversa Malloch, 1930:

Winthemia albidopilosa Mesnil, 1949:

寄 主：*Oligia vulgaris* (Butler) 竹筍夜蛾(我國南方)。

國外：*Crocidolomia binotalis* Zell.

分 佈：臺灣、江西、雲南、西藏(墨脫)、浙江、北京；菲律賓、馬來西亞、印尼、新幾內亞、澳洲。

Winthemia parafacialis Chao et Liang 裸顏溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1775)

Winthemia parafacialis Chao et Liang, *in* Xue et al., 1996, 2:1775-1776.

寄 主：

分 佈：湖南(大庸)。

Winthemia parallela Chao et Liang 平眼溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1775)

Winthemia parallela Chao et Liang, *in* Xue et al., 1996, 2:1776.

寄 主：

分 佈：湖南(永順)。

Winthemia proclinata Shima, Chao et Zhang 前傾溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1776)

Winthemia proclinata Shima, Chao et Zhang, 1992:212.

寄 主：

分 佈：雲南。

Winthemia quadripustulata (Fabricius) 四點溫寄蠅 (Chao et Zhang, 1982:268; Liu, Zhao et al., 1998:129; Xue et al., 1996, 2:1778; Yunn., 1987:1227; Zhao et Zhou, 1992:1300; 1996:256)

Musca quadripustulata Fabricius, 1794:324.
Tachina aestuans Fallén, 1810:281.
Dorbinia ludibunda Robineau-Desvoidy, 1847:272.
Nemoraea analis Macquart, 1848:124.
Exorista sanguinolenta Macquart, 1849:358.
Chaetolyga cilicrura Rondani, 1859:107.
Arge terminalis Ronbineau-Desvoidu, 1863:183.

寄 主：國外：*Abraxas pantaria* 符尺蠖
Acronicta tridens 三齒劍紋夜蛾
Agrotis c-nigrum 八字地老虎
Ammoconia caecimacula
Arctia caja 豹燈蛾
Biston birtaria
Brotolomia meticulosa Linnaeus 瑪瑙夜蛾
Catocala nupta Linnaeus 楊裳夜蛾
Chaeroampa elpenor Linnaeus
Chalaeas graminis
Cucullia argentea 碧銀冬夜蛾
Cucullia artemisiae Hufn.
Cucullia artentea
Cucullia asteris Schiff.
Cucullia blattaria Linnaeus
Cucullia lychnitis Ramb.
Cucullia prenanthis B.
Cucullia scopariae
Cucullis scrophulariae Cap.
Cucullia verbasci Linnaeus 具條冬夜蛾
Cucullia umbratica Linnaeus
Dasychira pudibunsa Linnaeus 紅尾毒蛾
Dicranura vinula Linnaeus 黑帶二尾天蛾
Dianthoeca capsincola
Diloba coeruleocephala Linnaeus 刺芹夜蛾
Ennomos erosaria 櫟角尺蠖
Gortyna ochracea 心紋黃夜蛾
Helicoverpa armegera Hübner 棉鈴蟲
Heliothis peltigera Schiff. 大棉鈴蟲
Hybernia defoliaria Cl.
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲
Mamestra pisi Linnaeus
Metopsilus porcellus Linnaeus
Nonagria geminipuncta Hatch.

Ortholitha cervinata
Ourapteryx sambucaria Linnaeus 接骨木尾天蛾
Phragmatobia fuliginosa 亞麻燈蛾
Plusia illustris Fabricius
Plusia moneta
Saturnia pavonia Linnaeus
Saturnia spini Schiff.
Smerrinthus populi Linnaeus
Sphinx ligustri Linnaeus 女貞天蛾
Thais polyxena Schiff.
Argynnis aglaja Linnaeus 銀星豹蛺蝶
Vanessa jo Linnaeus 孔雀蛺蝶
Vanessa urtixae Linnaeus 蕁麻蛺蝶

分 佈：雲南、西藏(察雅、察隅、吉隆)、四川、江蘇、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、列寧格勒、意大利、法國、德國、北達蘇格蘭、瑞典。

Winthemia remittens (Walker) 蕊米溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1778)

Eurygster remittens Walker, 1859:125.

寄 主：

分 佈：海南、雲南；菲律賓、寮國、新加坡、印尼。

Winthemia shimai Chao 嶌洪溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1778)

Winthemia shimai Chao, *in* Xue et al., 1996, 2:1778-1779.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Winthemia speciosa (Egger) 華麗溫寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1779)

Nemoraea speciosa Egger, 1861:209.

寄 主：

分 佈：四川、浙江；日本、庫頁島、外高加索、比利時、德國、瑞典。

Winthemia sumatrana (Townsend) 蘇門答臘溫寄蠅 (Zhao et Zhou, 1992:1300; Xue et al., 1996, 2:1779)

Pseudokea sumatrana Townsend, 1927:69.

Winthemia neowinthemioides Townsend, 1928:

寄 主：*Oligia vulgris* (Bulter) 竹筍夜蛾(主要天敵)。
臺灣蛺蝶
據記載：*Crocidolomia binotalis* Zell.

分 佈：臺灣、江西、雲南、西藏、浙江；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Winthemia venusta (Meigen) 燦爛溫寄蠅 (ASZI, 1987, 2:727; ASZI et al., 1978:203; Chao et Liang, 1984:108; Fan, 1992:761; Liu, Zhao et al., 1998:133; Shi, 1981(4):37; 38; Xue et al., 1996, 2:1779; Zhao et Zhou, 1992:1300)

Tachina venusta Meigen, 1824:327.
Chaetolyga cililibia Rondani, 1859:107.
Winthemia hokkaidensis Baranov, 1939:110-112.
寄 主：*Adris tyrannus* (Guenée) 枯葉夜蛾
Maenas salaminia Fabricius 艷葉夜蛾
Dendrolimus sibiricus 落葉松毛蟲。
國外：*Ellopia somniaria* Halst. 美西櫟尺蠖
Lambdina fiscellaria lugubrosa (Halst.) 西部鐵杉尺蠖
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾
Saturnia pavonia Linnaeus 小天蠶蛾
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、江蘇、上海、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、千島群島、西伯利亞、聖彼得堡、塔爾圖、列寧格勒、塔爾圖、意大利、英國、德國。

Winthemia venustoides Mesnil 掌舟蛾溜寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:135; Xue et al., 1996, 2:1779)
Winthemia venustoides Mesnil, 1967:39.
寄 主：蘋掌舟蛾。
分 佈：山西、北京；日本。

Winthemia verticillata Shima, Chao et Zhang 寬頂溜寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1779)
Winthemia verticillata Shima, Chao et Zhang, 1992:214.
寄 主：
分 佈：雲南。

Winthemia zhoui Chao 周氏溜寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:1779)
Winthemia zhoui Chao, *in* Xue et al., 1996, 2:1779-1781.
寄 主：
分 佈：北京、遼寧、吉林。

Xylotachina diluta Meigen 帶柳木蠹蛾寄蠅 (ASZI, 2:728; Chao et Liang, 1984:145; Fan, 1992:780)
Tachina diluta Meigen, 1824:387.
Tachina scutellata Zetterstedt, 1838:
Masicera ambulans Rondani, 1851:
Xylotachina ligniperdae Brauer et Bergenstamm, 1891:
寄 主：木蠹蛾。
國外：*Cossus cossus* Linnaeus 柳木蠹蛾
分 佈：寧夏；高加索、意大利、英國、奧地利、芬蘭。

Zaira cinerea (Fallén) 步行蟲災寄蠅 (ASZI, 1987, 2:728; Chao et Liang, 1984:72; Fan, 1992:738; Xue et al., 1996, 2:1716
Tachina cinerea Fallén, 1810:286.
=*Tachina infixa* Walker, 1853:
=*Tachina atricolor* Zetteratedtm 1859:
=*Msicera proxima* Egger, 1861:
寄 主：*Carabus* spp. 步甲屬。

國外：步甲科和僞步甲科
Amara aulica
Broscus cephalotes
Carabus bortensis
Carabus cancellatus
Carabus clathratus 細紋步甲
Carabus coriaceus
Carabus erratus
Carabus fuscipes
Carabus glabratus
Carabus hortensis
Carabus monilis
Carabus rugosus
Carabus violaceus
Carabus glabratus
Harpalus rubripes
Ophonus pubescens 草莓步甲
Pterotichus niger
Calathus fuscipes
Calathus erratus
分 佈：青海、北京、內蒙古、黑龍江；日本、亞洲中部、聖彼得堡、外高加索、以色列、歐洲北部達瑞典。

Zenillia dolosa (Meigen) 金黃彩寄蠅 (ASZI, 1987, 2:729; Chao et Liang, 1984:143; Chao et Zhou, 1997:1542; Fan, 1992:784; Liu, Zhao et al., 1998:224; Shi, 1981(4):38; Xue et al., 1996, 2:1924; Yunn., 1987:1248; Zhao et Zhou, 1992:1289)
Tachina dolosa Meigen, 1824:394.
=*Phorrcera grisella* Rondani, 1859:164.
=*Zenilliaa fulva* (Fallén) of Pandellé, 1894:338.
別 名：*黃粉彩寄蠅*。
寄 主：*Argyroploce ineptana* Kennel 山槐小捲蛾
Caciecua nyrubaba
Cheimophila salicellum Hübner 榆織蛾
Dasystoma salicelle
Depressaria furvella
Ectropis grisescens Warren 茶尺蠖
Hyponomeuta cogntella 衛矛巢蛾
Hyponomeuta evonymella 稠李巢蛾
Hyponomeuta padella 蘋果巢蛾
Larentia autumnalis
Larentia impluviata
Nygmia phaeorrhoea Donovan 棕尾毒蛾
Spilonota lariciana (Heinemann) 松白小捲蛾
Sylepta ruralis 豆捲葉野螟
Thaumetopoea procesionea 櫟異舟蛾

Zeiraphera diniana Guenée　松線小捲蛾。
國外：*Cacoecia murinana*
Dasystoma salicella
Depressaria furvella
Hyponomeuta cognatella　衛矛巢蛾
Hyponomeuta evonymella Linnaeus　稠李巢蛾
Hyponomeuta padella Linnaeus　蘋果巢蛾
Larentia autumnalis
Larentia impluviata S. V.
Pandemis heparana Schiff.
Pygaera reclusa S. V.
Syllepta ruralis Scopoli　豆捲葉野螟
Thaumetopoeaz processionea Linnaeus　櫟異舟蛾
分 佈：貴州、雲南、湖北、陝西、山西、河北、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、西伯利亞南部、外高加索、德國北部、意大利。

Zenillia libatrix (Panzer) 疣肛彩寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:225; Xue et al., 1996, 2:1924)
Musca libatrix Panzer, 1798:12.
=*Tachina fulava* Fallén, 1820:32.
=*Exorista ancilla* Meigen, 1838:257.
=*Musca ochracea* Ratzeburg, 1840:125.
=*Zenillia orgyae* Robineau-Desvoidy, 1850:168.
=*Zenillia aurea* Robineau-Desvoidy, 1863:471.
=*Myxexorista macrops* Brauer et Bergenstamm, 1891:333.
=*Zenillia discerpta* Pandellé, 1895:338.
=*Zenillia perplexa* Pandellé, 1895:338.
寄 主：據記載：*Acrronycta auricoma* Fabricius
Brephos nothum Hübner
Bupalus piniarius Linnaeus　松尺蠖
Drepana cultraria Fabricius
Dasychira puddibunda (Linnaeus)　茸毒蛾
Euproctis chryssorrhoea (Linnaeus)　黃毒蛾
Evetria resineella (Linnaeus)　紅松實小捲蛾
Hyponomeuta cognatella Hübner
Hyponomeuta evonymella Linnaeus　衛矛巢蛾
Hyponomeuta padella Linnaeus
Hyponomeuta rorella Hübner
Larentia autumnalis Ström
Lymantria dispar Linnaeus　舞毒蛾
Malacosoma neustria Linnaeus　黃天幕毛蟲
Phlyctaenodes verticalis Linnaeus
Plusia asclepiadis Fabricius
Porthesia similes Linnaeus
Pygaera anachoreta Fabricius　楊扇舟蛾
Pygaera curtula Linnaeus

Pygaera pigra Hufn.
Semiothisia lturate Cl.
Sylepta ruralis Scopoli 豆捲葉野螟
Thaumetopoea processionaea Linnaeus
Erannis defoliaria (Clerck) 暗點赭尺蛾
Etiella zinckenella (Treitschke) 豆莢斑螟
Hydrioomena coeruleata Fabricius
Loxostege stictalis Linnaeus
Lymantria monacha (Linnaeus) 模毒蛾
Ocneria detrita (Esper) 小柏毒蛾
Oxycestes geographica Fabricius
Salebria marmorata Alphereky 雲紋斑蛾
Stilpnotia salicis (Linnaeus) 雪毒蛾
分 佈：山西；日本、西伯利亞、聖彼得堡、外高加索、意大利、法國、英格蘭、德國、瑞典。

Zenillia phryoides (Baranov) 黃足彩寄蠅 (Hun., 1992:1191; Xue et al., 1996, 2:1926)
Tachina phrynoides Baranov, 1939:110.
=*Zenillia mirabilis* Mesnil, 1970:
寄 主：
分 佈：湖南；朝鮮、日本。

Zenilliana pulchra Mesnil 佳美戶刀寄蠅 (Xue et al., 1996, 1:1758)
Zenilliana pulchra Mesnil, 1949:68-69.
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西；日本。

Prosenidae 長足寄蠅科 (Dexiidae)

Billaea triangulifera (Zetterstedt) 三角斑鼻寄蠅 (Sheng, 1990:142; Xue et al., 1996, 2:2156)
Dexia triangulifera Zetterstedt, 1844:1269.
=*Billaea ruficornis* Zetterstedt, 1863:
=*Billaea tsherepanovi* Kolomiets, 1966:
=*Billaea trigonota* Kolm.iets, 1966:
寄 主：*Monochamus sutor* Linnaeus 雲杉小黑天牛。
分 佈：黑龍江(大興安嶺)；日本、薩哈林、西伯利亞、外高加索、法國、英國、德國。

Clytho argentea Egger 銀顏筒寄蠅 (ASZI et al., 1978:223; Chao et Shi, 1981(30:51; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Shi, 1981(4):33, 34; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:71; Zhu, 1981(1-2):86)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；蘇聯。

Dexia vacua (Fallén) 笨長足寄蠅 (ASZI, 1987, 2:729; ASZI et al., 1978:223; Chao et Liang, 1984:172; Fan, 1992:806; Xue et al., 1996, 2:2154)

Musca vacua Fallén, 1816:240.
=*Dexia cincta* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Dexia gracilis* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Dexia aurinia* Walker, 1849:
寄 主：鰓角金龜(幼蟲)。
據記載：褐絨金龜
分 佈：海南、山東、甘肅、遼寧、吉林；西伯利亞、聖彼得堡、法國、蘇格蘭、瑞典。

Dinera grisescens (Fallén) 灰迪內寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2156)

Musca grisescens Fallén, 18116:2433.
=*Dubera otggnaea* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Tachina denotans* Walker, 1853:
=*Dinera ruffifrons* Rondani, 1826:
=*Dinera zetterstedti* Robineau-Desvoidy, 1863:
=*Dinera arida* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：
分 佈：內蒙古；蒙古、西伯利亞、中亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、法國、英格蘭、瑞典。

Ectophasia crssipennis (Fabricius) 寬翅異突頰寄蠅 (Xue et al., 11996, 2:2159)

Syrphus crassipennis Fabricius, 1794:284.
寄 主：
分 佈：西藏；日本、西伯利亞、外高加索、莫斯科、德國。

Ectophasia rutundiventris (Loew) 圓腹異突頰寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2159)

Phasia rutundiventris Loew, 1858:1109.
寄 主：
分 佈：四川、陝西；日本、俄羅斯遠東、西伯利亞。

Halydaia luteicornis Walker 銀顏筒寄蠅 (Fan, 1992:802; Xie, 1993, 9(1)::21)

Halydaia luteicornis Walker, 1861:10.
=*Anaperistommyia optica* Townsend, 1926:
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)
Parnara ganga Evans 曲紋稻苞蟲(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；琉球群島、寮國、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、所羅門群島。

Opesia grandis (Egger) 巨形歐佩寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2158)

Xysta grandis Egger, 1860:796.
=*Opesia grisea* Robineau-Desvoidy, 1863:
寄 主：

分 佈：內蒙古；日本、西伯利亞、外高加索、法國、德國、波蘭。

Prosena siberita (Fabricius) 金龜長吻寄蠅 (ASZI, 1987, 2:729; ASZI et al., 1978:223; Chao et Liang, 1984:171; Chen et al., 1993:148; Fan, 1992:805; Xue et al., 1996, 2:2155; Zhao et Zhou, 1992:1344)

Stomoxys siberita Fabricius, 1775:798.
=*Stomoxys longipes* Gmelin, 1790:
=*Stomoxys grisea* Fabricius, 1794:
=*Prosena longirostris* Egger, 1860:
=*Prosena epicurea* Rondani, 1861:
=*Prosena luculliana* Rondani, 1861:
=*Prosena sybarita* Rondani, 1861:

寄 主：*Anomala corpulenta* Motschulsky 銅綠麗金龜(幼蟲)
Holotrichia oblita Pald. 華北大黑鰓金龜(幼蟲)
金龜(幼蟲)。

分 佈：廣東、海南、雲南、西藏、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、庫頁島、西伯利亞、中亞、外高加索、聖彼得堡、意大利、英國、德國、奧地利、丹麥，美國曾輸入用以對付日本麗金龜。

Thelaira hohxilica Chao et Zhou 可可西里柔寄蠅 (Zhao et Zhou, 1996:265)

Thelaira hohxilica Chao et Zhou, 1996:

寄 主：

分 佈：青海。

Thelaira leucozona (Panzer) 白帶柔寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:341; Zhao et Zhou, 1996:265)

Musca leucozona Panzer, 1809:19.
=*Thelaira valida* Robineau-Desvoidy, 1863:776.

寄 主：據記載：*Arctia caja* (Linnaeus) 豹燈蛾

分 佈：福建、山西、新疆、黑龍江；日本、西伯利亞、外高加索、南斯拉夫、意大利、瑞士。

Thelaira macropus (Wiedemann) 巨形柔寄蠅 (Chao et Shi, 1982:241; Chao et Zhou, 1988:513; 1997:1550; Hun., 1992:1202; Liu, Zhao et al., 1998:343; Sun et al., 1992:637; Yunn., 1987:1257)

Dexia macropus Wiedemann, 1830:375.
=*Ochropleurum javanum* Macquart, 1851:185.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北、山東、山西、北京、吉林；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼(爪哇、蘇門答臘)、巴布亞新幾內亞。

Thelaira nigripes (Fabricius) 暗黑柔寄蠅 (Sun et al., 1992:637)

寄 主：

分 佈：湖南、貴州、西藏、浙江；日本、歐洲。

Thelaira occelaris Chao et Shi 單眼鬃柔寄蠅 (Sun et al., 1992:637)

寄 主：

分 佈：廣西、雲南、四川。

Thelaira solivaga (Harris) 撒拉柔寄蠅 (Liu, Zhao et al., 1998:342)

Musca solivaga Harris, 1776:85.
=*Thelaira abdominalis* Robineau-Desvoidy, 1830:214.
=*Thelaira nigripes* Rondani, 1862:176.
=*Thelaira nigripes* Robineau-Desvoidy, 1863:779.
寄 主：據記載：*Arctia villica* Linnaeus
分 佈：雲南、西藏、四川、山西、黑龍江；歐洲、北美洲。

Trixella rufiventris (Mesnil) 紅腹特里寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2155)

Dexiotrix rufiventris Mesnil, 1967:52.
寄 主：
分 佈：青海、甘肅；日本、庫頁島。

Zeuxia erythraea (Egger) 赤斑阻寄蠅 (Xue et al., 1996, 2:2154)

Dexia erythraea Egger, 1856:389.
=*Dexia nigricornis* Egger, 1860:
=*Zeuxia formosa* Kolomiets, 1971:
=*Zeuxia monstruosa* Kolomiets, 1971:
寄 主：
分 佈：新疆；外高加索、烏克蘭、亞美尼亞、克里尼亞，阿爾巴尼亞，南斯拉夫、希臘、意大利。

Hypodermatidae 皮蠅科

Oestroderma schubini (Grunin) 平顏狂皮蠅 (Fan, 1992:820)

Teba schubini Grunin, 1965:14140-1415.
寄 主：高山鼠兔(*Oehotona alpina* Pallas)。
分 佈：新疆；蘇聯(西伯利亞、中亞)。

Ostromyia leporina (Fallas) 兔裸皮蠅 (Fan, 1992:821)

Oestrus leporina Fallas, 1778:50.
寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fantanierii* (Milne-Edwards)。
分 佈：西藏、甘肅、大、小興安嶺；蒙古、蘇聯、中歐。

國家圖書館預行編目資料

害蟲天敵名錄 / 林珪瑞 / 臺中縣 :
行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 104 號
A List of Natural Enemies of Insect Pests
2003 (民國 92 年) 初版
版面 : 26 X 19 cm.
ISBN : 957-01-4782-2 全套 : 精裝
ISBN : 957-01-4783-0 全套 : 平裝
1. 天敵類 - 害蟲天敵 - 名錄
統一編號 : 1009202718

害蟲天敵名錄

發行人 : 林俊義
編著者 : 林珪瑞
出版者 : 行政院農業委員會 農業試驗所
地址 : (413) 臺中縣霧峰鄉中正路 189 號
網址 : http:/www.tari.gov.tw
電話 : (04) 23302301
傳真 : (04) 2333-8162
承印者 : 信成文具印刷有限公司
地址 : 臺中市興中街 106 號
電話 : (04)22224617
傳真 : (04)22272358
出版日期 : 中華民國九十二年九月 初版
工本費 : NT$ 1800 元 (全套精裝 全套平裝)
ISBN : 957-01-4782-2 (全套 : 精裝)
ISBN : 957-01-4783-0 (全套 : 平裝)
統一編號 : 1009202718
展售書局地址 :
國家書坊臺視總店 : 臺灣市八德路三段 10 號
TEL :02-25781515-643
三民書局 : 臺北市重慶南路一段 61 號
TEL :02-23617511
五南文化廣場 : 臺中市中山路 2 號 B1
TEL : 04-22260330
新進圖書廣場 : 彰化市光復路 177 號
TEL : 04-27252792
青年書局 : 高雄市青年一路 141 號
TEL : 07-3324910

ISBN 957-01-4783-0

9 789570 147834